

# Innvollsorm

Innvollsorm omfatter barnemark (*Enterobius vermicularis*), spolorm (*Ascaris lumbricoides*). Den tredje innvollsormen, bendelorm (*Taenia saginata*), tilhører en annen orden. De to siste er sjeldne i Norge, men barnemark er vanlig også i store deler av verden. Derfor fokuseres det videre på barnemark.

## Symptomer

- **Barnemark kan gi intens, ofte nattlig endetarmskløe.**
- Infeksjon med spolorm er som regel symptomfri, men oppdages ved at ormen kommer ut i avføringen. Hoste kan forekomme tidlig i forløpet.

## Behandling

**Barnemark behandles vanligvis med reseptfrie midler som mebendazol eller pyrvin (til gravide og barn under 2 år).** Pyrvin inneholder fargestoff som vil farge avføringen rød. Hele husstanden skal behandles samtidig og kuren gjentas etter 1 uke. Nattøy, undertøy, sengeklær og håndklær bør vaskes mens man behandler med legemiddel.

**NB! Dagen etter at behandlingen er begynt, kan barnet gå i barnehagen eller på skolen.**

## Kilder:

Spør på apotek!: Farmasøytisk rådgivning ved alminnelige helseplager -  
Innvollsorm side 144-146