
Universität Stuttgart

Elliptische Kurven Kryptographie

Masterarbeit

Autor:
Philipp Eckstein
MatrikelNummer:
3554663
Betreuer:
Prof.Dr.Meinolf Geck

Universität Stuttgart
Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen



Elliptische Kurve $y^2 = x^3 - 2x + 3$ über dem Körper der reellen Zahlen Quelle: Eigene Darstellung mit GeoGebra

Kapitel 1

Vorwort

Eidesstattliche Erklärung

Hier sollte eine kluge eidesstattliche Erklärung stehen, dass du alles allein gemacht hast et cetera et cetera. _____ _____

Danksagung

An erster Stelle dankt man meistens dem Betreuer. Je nach Sentimentalität kann dann auch weiteren Personen aus dem akademischen oder dem privaten Umfeld gedankt werden.

1.1. Einführung

Der Wunsch, Informationen vor dem Zugriff unbefugter Personen zu schützen, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits Julius Caesar soll ein Verschlüsselungsverfahren verwendet haben, um militärische Nachrichten vertraulich zu übermitteln. Bei der heute als Caesar-Chiffre bezeichneten Methode werden die Buchstaben des Alphabets um eine festgelegte Anzahl von Stellen verschoben. Nur wer die verwendete Verschiebung kennt, kann die Nachricht unmittelbar entschlüsseln [2, S. 14–15]. Aus heutiger Sicht bietet dieses Verfahren keine ausreichende Sicherheit, veranschaulicht jedoch bereits ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie. Eine Nachricht wird mithilfe eines Schlüssels so verändert, dass ihr ursprünglicher Inhalt für Unbefugte nicht mehr erkennbar ist.

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat die sichere Übertragung von Informationen erheblich an Bedeutung gewonnen. Beim Onlinebanking, bei der E-Mail-Kommunikation oder bei der Nutzung von Nachrichtendiensten werden regelmäßig sensible Daten über öffentliche Netzwerke übertragen. Kryptographische Verfahren sollen unter anderem gewährleisten, dass diese Informationen nicht von unbefugten Dritten gelesen oder unbemerkt verändert werden können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die asymmetrische Kryptographie, bei der öffentliche und private Schlüssel verwendet werden. Die Sicherheit entsprechender Verfahren beruht häufig auf mathematischen Problemen, für die auf klassischen Computern keine effizienten Lösungsverfahren bekannt sind. Zu diesen Problemen gehört insbesondere das diskrete Logarithmusproblem.

Elliptische Kurven haben sich in der modernen Public-Key-Kryptographie etabliert, da sie bei vergleichbarem Sicherheitsniveau deutlich kleinere Schlüssel und Parameter als klassische Verfahren wie RSA ermöglichen. Dadurch können kryptographische Operationen mit geringerem Speicherbedarf und häufig auch mit geringerem Rechenaufwand durchgeführt werden. Ihre Sicherheit beruht dabei wesentlich auf der Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems in geeigneten Punktgruppen elliptischer Kurven.

Die praktische Sicherheit hängt jedoch nicht allein von der Größe der verwendeten Parameter ab. Bestimmte algebraische Eigenschaften einer Kurve können spezielle Angriffe ermöglichen und die Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems erheblich reduzieren. Die Auswahl geeigneter Kurven und Untergruppen stellt daher einen zentralen Bestandteil der Sicherheit elliptischer Kryptosysteme dar.

Die Entwicklung von Quantencomputern stellt diese Sicherheitsannahme grundsätzlich infrage. Insbesondere ermöglicht der Shor-Algorithmus, diskrete Logarithmusprobleme auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer effizient zu lösen. Daher ist zu untersuchen, welche Konsequenzen sich aus der Entwicklung von Quantencomputern für die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven ergeben.

1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, elliptische Kurven mathematisch einzuführen und ihre Verwendung in der Public-Key-Kryptographie darzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven, ausgewählte kryptographische Verfahren sowie die Analyse klassischer Angriffe und der daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen an geeignete Kurvenparameter. Abschließend wird in einem Ausblick betrachtet, welche zusätzlichen Auswirkungen Quantencomputer und insbesondere der Shor-Algorithmus auf die langfristige Sicherheit elliptischer Kurven haben.

Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage.

> *Welche mathematischen Eigenschaften elliptischer Kurven ermöglichen ihren Einsatz in der Public-Key-Kryptographie und welche Anforderungen ergeben sich aus bekannten Angriffen an die Auswahl sicherer Kurvenparameter?*

1.3. Aufbau der Arbeit

Zunächst werden die Grundlagen der Public-Key-Kryptographie eingeführt. Das RSA-Verfahren dient dabei als einführendes Beispiel für das Zusammenspiel öffentlicher und privater Schlüssel. Anschließend wird das diskrete Logarithmusproblem zunächst allgemein in endlichen zyklischen Gruppen betrachtet. Dabei werden auch ausgewählte Verfahren zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems vorgestellt.

Darauf folgt die mathematische Einführung elliptischer Kurven. Neben ihrer Definition werden insbesondere die Gruppenstruktur, die Punktaddition und die Skalarmultiplikation behandelt. Anschließend werden elliptische Kurven über endlichen Körpern untersucht. Dabei werden unter anderem die Gruppenordnung, Punktzählverfahren und weitere für kryptographische Anwendungen relevante Eigenschaften betrachtet.

Auf diesen Grundlagen aufbauend wird das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven untersucht. Anschließend werden ausgewählte kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven vorgestellt und deren Sicherheit betrachtet. Einen weiteren Schwerpunkt bilden spezielle Angriffe auf elliptische Kurven sowie die daraus resultierenden Anforderungen an die Auswahl geeigneter Kurvenparameter.

Abschließend wird in einem kurzen Ausblick betrachtet, welche grundsätzlichen Auswirkungen Quantencomputer auf die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie haben. Dabei wird insbesondere die Bedeutung des Shor-Algorithmus für das diskrete Logarithmusproblem eingeordnet. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und einem Ausblick.

1.4. Mathematische Grundlagen und Notation

In dieser Arbeit werden grundlegende Kenntnisse der linearen Algebra, Algebra und elementaren Zahlentheorie vorausgesetzt. Insbesondere werden die Begriffe Gruppe, Untergruppe, Ring, Körper, Vektorraum, Homomorphismus und Endomorphismus sowie grundlegende Eigenschaften endlicher Körper als bekannt vorausgesetzt. Begriffe, die für die weitere Untersuchung elliptischer Kurven von besonderer Bedeutung sind, werden an den entsprechenden Stellen erneut eingeführt.

Allgemeine mathematische Notation

$\varphi(n)$	Eulersche Phi-Funktion
$\#M$	Mächtigkeit einer endlichen Menge M
$\simeq$	Isomorphie
$\mathrm{O}(f(n))$	Asymptotische obere Schranke für den Aufwand eines Verfahrens

Gruppen

G	Eine endliche abelsche Gruppe.
0_G	Das neutrale Element einer additiv geschriebenen Gruppe G.
$\lvert G\rvert$	die Ordnung der endlichen Gruppe G.
$\langle P\rangle$	Eine von $P \in G$ erzeugte zyklische Untergruppe.
$\mathrm{ord}(P)$	Die Ordnung des Gruppenelements $P \in G$.
$\mathbb{Z}_n^\times$	Die multiplikative Gruppe der Einheiten modulo n

Körper und endliche Körper

$K[x]$	Polynomring in der Variablen x über K
$\mathrm{char}(K)$	Charakteristik des Körpers K
$\mathbb{F}_p$	Primkörper zur Primzahl p.
$\mathbb{F}_q$	Körper $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ mit Primzahlpotenz $q = p^l$ für ein primes p.
$\mathbb{F}_q^\times$ oder $K^\times$	Multiplikative Gruppe zum Körper $\mathbb{F}_q$ oder K
$\overline{\mathbb{F}}_q$ oder $\overline{K}$	Der algebraischer Abschluss von $\mathbb{F}_q$ oder K.
$\mathbb{F}_{q^m}$	Der Erweiterungskörper von $\mathbb{F}_q$ mit q^m Elementen.

Elliptische Kurven

$E(K)$	Die Gruppe der K-rationalen Punkte der elliptischen Kurve E einschließlich des Punktes $\mathcal{O}$.

$E(\mathbb{F}_q)$	Elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$.
$\#E(\mathbb{F}_q)$	Die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$.
$\mathcal{O}$	Der Punkt im Unendlichen und neutrales Element der Punktgruppe.
Δ	Diskriminante einer elliptischen Kurve
$\mathrm{End}(E)$	Endomorphismenring der elliptischen Kurve E
$\deg(\alpha)$	Grad eines Endomorphismus α

Frobenius-Endomorphismus und Punktzählung

φ_q	Frobenius-Endomorphismus, $\varphi_q(x, y) = (x^q, y^q)$
t	Frobenius-Spur, $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$
$\lvert t\rvert \leq 2\sqrt{q}$	Hasse-Schranke für die Frobenius-Spur

Projektive Geometrie

$\mathbb{A}^2_K$	Die affine Ebene über dem Körper K.
$\mathbb{P}^2_K$	Die projektive Ebene über dem Körper K.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1. Vorwort 1
Eidesstattliche Erklärung 1
Danksagung 1
§1.1. Einführung 1
§1.2. Zielsetzung und Forschungsfrage 2
§1.3. Aufbau der Arbeit 2
§1.4. Mathematische Grundlagen und Notation 3
Kapitel 2. Das Diskrete Logarithmusproblem 7
§2.1. Public-Key-Kryptographie 7
§2.2. Das Diskrete Logarithmus Problem 9
§2.3. Angriffe auf das DL-Problem 10
Kapitel 3. Elliptische Kurven 14
§3.1. Grundlagen 14
§3.2. Gruppenstruktur 16
§3.3. Projektive Ebene und der Punkt bei Unendlich 25
§3.4. Beweis der Assoziativität 28
§3.5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2 36
Kapitel 4. Elliptische Kurven über endlichen Körpern 39
§4.1. Endliche Körper 39
§4.2. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$ 42
§4.3. Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke 46
§4.4. Punktzählung 54
Kapitel 5. Elliptische Kurven Kryptographie 57
§5.1. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch 57
§5.2. Angriffe auf ECC 62
§5.3. Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen 67

Kapitel 6. Quantencomputer und ihre Auswirkung auf die Krytographie 71
§6.1. Grundlagen des Quantencomputings 71
§6.2. Shors Algorithmus und das diskrete Logarithmusproblem 74
§6.3. Shors Algorithmus für ECC 77

Literatur 85

Anhang A. Python-Code 88

Kapitel 2

Das Diskrete Logarithmusproblem

Ziel dieses Kapitel ist es, die grundlegende Idee der Public-Key-Kryptographie einzuführen und anschließend das diskrete Logarithmusproblem als mathematische Grundlage kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven zu betrachten. Als einführendes Beispiel für ein Public-Key-Verfahren wird zunächst das sehr bekannte RSA-Verfahren vorgestellt.

Bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren verwenden Sender und Empfänger denselben geheimen Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung einer Nachricht. Damit eine sichere Kommunikation möglich ist, muss dieser Schlüssel zuvor auf einem sicheren Weg zwischen beiden Parteien ausgetauscht werden. Insbesondere bei einer Kommunikation über über offene Netzwerke stellt dieser Schlüsselaustausch ein praktisches Problem dar. Die Public-Key-Kryptographie begegnet diesem Problem durch die Verwendung eines Schlüsselpaares aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel.

2.1. Public-Key-Kryptographie

Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [6, S. 4, 109, 140], [2, S. 10] und [26, S. 170].

Die grundlegende Idee vieler Public-Key-Verfahren lässt sich durch eine effizient berechnbare Abbildung

$$f : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$$

veranschaulichen, deren Umkehrung ohne zusätzliche geheime Information praktisch nicht effizient berechnet werden kann. Dabei bezeichnet $\mathcal{M}$ die Menge der möglichen Klartexte und $\mathcal{C}$ die Menge der möglichen Chiffretexte. Die Abbildung f soll effizient berechenbar sein, während die Umkehrung f^{-1} ohne zusätzliche geheime Information praktisch nicht effizient durchgeführt werden kann. In einem konkreten Public-Key-Verfahren hängt diese Abbildung vom öffentlichen Schlüssel ab. Die Verschlüsselungsfunktion wird daher mit $E_{k_{\text{pub}}} : \mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{C}$ bezeichnet. Die zugehörige Entschlüsselungsfunktion $D_{k_{\text{priv}}} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{M}$ hängt vom privaten Schlüssel ab und erfüllt $D_{k_{\text{priv}}}\big(E_{k_{\text{pub}}}(m)\big) = m$ für alle $m \in \mathcal{M}$.

Ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie ist das **Kerckhoff's Prinzip**. Danach soll die Sicherheit eines Kryptosystems nicht von der Geheimhaltung des verwendeten Verfahrens abhängen, sondern ausschließlich von der Geheimhaltung des entsprechenden geheimen Schlüssels.

Als einfaches Einführungsbeispiel wird das RSA-Verfahren betrachtet. Die Sicherheit von RSA beruht auf der Schwierigkeit, eine große zusammengesetzte Zahl $N = pq$ in ihre Primfaktoren p und q zu zerlegen. Für zwei Primzahlen p und q hat die eulerische φ-Funktion folgende nützliche Eigenschaft

$$\varphi(N) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1).$$

Definition 2.1.1 (RSA-Verfahren)**.** *Seien p und q zwei verschiedene Primzahlen und $N = pq$. Zunächst wird $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ berechnet. Anschließend wird ein $e \in \mathbb{Z}^*_{\varphi(N)}$ gewählt. Damit gilt insbesondere $\mathrm{ggT}(e, \varphi(N)) = 1$. Daher besitzt e ein multiplikatives Inverses modulo $\varphi(N)$. Dieses wird mit d bezeichnet, also*

$$d = e^{-1} \bmod \varphi(N).$$

Damit gilt

$$ed \equiv 1 \bmod \varphi(N).$$

Der öffentliche Schlüssel ist

$$k_{\mathrm{pub}} = (e, N),$$

während

$$k_{\mathrm{priv}} = (d, N)$$

den privaten Schlüssel bildet.

Eine Nachricht m wird durch

$$c \equiv m^e \bmod N$$

verschlüsselt. Der Chiffretext c wird anschließend durch

$$m \equiv c^d \bmod N$$

entschlüsselt.

Beispiel 2.1.2. *Bob wählt die Primzahlen $p = 5$ und $q = 11$ und bildet daraus das Produkt $N = pq = 55$, sowie $\varphi(N) = (p-1)(q-1) = 4 \cdot 10 = 40$. Anschließend wählt er ein $e = 7$, wobei $\mathrm{ggT}(7, 40) = 1$ gilt. Nun berechnet Bob $d = 7^{-1} \mod \phi(55) \equiv 23$. Der öffentliche Schlüssel lautet somit*

$$k_{\mathrm{pub}} = (7, 55),$$

während

$$k_{\mathrm{priv}} = (23, 55)$$

geheim gehalten wird. Alice möchte die beispielhafte Nachricht $m = 8$ verschlüsseln. Sie berechnet $c = 8^7 \mod 55 \equiv 2 \bmod 55$ und sendet den Chiffretext $c = 2$ an Bob. Bob entschlüsselt die Nachricht mit seinem privaten Schlüssel

$$m \equiv 2^{23} \equiv 8 \pmod{55}.$$

Damit erhält er die ursprüngliche Nachricht $m = 8$.

Die Nachricht $m = 8$ macht semantisch natürlich keinen Sinn, daher wird in realen Anwendungen wird der Klartext vor der Verschlüsselung durch ein geeignetes Kodierungs- und Paddingverfahren verarbeitet.

Die Sicherheit von RSA steht in engem Zusammenhang mit der Schwierigkeit der Faktorisierung großer zusammengesetzter Zahlen. Sind die Primfaktoren p und q von $N = pq$ bekannt, kann

$$\varphi(N) = (p-1)(q-1)$$

unmittelbar bestimmt und daraus der private Exponent berechnet werden. Für hinreichend große Parameter ist die Faktorisierung mit bekannten klassischen Verfahren jedoch praktisch sehr aufwendig.

Bemerkung 2.1.3. *Asymmetrische kryptographische Verfahren sind im Allgemeinen rechenaufwendiger als effiziente symmetrische Verfahren und damit langsamer. In der Praxis werden sie daher häufig verwendet, um einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu etablieren. Die anschließende Übertragung größerer Datenmengen erfolgt dann mit einem symmetrischen Verfahren.*

Neben dem Faktorisierungsproblem bilden auch diskrete Logarithmusprobleme eine wichtige Grundlage von Public-Key-Verfahren. Für kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven ist insbesondere das diskrete Logarithmusproblem in geeigneten zyklischen Gruppen von Bedeutung. Im folgenden Abschnitt wird dieses zunächst allgemein eingeführt, bevor später der Spezialfall elliptischer Kurven betrachtet wird.

2.2. Das Diskrete Logarithmus Problem

Für die Definition des diskreten Logarithmusproblems werden zunächst einige grundlegende Begriffe aus der Gruppentheorie zusammengefasst. Im Hinblick auf die spätere Betrachtung elliptischer Kurven wird für Gruppenelemente bereits die additive Schreibweise verwendet. Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [2, S. 200] und [9, S. 34–36].

Definition 2.2.1 (Gruppenordnung)**.** *Die Ordnung einer endlichen Gruppe G ist die Anzahl ihrer Elemente und wird mit $|G|$ bezeichnet.*

Definition 2.2.2 (Erzeugte Untergruppe und zyklische Gruppe)**.** *Sei G eine Gruppe und $P \in G$. Die von P erzeugte Untergruppe ist*

$$\langle P \rangle = \{kP \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Gilt $G = \langle P \rangle$, so heißt G zyklisch und P ein Generator von G.

Definition 2.2.3 (Elementordnung)**.** *Sei G eine endliche Gruppe und $P \in G$. Die Ordnung von P ist die kleinste positive ganze Zahl k, für die*

$$kP = 0_G$$

gilt. Sie wird mit $\mathrm{ord}(P)$ *bezeichnet.*

Satz 2.2.4 (Satz von Lagrange)**.** *Sei G eine endliche Gruppe und H eine Untergruppe von G. Dann teilt $|H|$ die Gruppenordnung $|G|$. Insbesondere gilt für jedes $P \in G$:*

$$\mathrm{ord}(P) \mid |G|.$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [9, S.44]. □

Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n in additiver Schreibweise. Dann ist die Abbildung

$$f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow G, \qquad k \longmapsto kP,$$

bijektiv. Insbesondere existiert zu jedem $Q \in G$ ein eindeutig bestimmtes $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit $Q = kP$. Die Berechnung von kP kann beispielsweise mit dem Double-and-Add-Verfahren 5.1.1 mit $O(\log k)$ Gruppenoperationen durchgeführt werden und benötigt somit höchstens $O(\log n)$ Gruppenoperationen für $0 \leq k < n$.

Definition 2.2.5 (Diskretes Logarithmusproblem)**.** *Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung n. Das diskrete Logarithmusproblem besteht darin, zu gegebenem Punkten $P, Q \in G$ das eindeutig bestimmte $k \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ mit*

$$Q = kP$$

zu finden.

In multiplikativer Schreibweise lautet die entsprechende Gleichung $h = g^k$. Der gesuchte Exponent k wird als diskreter Logarithmus von h zur Basis g bezeichnet.

Beispiel 2.2.6. *Das disrkete Logarithmus Problem ist jedoch nicht in jeder zyklischen Gruppe schwierig zu lösen. Sei beispielsweise $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ die additive Gruppe mit Generator $P = 1$. Für jedes $Q \in G$ gilt*

$$Q = kP = k \cdot 1 = k \bmod n.$$

Der diskrete Logarithmus kann in dieser Darstellung somit unmittelbar abgelesen werden.

Beispiel 2.2.7. *Sei nun $n = 11$, dann ist $G = (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^\times$ und der Generator $P = 2$. Gesucht ist nun ein k mit*

$$2^k \equiv 7 \bmod 11$$

Durch ausprobieren kann heraus gefunden werden, dass $2^7 = 128 \equiv 7 \bmod 11$ ist.

Bemerkung 2.2.8. *Die Bezeichnung diskreter Logarithmus wird besonders in multiplikativer Schreibweise deutlich. Dabei wird die Abbildung*

$$k \longmapsto g^k$$

betrachtet. Das diskrete Logarithmusproblem besteht darin, zu gegebenem $h = g^k$ den Exponenten k zu bestimmen. In Analogie zum gewöhnlichen Logarithmus wird dieser als diskreter Logarithmus von h zur Basis g bezeichnet.

2.3. Angriffe auf das DL-Problem

In diesem Abschnitt werden allgemeine Verfahren zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems in endlichen zyklischen Gruppen betrachtet. Die Verfahren sind nicht auf elliptische Kurven beschränkt und können daher später auf das ECDLP übertragen werden.

Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [26, S. 146–153], [7, S. 256], [28, S. 76–78, 114–116]. Für den chinesischen Restsatz wird außerdem [9, S. 90, Satz 6.8] herangezogen.

Die einfachste Methode zur Lösung des diskreten Logarithmusproblems ist eine vollständige Suche, auch Brute-Force Suche genannt. Sei P ein Element der Ordnung n und G und $Q = kP \in \langle P \rangle$. Dann können nacheinander die Werte

$$0P, P, 2P, \ldots, (n-1)P$$

berechnet werden, bis Q gefunden wird. Im schlechtesten Fall werden hierfür n Gruppenoperationen benötigt. Der Aufwand beträgt daher

$$\mathrm{O}(n).$$

2.3.1. Baby Step, Giant Step.

Sei $G = \langle P \rangle$ eine endliche zyklische Gruppe der bekannten Ordnung n in additiver Schreibweise und sei $Q \in G$ gegeben. Gesucht ist ein $k \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $Q = kP$. Es wird $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ gesetzt. Durch Division mit Rest lässt sich k eindeutig in der Form

$$k = jm + i, \qquad 0 \leq i < m, \quad 0 \leq j < m,$$

darstellen. Dabei folgt die Schranke $j < m$ aus $k < n \leq m^2$. Damit gilt

$$Q = kP = jmP + iP \quad \Longleftrightarrow \quad Q - jmP = iP.$$

Der Algorithmus speichert zunächst die Werte iP (Baby-Steps) zusammen mit den zugehörigen Indizes i. Anschließend werden die Werte $Q - jmP$ (Giant-Steps) berechnet und mit den gespeicherten Elementen verglichen.

(1) Setze $m = \lceil \sqrt{n} \rceil$ und berechne mP.

(2) Speichere die Paare (iP, i) für $i = 0, \ldots, m-1$ in einer Liste.

(3) Berechne für $j = 0, \ldots, m-1$ nacheinander $Q - jmP$, bis dieser Wert mit einem gespeicherten Element iP übereinstimmt.

(4) Gib $k = (i + jm) \bmod n$ zurück.

Da sich jeder mögliche Exponent $k \in \{0, \ldots, n-1\}$ in der Form $k = jm + i$ mit $0 \leq i, j < m$ darstellen lässt, findet der Algorithmus eine Übereinstimmung. Aus $iP = Q - jmP$ folgt unmittelbar $Q = (i + jm)P$. Für die Durchführung genügt auch eine bekannte obere Schranke $B \geq n$. In diesem Fall setzt man $m = \lceil \sqrt{B} \rceil$. Ist die genaue Ordnung n unbekannt, wird der gefundene Exponent $i + jm$ ohne Reduktion modulo n zurückgegeben, daherer erfüllt er ebenfalls $Q = (i + jm)P$. Die später eingeführte Hasse-Schranke (vgl. 4.3.11) liefert eine solche obere Schranke für die Anzahl der rationalen Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper und damit auch für die Ordnung der verwendeten Untergruppe. Die Baby-Steps werden durch wiederholte Addition von P berechnet. Die Giant-Steps entstehen ausgehend von Q durch wiederholte Subtraktion von mP. Damit benötigt der Algorithmus $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen und Speicher für $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenelemente samt Indizes. Bei Verwendung einer Hashtabelle mit erwartet konstanter Zugriffszeit fallen zusätzlich erwartet $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Tabellenoperationen an. Wird stattdessen eine obere Schranke B verwendet, gelten die entsprechenden Abschätzungen mit B anstelle von n.

2.3.2. Das Pohlig Hellman-Verfahren. Sei G wieder eine abelsche Gruppe und $P \in G$ ein Element der Ordnung n und $Q = kP \in \langle P \rangle$. Das Verfahren führt das diskrete Logarithmusproblem in $\langle P \rangle$ auf mehrere diskrete Logarithmusprobleme in Untergruppen zurück, deren Ordnungen Primteiler von n sind. Sei dafür

$$n = \prod_{i=1}^{t} p_i^{\lambda_i}$$

eine Primfaktorzerlegung von n in die Primzahlen p_i und natürlichen Exponenten $\lambda_i \geq 1$. Die Vereinfachung liegt darin, dass nur die Restklassen

$$k \bmod p_1^{\lambda_1}, k \bmod p_2^{\lambda_2}, \ldots, k \bmod p_t^{\lambda_t}$$

berechnet werden müssen. Denn nach dem Chinesischem Restsatz [9, S.90, Satz 6.8], gilt

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/p_1^{\lambda_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_t^{\lambda_t}\mathbb{Z}.$$

Damit ist k modulo n durch diese Restklassen eindeutig bestimmt. Für die ausführliche Anwendung des chinesischen Restsatzes wird auf [28, S.114-116] verwiesen. Es wird nun aus Übersichtlichkeitsgründen $p = p_i$ und $\lambda = \lambda_i$ geschrieben. Es muss die Restklasse von k modulo p^λ berechnet werden. Dafür wird ein Repräsentant $z \in \{0, \ldots, p^\lambda - 1\}$ gesucht, sodass

$$z \equiv k \mod p^\lambda$$

erfüllt ist. Hierfür wird z in seiner Darstellung zur Basis p geschrieben

$$z = z_0 + z_1 p + z_2 p^2 + \cdots + z_{\lambda-1} p^{\lambda-1}, \qquad z_i \in \{0, \ldots, p-1\}.$$

Jedes z_i löst geneu ein DL-Problem in einer Untergruppe von $\langle P \rangle$ der Ordnung p. Sei dafür $R = \frac{n}{p} P$. Da $\mathrm{ord}(P) = n$ gilt, besitzt R die Ordnung p. Aus $Q = kP$ folgt

$$\frac{n}{p} Q = \frac{n}{p} kP = kR.$$

Da R Ordnung p besitzt, hängt kR nur von der Restklasse von k modulo p ab. Mit $k \equiv z_0 \bmod p$ ergibt sich somit

$$\frac{n}{p} Q = z_0 R.$$

Es kann also z_0 bestimmen werden, wenn man das DL-Problem in der Untergruppe $\langle R \rangle$ mit Ordnung p lösen kann. Es lassen sich dann daraus rekursiv alle anderen Koeffizienten z_i bestimmen. Angenommen es wurde bereits für ein $1 \leq j \leq \lambda - 1$ die Koeffizienten $z_0, z_1, \ldots, z_{j-1}$ bestimmt. Dann kann man das Element

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}} (Q - (z_0 + z_1 p + \cdots + z_{j-1} p^{j-1}) P)$$

berechnen. Da $nP = 0_G$ ist, gilt $\frac{n}{p^{j+1}} p^\lambda P = 0_G$, woraus

$$\frac{n}{p^{j+1}} Q = \frac{n}{p^{j+1}} kP = \frac{n}{p^{j+1}} zP$$

folgt. Daher ist

$$Q_j = \frac{n}{p^{j+1}} (z_j p^j + \cdots + z_{\lambda-1} p^{\lambda-1}) P = \frac{n}{p} z_j P = z_j R.$$

Es reicht also eine Lösung für das DL-Problem in der von $R = \frac{n}{p} P$ erzeugten zyklischen Untergruppe $\langle R \rangle$ von $\langle P \rangle$ zu finden, um z_j zu berechnen. Die einzelnen DL-Probleme können durch eine Brute-Force Suche gelöst werden. Dazu wird für $a = 0, \ldots, p-1$ geprüft, ob $aR = Q_j$ gilt.

Dies benötigt im schlechtesten Fall $O(p)$ Gruppenoperationen und Vergleiche pro Ziffer. Alternativ kann das Baby-Step-Giant-Step-Verfahren verwendet werden. Hierfür hat der Pohlig-Hellman Algorithmus $O\left(\sum_{i=1}^{t} \lambda_i \left(\log n + \sqrt{p_i}\right)\right)$ Gruppenoperationen. Für jeden Primfaktor p_i werden λ_i diskrete Logarithmusprobleme in einer Untergruppe der Ordnung p_i gelöst. Die Laufzeit des Pohlig-Hellman-Verfahrens wird somit wesentlich durch den größten Primfaktor der Gruppenordnung bestimmt. Besitzt n ausschließlich kleine Primfaktoren, kann das DLP entsprechend effizient gelöst werden. Für kryptographische Anwendungen wird daher eine Untergruppe gewählt, deren Ordnung selbst eine große Primzahl ist oder zumindest einen hinreichend großen Primfaktor besitzt.

Kapitel 3

Elliptische Kurven

Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit mit elliptischen Kurven. Neben der allgemeinen Gleichung wird auch die Gruppenstruktur eingeführt. Ein großer Punkt spielt dabei der Beweis der Assoziativität. Außerdem wird auch die projektive Ebene eingeführt

3.1. Grundlagen

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für elliptische Kurven eingeführt, auf denen anschließend die Beschreibung der Gruppenstruktur aufbaut. Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an [26, S. 9 ff.], [16, S. 1, 6] und für die Diskriminante an [9, S. 470 f.].

Beginnen wir also mit der Definition einer Elliptische Kurve.

Definition 3.1.1. *Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei wir das die Weierstraß-Gleichung nennen. Wenn nun gilt $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$*, so können wir die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen*

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

Wobei A und B konstante Werte sind. Dabei sind $A, B \in K$ und es gilt

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Der Punkt im Unendlichen wird mit $\infty = \mathcal{O}$ bezeichnet. Für einen Erweiterungskörper L von K, also $K \subseteq L$, bezeichnet

$$E(L) = \{\mathcal{O}\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

die Menge aller rationalen Punkte der elliptischen Kurve E und den Punkt im Unendlichen. Nach Definition ist der Punkt $\mathcal{O}$ immer enthalten, warum dieser benötigt wird, wird im nächsten Abschnitt ausgeführt. Nicht über jedem Körper lassen sich Elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher wird zuerst der Körper der reellen Zahlen betrachtet. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmemen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei verschiedene reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.




Abbildung 1. Elliptische Kurven über $\mathbb{R}$: links $y^2 = x^3 - 3x$, rechts $y^2 = x^3 + 3x$. Eigene Darstellung mit GeoGebra.

Wie man in der Darstellung sehen kann, ändert sich die Form der Kurve über dem Körper $\mathbb{R}$, wenn mehrere reelle Nullstellen exestieren. Das Polynom x^3+Ax+B darf daher keine mehrfachen Nullstellen besitzen, dies ist äquivalent dazu, dass die Kurve *nicht singulär* ist.

Definition 3.1.2. *Sei $f \in K[x, y]$ und*

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

*eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singulär**, wenn,*

$$f_x(a, b) = 0 \quad \textit{und} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt regulär.

*Die Kurve E heißt **singulär**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt.*

Die elliptische Kurve soll diese Eigenschaft erfüllen, daher wird untersucht welche Bedingung dafür gelten muss. Dafür wird die kruze Weierstraßgleichung einer Kurve E umgeschrieben zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B$$

dann sind die Ableitung

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y$$

Es muss nun für eine der beiden pratiellen Ableitungen ungleich 0 gelten,

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char}(K) \neq 2$$

daraus folgt ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3+Ax+B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also x darf nicht eine Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2.$$

Damit besitzt p genau dann keine mehfachen Nullstellen, wenn

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Diese Bedingung ist äquivalent mit der Zusatzbedingung für $A, B \in K$ bei der Definition einer elliptischen Kurve.

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3+27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta = 108 > 0$, sodass drei voneinader verschiedene reelle Nullstellen vorliegen. Das Polynom $x^3 + 3x$ besitzt dagegen wegen $\Delta = -108 < 0$ genau eine reelle Nullstelle. In beiden Fällen ist die Diskriminante ungleich null, sodass die zugehörigen Weierstraßkurven nicht singulär sind.

3.2. Gruppenstruktur

In diesem Abschnitt wird die Gruppenoperation,also die Addition zweier Punkte auf einer elliptischen Kurve eingeführt. Zunächst wird die geometrische Konstruktion der Punktaddition über $\mathbb{R}$ erläutert. Anschließend werden daraus die Additionsformeln hergeleitet und die Gruppeneigenschaften untersucht. Die Darstellung orientiert sich an [26, S. 12–15], [22, S. 8–19, 30–31], [8, S. 179 ff.] und [2, S. 99]. Der Beweis der Wohldefiniertheit folgt [31, S. 477–481].

3.2.1. Geometrische Konstruktion der Punktaddition. Im Folgenden sei

$$E: \quad y^2 = x^3 + Ax + B$$

eine elliptische Kurve über einem Körper K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$. Zunächst wird die Addition zweier Punkte betrachtet. Seien dazu

$$P = (x_1, y_1), \qquad Q = (x_2, y_2) \in E(K).$$

Gesucht ist der Punkt $R = P + Q$. Genauer handelt es sich bei $+$ um die auf der elliptischen Kurve definierte Gruppenoperation. Zur Vereinfachung der Notation wird im Folgenden jedoch auf die ausführlichere Schreibweise $P +_E Q$ verzichtet. Zur Veranschaulichung der geometrischen Konstruktion wird zunächst ein Beispiel über den reellen Zahlen betrachtet. Hierzu sei

$$E: \quad y^2 = x^3 - 4x + 10.$$

Im ersten Schritt wird die Gerade L durch P und Q gelegt. Im zweiten Schritt wird der Schnittpunkt R' von der Gerade L und E mit der elliptischen Kurve E betrachtet. Dieser wird an der




Abbildung 2. Gerade L durch die Punkte P und Q

x-Achse gespiegelt. Der dadurch entstandene Punkt wird mit R bezeichnet und als $R = P + Q$ definiert. Dabei ist zubeachten, dass es sich bei der Addition zweier Punkte auf einer elliptischen Kurven nicht um die koordinatenweise Punktaddition handelt.




Abbildung 3. Dritter Schnittpunkt R' der Geraden L mit der Kurve E und Spiegelung an der x-Achse

Als nächstes wird der Fall betrachtet, wenn ein Punkt P auf der Kurve E auf sich selbst addiert wird. Da in diesem Fall keine Gerade durch zwei verschiedene Punkte P und Q bestimmt werden kann, wird der Fall betrachtet, dass sich Q und P annähern. Die Sekante durch P und Q geht dabei in die Tangente an E im Punkt P über.




Abbildung 4. Tangente an die Kurve E im Punkt P

Der weitere Ablauf entspricht der zuvor beschriebenen Punktaddition. Die Tangente schneidet die Kurve E in einem weiteren Punkt R'. Durch Spiegelung dieses Punktes an der x-Achse entsteht der Punkt $R = P + P = 2P$. Abschließend wird der Fall betrachtet, wenn L keinen Schnittpunkt




Abbildung 5. Spiegelung von R' und Konstruktion des Punktes $R = 2P$

mit E hat. Es wird also die Addition der Punkte P und $P' = -P$ betrachtet. Der Punkt $-P$ entsteht durch Spiegelung von P an der x-Achse. Die Gerade durch P und $-P$ ist daher vertikal.

Für diesen Fall wird der zusätzliche Punkt $\mathcal{O}$ genutzt, der als Punkt im Unendlichen bezeichnet




Abbildung 6. Schnittpunk von L im Punkt $\mathcal{O}$

wird. Jede vertikale Gerade wird so aufgefasst, dass sie die elliptische Kurve zusätzlich im Punkt $\mathcal{O}$ schneidet. Damit wird

$$P + (-P) = \mathcal{O}$$

definiert. Der Punkt $\mathcal{O}$ bildet später das neutrale Element der Gruppenstruktur. Eine genauere Beschreibung mithilfe projektiver Koordinaten erfolgt in Abschnitt 3.3.

3.2.2. Herleitung der Additionsformeln. Seien $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P_1, P_2 \neq \mathcal{O}$. Zuerst wird der Fall $P \neq Q$ und $x_1 \neq x_2$ betrachtet. Dann hat die Gerade L durch durch P_1 und P_2 die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \qquad \text{mit} \qquad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts wird die Geradengleichung in die Kurvengleichung eingesetzt

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

ein. Es gilt also

$$\big(m(x - x_1) + y_1\big)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2x^2 + \big(2m^2x_1 - 2my_1 + A\big)x + \big(B - m^2x_1^2 + 2mx_1y_1 - y_1^2\big).$$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x-Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E, also x_1, x_2 und x_3'. Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3') = x^3 - (x_1 + x_2 + x_3')x^2 + (x_1x_2 + x_1x_3' + x_2x_3')x - x_1x_2x_3'$$

Mit Kooeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x_3' = m^2 \Leftrightarrow x_3' = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $P_3' = (x_3', y_3')$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y_3' = m(x_3' - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P_1 + P_2$ ist die Spiegelung von P_3' an der x-Achse. Somit ist

$$P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x_3' = m^2 - x_1 - x_2, \qquad y_3 = -y_3' = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Ist $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$, so gilt wegen $y_1^2 = y_2^2$ notwendigerweise $y_2 = -y_1$. Die Gerade durch P und Q ist somit vertikal und schneidet die projektive Kurve im Punkt $\mathcal{O}$. Daher wird

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}$$

definiert. Wenn man nun den Punkt an der x-Achse spiegelt erhält man den gleichen Punkt in $\mathcal{O}$, daher gilt für $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Jetzt betrachtet man den Fall $P_1 = P_2 = (x_1, y_1)$. Wenn zwei Punkte auf einer Kurve sehr nah beinander sind, dann approximiert die Gerade eine Tangente. Daher wird die Gerade L durch die beiden Punkte als Tangente betrachten. Mit Hilfe der Ableitung kann man die Steigungn m von der Gerade L bestimmen

$$2y\frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \Leftrightarrow \quad m = \frac{dy}{dx} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Für den Fall $y_1 = 0$ ist die Gerade vertikal und es gilt wieder $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Daher wird der Fall $y_1 \neq 0$ betrachtet. Die Gleichung der Gerade ist in diesem Fall

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Setzt man nun die Gerade in die Kurvengleichung ein, erhält man

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B \tag{1}$$

$$0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2 \tag{2}$$

Man kennt von dieser Gleichung eine Nullstelle x_1, da es sich bei L um eine Tangente von E handelt ist x_1 eine doppelte Nullstelle. Daher kann man analog zu vorher

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1$$

rechnen. Für den Punkt im Unendlichen wird die Addition durch

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

definiert. Dies entspricht geometrisch der Tatsache, dass die vertikale Gerade durch P den zweiten affinen Schnittpunkt $-P$ besitzt und zusätzlich durch $\mathcal{O}$ verläuft. Nach Spiegelung von $-P$ an

der x-Achse wird wieder P erhalten. Diese Aussage kann erweitert werden, sodass $\mathcal{O} + \mathcal{O} = \mathcal{O}$ inkludiert ist.

Definition 3.2.1 (Punktaddition)**.** *Die Punktaddition für einen Punkt $P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$ definieren wir wie folgt:*

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \qquad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

(3) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \qquad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$ dann,

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

Zusätzlich wird festgelegt, dass

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

für alle Punkte P auf E.

Lemma 3.2.2 (Wohldefiniertheit der Punktadditon)**.** *Seien $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ Punkte aus $E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$. Dann gilt*

$$x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 \quad \text{und} \quad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

mit

$$m_{12} = m(P_1, P_2) = \begin{cases} \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{wenn } x_1 \neq x_2, \\ \dfrac{3x_1^2 + A}{2y_1}, & \text{wenn } P_1 = P_2. \end{cases}$$

Dann ist m_{12} wohldefiniert und es gilt

$$(x_3, y_3) \in E(K).$$

Beweis. Zunächst ist zu zeigen, dass die angegebene Definition von m_{12} in den angegebenen Fällen wohldefiniert ist. Für $x_1 \neq x_2$ ist der Nenner $x_2 - x_1$ von null verschieden, damit ist die Steigung der Sekante durch P_1 und P_2 wohldefiniert und es gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \in K.$$

Sei nun $x_1 = x_2$. Da $P_1, P_2 \in E(K)$ liegen, gilt mit $f(x) = x^3 + Ax + B$ zunächst

$$y_1^2 = f(x_1) = f(x_2) = y_2^2.$$

Daraus folgt $y_2 = y_1$ oder $y_2 = -y_1$. Es kann aufgrund der Voraussetzung des Lemmas nicht $y_2 = -y_1$ gelten, daher muss $y_2 = y_1$ gelten und damit auch $P_1 = P_2$. Angenommen, es gilt$y_1 = 0$,

dann gilt $y_2 = y_1 = 0 = -y_1$ und somit im Widerspruch zur Voraussetzung. Daher muss $y_1 \neq 0$ gelten. Wegen $\text{char}(K) \neq 2$ ist daher $2y_1 \neq 0$, sodass auch

$$m_{12} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1} \in K$$

wohldefiniert ist. Zur Bestimmung des summierten Punktes wird das Polynom

$$g(x) = f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 \in K[x].$$

eingeführt. Die Nullstellen von g entsprechen den x-Koordinaten der Schnittpunkte der Geraden $y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$ mit der elliptischen Kurve. Da $P_1 \in E(K)$ gilt,

$$g(x_1) = f(x_1) - (y_1 + m_{12}(x_1 - x_1))^2 = f(x_1) - y_1^2 = 0.$$

Somit ist x_1 eine Nullstelle von g. Für $x_1 \neq x_2$ gilt umgestellt $y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2$. Daher folgt

$$g(x_2) = f(x_2) - (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1))^2 = f(x_2) - y_2^2 = 0,$$

sodass auch x_2 eine Nullstelle von g ist.

Für den Fall $x_1 = x_2$, entspricht die Gerade der Tangente an E im Punkt P_1. Es ist somit zu zeigen, dass x_1 eine doppelte Nullstelle von g ist. Die Ableitung von g lautet

$$g'(x) = f'(x) - 2m_{12}\left(y_1 + m_{12}(x - x_1)\right) \in K[x].$$

Für x_1 gilt dann

$$g'(x_1) = f'(x_1) - 2m_{12}(y_1) = (3x_1^2 + A) - 2\frac{3x_1^2 + A}{2y_1}y_1 = 0.$$

Damit ist x_1 eine doppelte Nullste von g. Es lässt sich somit g in beiden Fällen in der Form

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

schreiben, wobei im Fall $x_1 = x_2$ der Fakor $(x - x_1)$ doppelt auftritt. Da g ein normiertes Polynom dritten Grades ist, kann $x_3 \in K$ durch einen Koeffizientenvergleich bestimmt werden. Es gilt

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3). \tag{3}$$

Der Koeffizient von x^2 auf der linken Seite ist $-m_{12}^2$ während der Koeffizient auf der rechten Seite $-(x_1 + x_2 + x_3)$ beträgt. Daraus folgt $-m_{12}^2 = -(x_1 + x_2 + x_0)$ und somit $x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2$. Da x_3 eine Nullstelle von g ist, gilt

$$g(x_3) = f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2 = 0.$$

Folglich ist

$$f(x_3) = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Nach Definition der Additionsformel ist

$$y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -\left(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)\right).$$

Durch Quadrieren folgt

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Damit erfüllt (x_3, y_3) die Kurvengleichung

$$y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$$

und somit gilt $(x_3, y_3) \in E(K)$. □

Damit ist die oben definierte Punktaddition abgeschlossen auf E.

Bemerkung 3.2.3. *Damit ist der nichttriviale Fall der Punktaddition wohldefiniert. Für $P_2 = -P_1$ gilt nach Definition*

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} \in E,$$

und für $P \in E$ gilt

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P \in E.$$

Somit ist die Punktaddition insgesamt abgeschlossen auf E.

Theorem 3.2.4. *Die Menge E bildet bezüglich der Punktaddition eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $\mathcal{O}$. Insbesondere gelten für alle $P_1, P_2, P_3 \in E$:*

(i) ***Neutrales Element:*** *$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$.*

(ii) ***Inverses Element:*** *Zu jedem $P \in E$ existiert $-P \in E$ mit $P + (-P) = \mathcal{O}$.*

(iii) ***Assoziativität:*** *$(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.*

(iv) ***Kommutativität:*** *$P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.*

Bemerkung 3.2.5. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{R}$ und $P = (x, y) \in E$, dann ist das Inverse Element von P definiert als $-P = (x, -y)$ und somit symmetrisch zu P an der x-Achse.*

Beweis. Die Existenz des neutralen Elements folgt unmittelbar aus Definition 3.2.1, da für alle $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

gilt.

Die Kommutativität folgt aus der Definition der Punktaddition. Es werden die in Definition 3.2.1 auftretenden Fälle unterschieden.

(1) Sei $x_1 \neq x_2$. Dann gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = m_{21}.$$

Damit stimmen die x-Koordinaten der Summen überein

$$m_{12}^2 - x_1 - x_2 = m_{21}^2 - x_2 - x_1.$$

Für die y-Koordinaten gilt

$$\begin{aligned} y_3' - y_3 &= -y_2 - m_{21}(x_3 - x_2) + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= y_1 - y_2 + m_{12}(x_2 - x_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Somit folgt $P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.

(2) Sei $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

(3) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$. Da beide Summanden identisch sind, ergibt die Tangentenformel unabhängig von der Reihenfolge dieselbe Steigung und damit denselben Summenpunkt. Also gilt

$$P_1 + P_2 = P_2 + P_1.$$

(4) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$. Dann ist $P_1 = -P_1$ und nach Definition gilt

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

Für $P = (x_1, y_1) \in E$ sei

$$-P = (x_1, -y_1).$$

Da

$$(-y_1)^2 = y_1^2,$$

liegt auch $-P$ auf E. Nach Definition der Punktaddition gilt

$$P + (-P) = \mathcal{O}.$$

Für $P = \mathcal{O}$ gilt $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Damit besitzt jedes Element ein inverses Element.

Die Assoziativität wird in Abschnitt 3.4 gesondert bewiesen. □

Beispiel 3.2.6. *Sei E eine elliptische Kurve mit*

$$y^2 = x^3 - 4x + 4$$

als Gleichung. Auf dieser Kurve liegen die Punkte $P_1 = (0, 2)$ und $P_2 = (2, 2)$. Nun soll die Summe aus P_1 und P_2 mit Hilfe der Additionsformel berechnet werden. Es ist $x_1 \neq x_2$ und daher folgt

$$m = \frac{2-2}{2-0} = 0.$$

Damit ergibt sich

$$x_3 = 0^2 - 0 - 2 = -2 \quad \textit{und} \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2.$$

Somit folgt

$$P_1 + P_2 = (0, 2) + (2, 2) = (-2, -2)$$

Nach demselben Vorgehen können weitere Punkte auf E miteinander addiert werden. Beispielsweise gilt

$$(0, 2) + (-2, -2) = (6, -14).$$

Beispiel 3.2.7. *Als Folge ist es der algebraischen Additionsformeln können auch Punkte auf elliptischen Kurven über Körpern addiert werden, für die keine vergleichbare geometrische Darstellung wie über $\mathbb{R}$ existiert. Sei dazu E die elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$ mit $E: \quad y^2 = x^3 - 4x + 4$. Zunächst ist zu überprüfen, dass die Kurve nicht singulär ist. Mit $A = -4$ und $B = 4$ gilt*

$$4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \bmod 7.$$

Da

$$4A^3 + 27B^2 \not\equiv 0 \bmod 7,$$

ist E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_7$. Nun seien $P_1 = (0, 2)$ und $P_2 = (5, 5)$ zwei Punkte aus $E(\mathbb{F}_7)$. Da $x_1 \neq x_2$ gilt, folgt mit der Additionsformel

$$m = \frac{5-2}{5-0} = \frac{3}{5} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 37 = 9 = 2 \bmod 7$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \bmod 7 \quad \textit{und} \quad y_3 = 2(0-6) - 2 = -14 \equiv 0 \bmod 7.$$

Somit folgt

$$P_1 + P_2 = (6, 0).$$

3.2.3. Skalar mal Punkt. Die Punktaddition ermöglicht die Definition ganzzahlig Vielfacher eines Kurvenpunkts. Für $P \in E(K)$ und $m \in \mathbb{N}_{>0}$ ist

$$mP = \underbrace{P + \cdots + P}_{m\text{-mal}}.$$

Zusätzlich gelten

$$0P = \mathcal{O} \qquad \text{und} \qquad (-m)P = -(mP).$$

Diese Operation wird als Skalarmultiplikation bezeichnet.

Mithilfe der Binärdarstellung von m lässt sich mP durch wiederholtes Verdoppeln und Addieren mit $\mathrm{O}(\log m)$ Gruppenoperationen berechnen. Das zugehörige Double-and-Add-Verfahren wird in Abschnitt 5.1.1 erläutert.

3.3. Projektive Ebene und der Punkt bei Unendlich

Der projektive Raum dient dazu, den Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ genauer zu definieren, da sich dieser in affinen Koordinaten nicht darstellen lässt. Um diesen Punkt geometrisch zu beschreiben, wird die affine Ebene in die projektive Ebene eingebettet. Das Kapitel basiert auf [26, S. 18–20], [4, S. 245–246], [5, S. 200–204], [28, S. 15–22] und [10, S. 9].

Definition 3.3.1 (Affine Ebene)**.** *Sei K ein Körper. Dann ist die affine Ebene über K definiert durch*

$$\mathbb{A}^2_K = K \times K = \{(x, y) \mid x, y \in K\}.$$

In affinen Koordinaten kann eine elliptische Kurve beispielsweise durch eine Gleichung der Form

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

beschrieben werden. Der Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ lässt sich jedoch nicht als Punkt $(x, y) \in \mathbb{A}^2_K$ darstellen. Aus diesem Grund wird die projektive Ebene eingeführt.

Definition 3.3.2 (Projektive Ebene)**.** *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als*

$$\mathbb{P}^2_K = \left(K^3 \setminus \{(0,0,0)\}\right) / \sim,$$

wobei für

$$(X, Y, Z), (X', Y', Z') \in K^3 \setminus \{(0,0,0)\}$$

die Äquivalenzrelation

$$(X, Y, Z) \sim (X', Y', Z')$$

genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in K^\times$ *existiert mit*

$$(X, Y, Z) = \lambda(X', Y', Z').$$

Die Äquivalenzklasse eines Tripels (X, Y, Z) *wird mit*

$$[X : Y : Z]$$

bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $[X : Y : Z]$ heißen homogene Koordinaten. Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt daher

$$[X : Y : Z] = [\lambda X : \lambda Y : \lambda Z].$$

Jedes Tripel

$$(X, Y, Z) \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

bestimmt somit einen Punkt in $\mathbb{P}^2_K$. Das Tripel $(0, 0, 0)$ ist ausgeschlossen und definiert keinen projektiven Punkt. Die affine Ebene lässt sich mit dem Teil der projektiven Ebene identifizieren, für den $Z \neq 0$ gilt. Wegen

$$[X : Y : Z] = \left[\frac{X}{Z} : \frac{Y}{Z} : 1\right]$$

besitzt jeder solche Punkt einen eindeutigen Repräsentanten mit $Z = 1$. Damit ergibt sich die Einbettung

$$\mathbb{A}^2_K \longrightarrow \mathbb{P}^2_K, \qquad (x, y) \longmapsto [x : y : 1].$$

Die Punkte mit $Z = 0$ bilden die Gerade im Unendlichen

$$L_\infty = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2_K \mid ZU = 0\}.$$

Die Punkte mit $Z \neq 0$ entsprechen dagegen den affinen Punkten. Um den Punkt im Unendlichen einer elliptischen Kurve zu bestimmen, wird die affine Weierstraßgleichung

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

homogenisiert. Für einen projektiven Punkt $[X : Y : Z]$ mit $Z \neq 0$ gilt

$$x = \frac{X}{Z}, \qquad y = \frac{Y}{Z}.$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$\left(\frac{Y}{Z}\right)^2 = \left(\frac{X}{Z}\right)^3 + A\frac{X}{Z} + B.$$

Nach Multiplikation mit Z^3 folgt

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3.$$

Damit erhält man das homogene Polynom

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3.$$

Da F homogen vom Grad 3 ist, gilt

$$F(\lambda X, \lambda Y, \lambda Z) = \lambda^3 F(X, Y, Z)$$

für jedes $\lambda \in K^\times$. Die Bedingung $F(X,Y,Z) = 0$ ist daher unabhängig von der Wahl des Repräsentanten. Für einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen gilt $Z = 0$. Einsetzen in die projektive Weierstraßgleichung liefert

$$X^3 = 0.$$

Daraus folgt

$$X = 0.$$

Da das Tripel $(0,0,0)$ ausgeschlossen ist, muss $Y \neq 0$ gelten. Wegen der Äquivalenz homogener Koordinaten kann Y auf 1 normiert werden. Somit ergibt sich

$$[0 : Y : 0] = [0 : 1 : 0].$$

Die projektive Weierstraßkurve besitzt daher genau einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Dieser Punkt wird mit

$$\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$$

bezeichnet und dient als neutrales Element der Gruppenstruktur elliptischer Kurven. Abschließend kann überprüft werden, dass der Punkt $\mathcal{O}$ nicht singulär ist.

Definition 3.3.3 (Singulärer Punkt)**.** *Sei $F \in K[X,Y,Z]$ ein von null verschiedenes homogenes Polynom und*

$$C = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}^2_K \mid F(X,Y,Z) = 0\}$$

die dadurch definierte projektive Kurve. Ein Punkt $P = [a : b : c] \in C$ heißt singulär, wenn

$$\frac{\partial F}{\partial X}(a,b,c) = \frac{\partial F}{\partial Y}(a,b,c) = \frac{\partial F}{\partial Z}(a,b,c) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt nicht singulär.

Für das homogene Polynom F gelten

$$F_X = -3X^2 - AZ^2, \qquad F_Y = 2YZ, \qquad F_Z = Y^2 - 2AXZ - 3BZ^2.$$

Am Repräsentanten $(0,1,0)$ des Punktes $\mathcal{O}$ ergibt sich

$$F_X(0,1,0) = 0, \qquad F_Y(0,1,0) = 0, \qquad F_Z(0,1,0) = 1.$$

Da nicht alle partiellen Ableitungen verschwinden, ist $\mathcal{O}$ nicht singulär.

In der projektiven Ebene schneiden sich je zwei verschiedene Geraden in genau einem Punkt. Insbesondere schneiden sich zwei parallele affine Geraden nach ihrer projektiven Erweiterung in einem Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Seien dazu

$$g_1 : ax + by + c_1 = 0 \quad \text{und} \quad g_2 : ax + by + c_2 = 0$$

zwei verschiedene parallele affine Geraden. Ihre projektiven Erweiterungen lauten

$$aX + bY + c_1 Z = 0 \quad \text{und} \quad aX + bY + c_2 Z = 0.$$

Für einen gemeinsamen Schnittpunkt folgt durch Subtraktion

$$(c_1 - c_2)Z = 0.$$




Bild 22.2 Elliptische Kurve in der projektiven Ebene

Abbildung 7. Projektiver Abschluss einer elliptischen Kurve. Quelle: übernommen aus [5, S. 202].

Da $c_1 \neq c_2$ gilt, folgt $Z = 0$. Für $Z = 0$ verbleibt die Gleichung $aX + bY = 0$. Der gemeinsame Schnittpunkt ist daher $[X : Y : Z] = [b : -a : 0]$. Insbesondere haben vertikale Geraden der Form $x = c$ die projektive Gleichung $X - cZ = 0$. Sie verlaufen somit alle durch den Punkt $[0 : 1 : 0] = \mathcal{O}$.

3.4. Beweis der Assoziativität

Der folgende Beweis orientiert sich an [31, S. 477–486]. Für den allgemeinen Fall werden zunächst explizite Koordinaten für $(P_1 + P_2) + P_3$ hergeleitet. Zusammen mit der bereits nachgewiesenen Kommutativität ergibt sich daraus die Assoziativität. Die von dieser Darstellung ausgeschlossenen Sonderfälle werden anschließend gesondert behandelt.

Im gesamten Abschnitt sei $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ eine elliptische Kurve über einem Körper K mit $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ und $4A^3 + 27B^2 \neq 0$. Zur Vereinfachung der Notation sei außerdem $f(x) = x^3 + Ax + B$.

Theorem 3.4.1. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$, dann gilt $(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.*

Doch bevor die Assoziativität bewiesen werden kann, müssen zuerst noch eine Reihe von Hilfsaussagen eingeführt werden.

Lemma 3.4.2. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Dann besitzt der Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ die Koordinaten*

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2} \quad \textit{und} \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 m(P_2, P_3) - x_3 m(P_1, P_2)}{x_1 - x_3} \quad \textit{und} \quad c_2 := \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

Hilfssatz 3.4.3. *Seien $P_1, P_2 \in E$ mit $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt $P_2 = \mathcal{O}$.*

Beweis. Zunächst sei $P_1 = \mathcal{O}$. Dann folgt unmittelbar $P_2 = \mathcal{O} + P_2 = P_1 + P_2 = P_1 = \mathcal{O}$.

Sei nun $P_2 = -P_1$. Nach Definition der Punktaddition gilt dann $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Aus der Voraussetzung $P_1 + P_2 = P_1$ folgt somit $P_1 = \mathcal{O}$ und daher ebenfalls $P_2 = -P_1 = \mathcal{O}$.

Es bleibt der Fall $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Angenommen es gilt dennoch $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt für die Summe $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ und damit $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$. Nach der Additionsformel folgt somit

$$\begin{aligned} y_1 = y_3 &= -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= -y_1 - m_{12} \cdot 0 \\ &= -y_1 \end{aligned}$$

Da $\mathrm{char}(K) \neq 2$ gilt, folgt daraus $y_1 = 0$. Aus Gleichung (3) folgt

$$\begin{aligned} f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 &= f(x) - m_{12}^2(x - x_1)^2 \\ &= (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \\ &= (x - x_1)^2(x - x_2). \end{aligned}$$

Wegen $y_1 = 0$ folgt durch Umstellen und Ausklammern

$$f(x) = (x - x_1)^2 \left(x - x_2 + m_{12}^2\right).$$

Folglich ist x_1 eine doppelte Nullstelle von f. Da zugleich $y_1 = 0$ gilt, wäre der Punkt $(x_1, 0)$ ein singulärer Punkt der Kurve E. Dies widerspricht der Voraussetzung, dass E eine elliptische und damit nichtsinguläre Kurve ist. Folglich kann dieser Fall nicht auftreten. □

Unter den Voraussetzungen von Lemma 3.4.2 seien

$$P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y}), \qquad m_{12} = m(P_1, P_2), \qquad m_{23} = m(P_2, P_3) \qquad \text{und} \qquad m_{12,3} = m(P_1 + P_2, P_3).$$

Hilfssatz 3.4.4. *Seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Außerdem ist c_2 definiert wie in Lemma 3.4.2. Dann gilt*

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1.$$

Beweis. Wie bereits im Beweis der Wohldefiniertheit der Addition 3.2.2 gezeigt wurde, gilt nach Gleichung (3)

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - \hat{x}).$$

Wenn $P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} = \frac{m_{12} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{\frac{m_{12}(x_3 - x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}. \end{aligned}$$

Da P_1 und P_2 auf derselben Geraden mit Steigung m_{12} liegen, gilt $y_2 - y_1 = m_{12}(x_2 - x_1)$, umgeformt gilt $y_2 = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)$. Einsetzen in die vorherige Darstellung von c_2 ergibt

$$c_2 = \frac{-y_3 + (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)) + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Sei nun zusätzlich $P_1 + P_2 \neq P_3$ mit $P_1 + P_2 = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (\hat{x}, \hat{y})$ gilt nach der Additionsformel $\hat{y} = -y_1 - m_{12}(\hat{x} - x_1)$. Daher folgt

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{12,3} &= m_{12} + \frac{y_3 - \hat{y}}{x_3 - \hat{x}} = m_{12} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{m_{12}(x_3 - \hat{x}) + y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}}. \end{aligned}$$

Es werden nun vier verschiedene Fälle betrachtet.

(1) Sei $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} \cdot \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{-y_3^2 + m_{12}^2(x_3 - x_1)^2 + 2m_{12}(x_3 - x_1)y_1 + y_1^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \end{aligned}$$

Da $P_3 \in E$ gilt $y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$. Mit Gleichung (3) folgt daher

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-\big(f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2\big)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})}{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(2) Sei nun $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$. Dann gilt erneut $(\hat{x}, \hat{y}) = (x_3, y_3)$ mit der Additionsformel folgt $y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$. Damit ergibt sich

$$c_2 = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-2y_3}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Durch Ableiten der Gleichung (3) erhält man

$$f'(x) - 2m_{12}\left(y_1 + m_{12}(x - x_1)\right) = (x - x_2)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - x_2).$$

Da $y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3$ gilt, folgt mit $x = x_3 = \hat{x}$ für die linke Seite

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3.$$

Setzt man in die Rechte Seite auch $x = \hat{x} = x_3$ ein, erhält man

$$(x_3 - x_2)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2) = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2).$$

Für die gesamte Gleichung ergibt das

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2).$$

Aus $P_1 + P_2 = P_3$ und der Voraussetzung $P_1 + P_2 \neq -P_3$ folgt $P_3 \neq -P_3$. Somit ist $y_3 \neq 0$, sodass die Tangengleichung angewendet werden kann $m_{12,3} = \frac{f'(x_3)}{2y_3}$. Damit gilt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3}.$$

Da außerdem $c_2 = \frac{2y_3}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}$ gilt, folgt

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{2y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \cdot \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 1$$

(3) Sei $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$, dann gilt $(x_2, y_2) = (x_3, y_3)$. Da $P_3 = P_2$ auf der Geraden durch P_1 und P_2 liegt, gilt

$$y_3 = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1).$$

Damit folgt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}}$$

Durch Ableiten der Faktorisierung und Einsetzen von $x = x_2 = x_3$ ergibt sich

$$f'(x_3) - 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x}).$$

Da

$$m(P_2, P_3) = \frac{f'(x_3)}{2y_3} \qquad \text{und} \qquad m(P_1, P_2) = m_{12},$$

folgt

$$m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2) = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3}.$$

Die Gleichung kann mit der Definition $c_2 = \frac{m(P_1,P_2)-m(P_2,P_3)}{x_1-x_3}$ umgeformt werden zu

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2)}{x_3 - x_1} \\ &= \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3(x_3 - x_1)} \\ &= \frac{x_3 - \hat{x}}{2y_3}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{x_3 - \hat{x}}{2y_3} \cdot \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}} = 1.$$

(4) Sei $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$. Dann gilt $P_1 + P_2 = P_2$. Mit der Kommutativität und Hilfssatz 3.4.3 müsste dann $P_1 = \mathcal{O}$ gelten. Dies widerspricht der Voraussetzung $P_1 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Der Fall kann somit nicht auftreten.

□

Es exestieren nun die erforderlichen Voraussetzung, um Lemma 3.4.2 zu beweisen.

Beweis. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$ wie in Lemma 3.4.2 vorausgesetzt und sei

$$P_4 = (P_1 + P_2) + P_3 = (x_4, y_4).$$

Weiter sei $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel gilt $\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$ und damit

$$x_4 = -\hat{x} - x_3 + m_{12,3}^2 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2.$$

Nach Hilfssatz 3.4.4 gilt $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$, also

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \left(\frac{1}{c_2} - m_{12}\right)^2 - m_{12}^2 \\ &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{m_{12}}{c_2}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit der in Lemma 3.4.2 angegebenen Darstellung von x_4, so ist es ausreichend, m_{12} zunächst durch c_1 und c_2 auszudrücken. Aus deren Definition folgt

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 c_2 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_1 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{12} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} \\ &= m_{12}. \end{aligned}$$

Durch Einsetzen folgt

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1 + x_1 c_2}{c_2} \\ &= -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}. \end{aligned}$$

Damit ist die behauptete Formel für x_4 gezeigt. Zur Bestimmung von y_4 wird zunächst die Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

verwendet. Für die Punkte P_2 und P_3 gilt

$$y_3 - y_2 = m_{23}(x_3 - x_2),$$

und damit

$$y_3 = y_2 + m_{23}(x_3 - x_2).$$

Aus den Definitionen von c_1 und c_2 folgt außerdem

$$\begin{aligned} m_{23} &= \frac{m_{23}(x_1 - x_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12} + x_3(m_{12} - m_{23})}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_3 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= c_1 + x_3 c_2. \end{aligned}$$

Folglich gilt

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2).$$

Die zu zeigende Gleichung kann umgeformt werden zu

$$y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) \Longleftrightarrow y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) = 0.$$

Nach Einsetzen der zuvor erhaltenen Darstellung von y_3 ergibt sich

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -(y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2)) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \end{aligned}$$

Es bleibt somit zu zeigen, dass

$$(x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) = m_{12,3}(x_4 - x_3).$$

Für die linke Seite gilt

$$\begin{aligned} &(x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \\ &= (x_4 - x_3)c_1 + \big((x_4 - x_2)x_4 - (x_3 - x_2)x_3\big)c_2 \\ &= (x_4 - x_3)\big(c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2\big). \end{aligned}$$

Aus der bereits bestimmten Formel für x_4 folgt

$$x_4 + x_3 - x_2 = x_1 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2 \qquad \text{und} \qquad c_1 + x_1c_2 = m_{12}.$$

Damit ergibt sich

$$\begin{aligned} &c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2 \\ &= m_{12} + (m_{12,3}^2 - m_{12}^2)c_2 \\ &= m_{12} + c_2(m_{12,3} - m_{12})(m_{12,3} + m_{12}) \\ &\overset{3.4.4}{=} m_{12} + m_{12,3} - m_{12} = m_{12,3}, \end{aligned}$$

Damit folgt

$$(x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) = m_{12,3}(x_4 - x_3).$$

Einsetzen in die Additionsformel für y_4 liefert schließlich

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \\ &\quad - \Big((x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2)\Big) \\ &= -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2). \end{aligned}$$

Damit ist auch die behauptete Formel für y_4 gezeigt. □

Lemma 3.4.5. *Für alle $P, P_1, P_2 \in E$ gilt,*

(a) $-(-P) = P$

(b) $-(P_1 + P_2) = (-P_1) + (-P_2)$

(c) $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2$

(d) $P_1 + P_2 = \mathcal{O} \Rightarrow P_2 = -P_1$

Beweis. (a) Sei $P = (x, y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, dann ist $-P = (x, -y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ und somit $-(-P) = -(x, -y) = (x, y) = P$. Für $P = \mathcal{O}$ gilt nach der Definition des neutralen Elementes $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$, sodass ebenfalls $-(-\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ gilt.

(b) Zunächst werden die Fälle betrachtet, in denen einer der beiden Punkte gleich $\mathcal{O}$ ist. Für $P_1 = \mathcal{O}$ gilt

$$\begin{aligned} P_1 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(\mathcal{O} + P_2) = -P_2 = \mathcal{O} + (-P_2) \\ &= (-\mathcal{O}) + (-P_2) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

Analog folgt für $P_2 = \mathcal{O}$

$$\begin{aligned} P_2 = \mathcal{O}: \quad -(P_1 + P_2) &= -(P_1 + \mathcal{O}) = -P_1 = (-P_1) + \mathcal{O} \\ &= (-P_1) + (-\mathcal{O}) = (-P_1) + (-P_2) \end{aligned}$$

Sei nun $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, es gibt darausfolgend zwei Fälle. Falls $P_2 = -P_1$ gilt, dann folgt mit Teil (a) $-P_2 = -(-P_1) = P_1$. Damit ist

$$-(P_1 + P_2) = -(P_1 + (-P_1)) = -\mathcal{O} = -\mathcal{O} = (-P_1) + P_1 = (-P_1) + (-P_2).$$

Es bleibt der Fall $P_2 \neq -P_1$. Dann gilt nach Lemma 3.2.2 $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ mit

$$x_3 = -x_1 - x_2 + m_{12}^2 \qquad \text{und} \qquad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

Weiter gilt dann $-P_1 = (x_1, -y_1)$ und $-P_2 = (x_2, -y_2)$. Damit ist dann

$$m(-P_1, -P_2) = \frac{-y_2 + y_1}{x_2 - x_1} = -m_{12}.$$

Daher hat die Summe $(-P_1)+(-P_2)$ dieselbe x-Koordinate x_3 und für die y-Koordinate gilt

$$-(-y_1) - (-m_{12})(x_3 - x_1) = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3.$$

Somit folgt

$$(-P_1) + (-P_2) = (x_3, -y_3) = -(P_1 + P_2).$$

(c) Für $P_1 = \mathcal{O}$ oder $P_2 = \mathcal{O}$ folgt die Behauptung unmittelbar. Sei also $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Falls $P_2 = -P_1$ gilt, folgt $(P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + P_2 = P_2$. Der Fall $P_1 + P_2 = P_1$ kann nach Hilfssatz 3.4.3 nicht auftreten. Sei daher $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 \neq P_1$. Wegen der Additionsfomel und der Faktorisierung aus Gleichung (3) wird $P_3 = -P_1$ gesetzt, dann ist $x_3 = x_1$ und $y_3 = -y_1$.

Falls $P_1 + P_2 \neq P_3$, folgt wie in Hilfssatz 3.4.4

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = 0.$$

Falls dagegen $P_1 + P_2 = P_3$ gilt, folgt entsprechend

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 0,$$

da $x_3 = x_1$. Somit gilt in beiden Fällen $m_{12,3} = -m_{12}$.

Mit $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$ und $\hat{x} = m_{12}^2 - x_1 - x_2$ folgt

$$x_4 = m_{12,3}^2 - \hat{x} - x_3 = m_{12}^2 - (m_{12}^2 - x_1 - x_2) - x_1 = x_2,$$

sowie

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2.$$

Damit ist $P_4 = P_2$ und somit $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_2$.

Ersetzen man P_1 durch $-P_1$, folgt mit Teil (a) und der Kommutativität

$$P_2 = ((-P_1) + P_2) + (-(-P_1)) = P_1 + (P_2 + (-P_1)).$$

Damit gilt

$$(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2.$$

(d) Wenn $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$, dann kann man (c) nutzen und schreiben

$$P_2 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + (-P_1) = -P_1.$$

□

Nun sind alle Hilfsmittel gegeben, um die Assoziativität zu beweisen.

Beweis der Assoziativität. Falls P_1, P_2 oder P_3 gleich $\mathcal{O}$ gilt, dann folgt direkt

$$P_1 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (\mathcal{O} + P_2) + P_3 = P_2 + P_3 = \mathcal{O} + (P_2 + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_2 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + \mathcal{O}) + P_3 = P_1 + P_3 = P_1 + (\mathcal{O} + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_3 = \mathcal{O}: \quad (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + \mathcal{O} = P_1 + P_2 = P_1 + (P_2 + \mathcal{O}) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Sei zunächst $P_3 = P_1$, dann gilt aufgrund der Kommutativität der Punktaddition

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_1 + P_2) = P_1 + (P_2 + P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Sei nun $P_3 = -P_1$, dann gilt nach Lemma 3.4.5 (c)

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Sei nun $P_2 = -P_1$ oder $P_2 = -P_3$. Dann gilt mit Lemma 3.4.5 (c) und der Kommutativität

$$\begin{aligned} P_2 = -P_1: \quad & (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + (-P_1)) + P_3 = \mathcal{O} + P_3 = P_3 \\ & = P_1 + (P_3 + (-P_1)) = P_1 + ((-P_1) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3) \\ P_2 = -P_3: \quad & (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + (-P_3)) + P_3 = P_3 + (P_1 + (-P_3)) \\ & = P_1 = P_1 + \mathcal{O} = P_1 + ((-P_3) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3). \end{aligned}$$

Als nächsten Fall wird $P_1 + P_2 = -P_3$ betrachtet, durch Anwenden von den Hilfseigenschaften 3.4.5 kann man herausfinden, dass

$$P_2 + P_3 \overset{(a)}{=} P_2 + (-(-P_3)) = P_2 + (-(P_1 + P_2)) \overset{(b)}{=} P_2 + ((-P_1) + (-P_2)) \overset{(c)}{=} -P_1$$

gilt. Damit folgt dann

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (-P_3) + P_3 = \mathcal{O} = P_1 + (-P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Für den letzten Fall seien $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1$, $P_2 \neq -P_1$, $P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Das stimmt genau mit den Bedingungen für Lemma 3.4.2 überein. Zuvor wurde gezeigt, dass

$$P_1 + P_2 = -P_3 \quad \Longleftrightarrow \quad P_2 + P_3 = -P_1.$$

Somit folgt aus $P_1+P_2 \neq -P_3$ auch $P_2+P_3 \neq -P_1$, sodass die Voraussetzungen von Lemma 3.4.2 auch nach Vertauschen von P_1 und P_3 erfüllt sind. Denn unter der Vertauschung von P_1 und P_3 bleiben die Größen c_1 und c_2 unverändert. Da die in Lemma 3.4.2 erhaltenen Formeln $P_4 = (x_4, y_4)$ damit unter der Vertauschung von P_1 und P_3 unverändert bleiben, folgt

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1.$$

Mit der Kommutativität der Punktaddition folgt schließlich

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_2 + P_3).$$

□

Bemerkung 3.4.6 (Geometrische Interpretation)**.** *Sei $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Die Gerade durch P_1 und P_2 wird durch*

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$$

beschrieben. Für $P_1 \neq P_2$ handelt es sich um eine Sekante der elliptischen Kurve, für $P_1 = P_2$ um die Tangente im Punkt P_1. In beiden Fällen besitzt die Gerade einen dritten Schnittpunkt mit E. Dessen Spiegelung an der x-Achse ergibt den Summenpunkt $P_1 + P_2$. Für die Betrachtung der Summe dreier Punkte wird diese geometrische Idee erweitert. Anstelle einer Geraden wird eine Parabel

$$p(x) = y_2 + (x - x_2)(c_1 + xc_2).$$

betrachtet. ie Koeffizienten dieser Parabel werden dabei durch die Größen c_1 und c_2 aus Lemma 3.4.2 bestimmt. Aus den bereits gezeigten Beziehungen

$$c_1 + x_1c_2 = m_{12} \qquad \text{und} \qquad c_1 + x_3c_2 = m_{23}$$

folgt

$$p(x_1) = y_1, \quad p(x_2) = y_2, \quad p(x_3) = y_3.$$

Die Parabel verläuft somit durch die drei Punkte P_1, P_2 und P_3. Für $P_4 = (x_4, y_4) = (P_1+P_2)+P_3$ gilt nach demselben Lemma $p(x_4) = -y_4$. Somit liegt auch $-P_4$ auf der Parabel.

3.5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

Elliptische Kurven können grundsätzlich auch über Körpern der Charakteristik 2 oder 3 definiert werden. Die in den vorherigen Abschnitten verwendete kurze Weierstraßform

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

stellt jedoch nur für $\mathrm{char}(K) \neq 2, 3$ eine allgemeine Normalform dar. Da insbesondere Körper der Charakteristik 2 für kryptographische Implementierungen von Bedeutung sind, wird dieser Fall im Folgenden kurz betrachtet. Insbesondere Binäre Körper $\mathbb{F}_{2^m}$ sind für Implementierungen kryptographischer Verfahren von besonderem Interesse, da ihre Arithmetik gut an die binäre Arbeitsweise digitaler Rechner angepasst ist. Auf Charakteristik 3 wird nicht weiter eingegangen. Der Abschnitt basiert auf [26, S.47–49] und vgl. [22, S.47].

Satz 3.5.1. *Eine elliptische Kurve E über einem Körper K mit* $\mathrm{char}(K) = 2$ *mit kurzen Weierstraßgleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ ist stets singulär. Daher muss für elliptische Kurven in Charakteristik* 2 *die allgemein Weierstraßgleichung verwendet werden*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x,y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singulär, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x. Wählen ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt die Kurve ist singulär. □

Die geometrische Definition der Punktaddition bleibt erhalten. Die geometrische Definition der Punktaddition bleibt erhalten. Für zwei Punkte $P_1, P_2 \in E$ wird die Gerade durch P_1 und P_2 beziehungsweise für $P_1 = P_2$ die Tangente betrachtet. Ihr dritter Schnittpunkt mit E sei P_3'. Dann wird

$$P_1 + P_2 = -P_3'$$

definiert. Für die allgemeine Weierstraßgleichung ist das inverse Element gegeben durch

$$-(x,y) = (x, -a_1x - a_3 - y).$$

Da in Charakteristik 2 für jedes $a \in K$ die Gleichheit $-a = a$ gilt, vereinfacht sich dies zu

$$-(x,y) = (x, y + a_1x + a_3).$$

Zusammen mit dem Punkt $\mathcal{O}$ bilden die Punkte der Kurve auch in Charakteristik 2 eine abelsche Gruppe. Der Beweis der Assoziativität verläuft analog zum Beweis im vorangegangenen Kapitel.

3.5.1. Punktverdopplung in Charakteristik 2. Die Skalarmultiplikation nP ist eine zentrale Operation in kryptographischen Verfahren auf elliptischen Kurven und soll daher auch in Charakteristik 2 möglich sein. Es gibt hierbei zwei Fälle zu unterscheiden.

(1) Sei $E : y_2 + xy = x^3 + a_2x^2 + a_6$ in Charakteristik 2 kann die Gleichung auch in der Form $y_2 + xy + x^3 + a_2x^2 + a_6 = 0$ geschrieben werden. Durch implizites Differenzieren folgt

$$xy' + (y + x^2) = 0.$$

Für $P = (x_0, y_0)$ mit $x_0 \neq 0$ besitzt die Tangente die Steigung $m = \frac{(y_0 + x=^2)}{x_0}$. Der Schnittpunkte der Gerade $y = m(x - x_0) + y_0 = mx + b$ und E ist (x_1, y_1). Es gilt

$$0 = (mx+b)^2 + x(mx+b) + x^3 + a_2x^2 + a_6 = x^3 + (m^2 + m + a_2)x^2 + \cdots .$$

Die Summe $x_0 + x_0 + x_1$ der Wurzeln ist $m^2 + m + a_2$, dadurch erhält man mit $y_0^2 = x_0y_0 + x_0^3 + a_2x_0^2 + a_6$

$$x_1 = m^2 + m + a_2 = \frac{y_0^2 + x_0^4 + x_0y_0 + x_0^3 + a_2x_0^2}{x_0^2} = \frac{x_0^4 + a_6}{x_0^2}$$

Da gilt $-(x,y) = (x, x+y)$, folgt für $2P = (x_2, y_2)$ mit

$$X_2 = \frac{x_0^4 + a_6}{x_0^2} \quad \text{und} \quad y_2 = -x_1 - y_1 = x_1 + y_1.$$

(2) Sei $E : y^2 + a_3 y = x^3 + a_4 x + a_6$ in Charakteristik 2 kann die Gleichung geschrieben werden als $y^2 + a_3 y + x^3 + a_4 x + a_6 = 0$. Durch implizites Differenzieren folgt

$$a_3 y' + (x^2 + a_4) = 0.$$

Daher ist die Gerade L

$$y = m(x - x_0) + y_0 \quad \text{mit} \quad m = \frac{x_0^2 + a_4}{a_3}.$$

Geht man analog wie im vorherigen Fall vor, findet man den Schnittpunkt (x_1, y_1) von L und E mit

$$x_1 = m^2 = \frac{x_0^4 + a_4^2}{a_3^2} \quad \text{und} \quad y_1 = m(x_1 - x_0) + y_0.$$

Damit gilt für $2P = (x_2, y_2)$

$$x_2 = \frac{(x_0^4 + a_4^2)}{a_3^2} \quad \text{und} \quad y_2 = a_3 + y_1.$$

Kapitel 4

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

Für kryptographische Verfahren betrachtet man elliptische Kurven über endlichen Körpern. Dort lassen sich die Körperoperationen exakt ausführen, und die Kurvenpunkte bilden eine endliche Gruppe. In diesem Kapitel werden zunächst endliche Körper und die Punktgruppe elliptischer Kurven untersucht. Anschließend werden Eigenschaften und Verfahren behandelt, die für die Auswahl geeigneter Kurven wichtig sind. Wo die Charakteristik des Körpers weder 2 noch 3 ist, wird die bereits eingeführte kurze Weierstraß-Gleichung verwendet.

4.1. Endliche Körper

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zu endlichen Körpern gelegt. Die Darstellung orientiert sich an Stroth und Waldecker [25, S. 66–67, 163–164], Karpfinger [9, S. 46, 317–318, 391–392], [15, S. 230],sowie Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 279 f.].

Definition 4.1.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$(Galois Field) bezeichnet.*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf. Der kleinste Durchschnitt P aller Teilkörper von K wird der **Primkörper** genannt

$$P = \cap\{U | U \text{ist ein Teilkörper von } K\}.$$

Satz 4.1.2. *Seien K ein Körper und K_0 der Primkörper von K.*

(1) Ist $\mathrm{char}(K) = 0$*, so ist K_0 zu $\mathbb{Q}$ isomorph.*

(2) Ist $\mathrm{char}(K) = p \neq 0$*, so ist K_0 zu $\mathbb{Z}/p \cdot \mathbb{Z}$ isomorph.*

Hat K die Charakteristik 0, so ist der Primkörper von K zu $\mathbb{Q}$ isomorph. Ist die Charakteristik $p \neq 0$, so ist er zu $\mathbb{Z}/p$ isomorph.

Beweis. (1) Sei $\Phi : \mathbb{N} \leftarrow K_0$ eine Abbildung für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei

$$n^{\Phi} = (1_k + \cdots + 1_k). \quad \text{n-mal.}$$

Sind $n, m \in \mathbb{N}$ und $n \leq m$ mit der Eigenschaft $n^\psi = m^\psi$, so folgt

$$0_K = n^\psi - m^\psi = (1_K + \cdots + 1_K). \quad \text{(n-m)-mal.}$$

Da $\text{char}(K) = 0$ ist, dann $n = m$. Also ist ψ eine injektive Abbildung. Somit besitzt jede K_0 eine Teilmenge, die sich bezüglich der Addition wie $\mathbb{N}$ verhält. Da K_0 ein Körper ist, gibt es also in K_0 einen zu $\mathbb{Z}$ isomorphen Teilring und dann auch einen zu $\mathbb{Q}$ isomorphen Teilkörper. Da $\mathbb{Q}$ keine echten Teilkörper hat, ist K_0 selbst isomorph zu $\mathbb{Q}$.

(2) Seien nun p eine Primzahl und $\text{char}(K) = p$. Sei weiter

$$L = 0_K, 1_K, \ldots, 1_k + \cdots + 1_K \quad \text{(p-1)-mal}$$

Da $\text{char}(K) = p$ ist, sind die Elemente in L paarweise verschieden und daher ist $|L| = p$, außerdem ist L unter Addition abgeschlossen.

□

Satz 4.1.3. *Sei K ein endlicher Körper. Dann gibt es eine Primzahl p und ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $|K| = p^n$ ist.*

Beweis. Da K endlich ist, müssen in der Folge

$$0,\ 1_K,\ 1_K + 1_K,\ 1_K + 1_K + 1_K,\ \ldots$$

zwei Elemente übereinstimmen. Daher gibt es eine kleinste positive natürliche Zahl p mit

$$p \cdot 1_K = 0.$$

Diese Zahl ist die Charakteristik von K.

Die Zahl p ist eine Primzahl. Wäre nämlich $p = rs$ mit $1 < r, s < p$, so wäre

$$(r \cdot 1_K)(s \cdot 1_K) = p \cdot 1_K = 0.$$

Da ein Körper keine Nullteiler besitzt, müsste $r \cdot 1_K = 0$ oder $s \cdot 1_K = 0$ gelten. Dies widerspricht der Minimalität von p.

Der von 1_K erzeugte Primkörper besitzt somit p Elemente und ist isomorph zu $\mathbb{F}_p$. Folglich ist K ein Vektorraum über $\mathbb{F}_p$. Da K endlich ist, besitzt dieser Vektorraum eine endliche Dimension n.

Bezüglich einer Basis besitzt jedes Element von K eine eindeutige Darstellung

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n \qquad \text{mit } a_i \in \mathbb{F}_p.$$

Für jeden der n Koeffizienten gibt es p Möglichkeiten. Daher gilt

$$|K| = p^n.$$

□

Lemma 4.1.4. *Für einen endlichen Körper K der Charakteristik p mit $q = p^n$ gilt*

$$a^q = a$$

für jedes $a \in K$.

Beweis. Für $a = 0$ ist die Aussage unmittelbar erfüllt, da $0^{p^n} = 0$. Sei daher $a \in K^\times = K \setminus \{0\}$. Wegen $|K^\times| = p^n - 1$ gilt nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 $\operatorname{ord}(a) \mid |K^\times| = p^n - 1$. Also exestiert ein $r \in \mathbb{N}$ mit $p^n - 1 = r \operatorname{ord}(a)$. Da $a^{\operatorname{ord}(a)} = 1$ gilt, folgt

$$a^{p^n - 1} = a^{r \operatorname{ord}(a)} = \left(a^{\operatorname{ord}(a)}\right)^r = 1.$$

Damit folgt dann $a^{p^n} = a$. **Todo**

nach dem kleinen Satz von Fermat [9, S .46] gilt in einer endlichen Gruppe G, $a^{|G|} = e$ für alle $a \in G$. Dann $a^{p^n - 1} = 1$ für jedes $a \in K^\times$. Daraus folgt dann $a^{p^n} = a$ für alle $a \in K$. □

Diese Aussage kann nun auch noch in beide Richtungen formuliert werden, da wir sie später bei einem Beweis benötigen.

Lemma 4.1.5. *Für $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$ gilt*

$$a^q = a \Leftrightarrow a \in \mathbb{F}_q$$

Beweis. Nach dem vorherigen Lemma gilt für jedes $a \in \mathbb{F}_q$, dass $a^q = a$, also $a^q - a = 0$. Somit sind die q Elemente von $\mathbb{F}_q$ verschiedene Nullstellen des Polynoms $f(X) = X^q - X$.

Da f den Grad q besitzt, hat es auch über dem algebraischen Abschluss $\overline{\mathbb{F}}_q$ höchstens q verschiedene Nullstellen. Seine Nullstellen sind daher genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$. Folglich gilt für jedes $a \in \overline{\mathbb{F}}_q$:

$$a^q = a \quad \Longleftrightarrow \quad a \in \mathbb{F}_q.$$

□

Lemma 4.1.6. *Seien p eine Primzahl, $n \in \mathbb{N}$ und $q = p^n$. Sei Körper K der Charakteristik $p > 0$. Sind $a, b \in K$, so ist*

$$(a + b)^q = a^q + b^q.$$

Beweis. Seien p eine Primzahl, $n \geq 1$ und $q = p^n$. Für alle $a, b \in K$ gilt nach dem binomischen Lehrsatz gilt

$$(a + b)^p = \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} a^{p-i} b^i = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} b + \cdots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1} + b^p$$

Für $1 \leq i \leq p - 1$ ist

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

durch p teilbar. Denn der Zähler enthält den Faktor p, wobei der Nenner diesen nicht enthält. Da K Charakteristik p hat, verschwinden somit alle mittleren Summanden. Es folgt

$$(a + b)^p = a^p + b^p.$$

Wendet man diese Gleichung n-mal an, erhält man $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ □

Definition 4.1.7 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$)**.** *Sei $p > 3$ eine Primzahl mit $q = p^r$. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{F}_q$ mit*

$$y^2 \equiv x^3 + Ax + B \pmod{p}$$

und einem Punkt im Unendlichen.

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

gilt. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper der Charakteristik 2 und 3 haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werrden muss.

4.2. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

In diesem Kapitel wird der Frage nachgeganngen wie die Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ entsteht und wie man ihre Größe bestimmen kann. Die Darstellung dieses Abschnitts orientiert sich an Washington [26, S. 77–79, 95 und 104–105], Silverman [22, S. 29], Müller-Stach und Piontkowski [14, S. 51 ff.] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 285 f.].

4.2.1. Explizite Punktbestimmung. Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Um nun die Punkte von E zu erhalten, berchnen wir zuerst $x^3 + x + 1 \mod 5$ und anschließend die Quadratwurzel von diesem Polynom über F_5.

x	$x^3 + x + 1$	y	Points
0	1	$\pm$ 1	(0,1), (0,4)
1	3	-	-
2	1	$\pm$ 1	(2,1),(2,4)
3	1	$\pm$1	(3,1), (3,4)
4	4	$\pm$2	(4,2),(4,3)

Es gilt $-1 \equiv 4 \mod 5$ und $-2 \equiv 3 \mod 5$ und für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in F_5. Also lässt sich die Ordnung der Gruppe durch Punktzählung bestimmen,

$$\mid E(\mathbb{F}_5) \mid = \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_5 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Nun soll die Addition von zwei Punkte $P_1 = (3, 1)$ und $P_2 = (2, 4)$ mit Hilfe der Gruppengesetze aus Kapitel 3 auf $E(\mathbb{F}_q)$ durchgeführt werden

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \mod 5.$$

Es ist also $y = 2(x - 3) + 1 \equiv 2x$. Wenn wir dass nun in die Gleichung für die Kurve einsetzen erhalten wir

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1.$$

Wir kennen schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$, da $(3, 1)$ und $(2, 4)$ auf der Gerade und Kurve liegen. Da das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt,

$$3 + 2 + r \equiv 4 \mod 5 \Leftrightarrow r \equiv 4 \mod 5$$

Also ist die dritte Koordinate $x = 4$, nun erhalten wir $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse erhält man die Summe

$$(3, 1) + (2, 4) = (4, 2)$$

4.2.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol. Für die Punktbestimmung muss die Gleichung $y^2 \equiv a \mod p$ oft gelöst werden und somit ein quadratischer Rest Modulo bestimmt werden. Bei kleinen Primzahlen ist das noch durch überlegen und ausprobieren recht einfach möglich, doch bei größeren Resten wird das deutlich problematischer. Es gibt aber ein praktisches Werkzeug um zu bestimmen ob eine Zahl ein quadratischer Rest ist oder nicht, das Legendre-Symbol.

Definition 4.2.1 (Legendre-Symbol)**.** *Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist}, \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist}, \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingeganngen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. Denn $y^2 = x^3 + Ax + B$ In [14] S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste nachgelesen werden und effiziente Methoden sowie die Beweise dazu gefunden werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über alle endlichen Köprer $\mathbb{F}_q$.

Definition 4.2.2. *Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir*

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt}, \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt}, \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Diese Definition kann dann genutzt werden um eine erste Berechnung der Punktmenge zu ermöglichen.

Theorem 4.2.3. *Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

$$\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)$$

Beweis. Sei $x \in \mathbb{F}_q$ fest und sei $a \in \mathbb{F}_q$ eine Lösung der Weierstraßgleichung $a = x^3 + Ax + B$. Da q ungerade ist, besitzt $y^2 = a$ genau zwei Lösungen in $\mathbb{F}_q$, wenn a ein von null verschiedenes Quadrat ist, genau eine Lösung, wenn $a = 0$ ist, und keine Lösung, wenn a kein Quadrat ist. Die Anzahl der Punkte mit erster Koordinate x beträgt daher

$$1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

Durch Summieren über alle $x \in \mathbb{F}_q$ und Hinzufügen des Punktes im Unendlichen $\mathcal{O}$ folgt

$$\#E(\mathbb{F}_q) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(1 + \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right)\right) = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q}\right).$$

□

Beispiel 4.2.4. *Es sei E eine elliptische Kurve über dem Köprer $\mathbb{F}_{11}$ mit $y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$. Es sollen alle Punkte auf der Kurve berechnet werden. Es wird zuerst Gruppenordnung berechnet.*

$$\#E(\mathbb{F}_{11}) = 11 + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}}\right).$$

Für $x = 0, 2, 5, 7, 10$ ist $x^3 + x + 5$ ein Quadrat in $\mathbb{F}_{11}$; für die übrigen sechs Werte ist es ein Nichtquadrat. Keiner der Werte ist null. Somit gilt

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_{11}} \left(\frac{x^3 + x + 5}{\mathbb{F}_{11}}\right) = 5 - 6 = -1$$

und daher $\#E(\mathbb{F}_{11}) = 12 - 1 = 11$. Da 11 prim ist, erzeugt jeder Punkt außer $\mathcal{O}$ die Gruppe. Wir wählen $P = (0, 4)$ und berechnen seine Vielfachen.

$2P = (0,4) + (0,4) = (5,5)$	$6P = (7,5)$	$10P = (0,7)$
$3P = 2P + P = (10,5)$	$7P = (2,2)$	$11P = \infty$
$4P = (2,9)$	$8P = (10,6)$	$12P = (0,4)$
$5P = (7,6)$	$9P = (5,6)$	$13P = (5,5)$

Wie man sieht beginnt nun die Aufzählung von neuem und es handelt sich daher um eine zyklische Gruppe.




Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$, eigene Darstellung

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

4.2.3. Struktur der Punktgruppe und Torsionspunkte. Im vorigen Beispiel hat $E(\mathbb{F}_{11})$ Primzahlordnung und ist deshalb zyklisch. Für eine allgemeine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ muss die Punktgruppe jedoch nicht zyklisch sein. Um ihre mögliche Struktur zu beschreiben, betrachten wir zunächst Punkte, deren Vielfaches der neutrale Punkt $\mathcal{O}$ ist. Um das diskrete Logarithmus für ein Kryptosystem aufzubauen, müssen wir die Ordnung von einer Gruppe kennen. Dies ist deutlich herausfordernder als das Berechnen des eben gezeigten Beispiels, bei dem extra eine passende Kurve gewählt wurde. Da zuerst überprüft werden muss ob zu einem x Wert der berechnete Wert auch einen quadratischen Rest hat und damit der Punkt exestiert. Hierfür wird der Begriff der Torsionspunkte eingeführt.

Definition 4.2.5 (n-Torsionspunkte)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und $n \in \mathbb{N}$. Die Menge*

$$E[n] = \{P \in E(\overline{K}) \mid [n]P = \mathcal{O}\}$$

heißt die Gruppe der n-Torsionspunkte von E.

Beispiel 4.2.6. *Sei E eine elliptische Kurve über K mit Charakteristik ungleich 2 und 3. Es soll nun die Menge $E[2]$ bestimmt werden. Es kann die Weierstraßgleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ umgeschrieben werden als*

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3), \quad e_1, e_2, e_3 \in \overline{K}$$

Dann ist

$$E[2] = \{p \in \overline{K} \mid 2 \cdot P = \mathcal{O}\}$$

genau die Punkte, deren y-Werte verschwinden. Daher gilt dann

$$E[2] = \{\mathcal{O}, (e_1, 0), (e_2, 0), (e_3, 0)\} \quad \textit{und} \quad E[2] \simeq \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$$

Theorem 4.2.7. *Sei E eine elliptische Kurve über einem Körper K und sei $n \in \mathbb{N}$. Es ist* $\mathrm{char}(K) = p$*, falls nun $p \nmid n$ oder* $\mathrm{char}(K) = 0$*, dann gilt*

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n.$$

Wenn $\mathrm{char}(K) = p > 0$ *ist und $p \mid n$, dann schreibt man $n = p^r n'$ mit $p \nmid n'$. Dann ist*

$$E[n] \cong \mathbb{Z}_{n'} \oplus \mathbb{Z}_{n'} \quad \textit{oder} \quad E[n] = Z_n \oplus \mathbb{Z}_{n'}$$

Beweis. Der Beweis hierzu ist sehr langwierig und findet sich daher in [26] III Abschnitt 3.2. □

Satz 4.2.8 (Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen)**.** *Sei G eine endlich erzeugte abelsche Gruppe dann gilt,*

$$G \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_k}, \quad n_1, \ldots n_k \in \mathbb{Z}$$

und es gilt $n_i \mid n_{i+1}$ für alle $1 \geq i \geq k - 1$.

Beweis. Ein Beweis kann in [9] Satz 10.4, S.147 gefunden werden. □

Theorem 4.2.9. *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,*

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \text{ oder } E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für beliebige $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$. Also dann ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_q)$ immer eine zyklische Gruppe oder das Produkt von zwei zyklischen Gruppen.

Beweis. Nach dem Hauptsatz über endliche abelsche Gruppen 4.2.8 ist die endliche abelsche Gruppe $E(\mathbb{F}_q)$ isomorph zu einem direkten Summe von zyklischen Gruppen $E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$, wobei $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es werden nun die n_1-Torsionspunkte betrachtet, also alle Punkte P für die gilt $n_1 P = \mathcal{O}$. Diese bilden die Gruppe

$$E(\mathbb{F}_q)[n_1] = \{P \in E(\mathbb{F}_q) \mid n_1 P = \mathcal{O}\}.$$

Da $n_1 \mid n_i$ für jedes i gilt, besitzt jeder Faktor $\mathbb{Z}_{n_i}$ genau n_1 Elemente, die durch Multiplikation mit n_1 auf das neutrale Element abgebildet werden. Da insgesamt r Faktoren vorhanden sind, folgt $\#E(\mathbb{F}_q)[n_1] = n_1^r$. Es ist aber $E(\mathbb{F}_q) \subset E[n_1]$. Nach Theorem 4.2.7 besitzt $E[n_1]$ höchstens n_1^2 Elemente. Somit gilt

$$n_1^r = \#E(\mathbb{F}_q)[n_1] \leq \#E[n_1] \leq n_1^2.$$

Für $n_1 > 1$ folgt daraus $r \leq 2$ und somit kann $E(\mathbb{F}_q)$ aus höchstens zwei nichttrivialen zyklischen Faktoren bestehen. Daher gilt

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \quad \text{oder} \quad E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}, \qquad n_1 \mid n_2.$$

□

4.3. Frobenius-Endomorphismen und die Hasse-Schranke

In diesem Abschnitt werden zunächst Isogenien und Endomorphismen eingeführt.Über ihre Kerne und Grade lässt sich die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ mit dem Frobenius-Endomorphismus in Verbindung bringen. Dies führt zum Satz von Hasse, der die Punktzahl durch $q + 1 \pm 2\sqrt{q}$ eingrenzt. Anschließend werden die Frobenius-Spur und Supersingularität betrachtet. Die Darstellung orientiert sich an Silverman [23, S. 67, 72 f., 79, 85 und 138] [22, S. 100], Washington [26, S. 52, 98–102, 126–127 und 130–139],Werner [28, S. 60–73], sowie . Für die kryptographische Einordnung wird Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 287] herangezogen- Für den Beweis der Hasse Schranke wird etwas Analysis benötigt aus Pöschel[17, S. 115].

4.3.1. Isogenien.

Definition 4.3.1 (Isogenien)**.** *Seien E_1 und E_2 elliptische Kurven über einem Körper K. Eine Isogenie von E_1 nach E_2 ist ein Morphismus*

$$\phi : E_1 \to E_2 \qquad \textit{mit} \qquad \phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}.$$

Die Kurven E_1 und E_2 heißen isogen, wenn eine von null verschiedene Isogenie zwischen ihnen existiert, d.h. $\phi(E_1) \neq \{\mathcal{O}\}$

Beispiel 4.3.2. *Für jedes $m \in \mathbb{Z}$ definiert man die Multiplikationsabbildung*

$$[m] : E \to E.$$

Für $m > 0$ gilt

$$[m](P) = \underbrace{P + \cdots + P}_{m\text{-mal}}.$$

$[m]$ ein Morphismus ist. Für $m = 1$ gilt $[1] = \mathrm{id}_E$, also ist $[1]$ ein Morphismus. Sei nun $[m]$ ein Morphismus. Dann gilt

$$[m+1] = \mu \circ ([m], \mathrm{id}_E),$$

wobei $\mu : E \times E \to E$, $(P, Q) \mapsto P + Q$, nach [23, III, Theorem 3.6, S. 64] ein Morphismus ist. Für $m < 0$ gilt

$$[m](P) = [-m](-P).$$

Da die Negationsabbildung ebenfalls ein Morphismus ist, ist $[m]$ auch für negative m ein Morphismus. Schließlich gilt für jedes $m \in \mathbb{Z}$ die Gleichung $[m](\mathcal{O}) = \mathcal{O}$. Daher ist $[m] : E \to E$ eine Isogenie.

Für eine Isogenie $\phi : E \to E$ und eine rationale Funktion $f : E_2 \to K$ in $K(E_2)$ ist die Verknüpfung

$$\phi^* : E_1 \longrightarrow K, \qquad f \longmapsto f \circ \phi.$$

eine rationale Funktion in $K(E_1)$.

Definition 4.3.3 (Grad einer Isogenie)**.** *Sei $\phi : E_1 \to E_2$ eine Isogenie. Der Grad von ϕ ist der Grad der Körpererweiterung $K(E_1)/\phi^*(K(E_2))$,*

$$\deg \phi = [K(E_1) : \phi * (K(E_2))]$$

Für die Isogenie $[0] : E_1 \to E_2, P \mapsto \mathcal{O}$ setzt man $\deg[0] = 0$. Eine Isogenie heißt separabel oder inseparabel, wenn ihre Körpererweiterung separabel oder inseparabel ist.

Lemma 4.3.4. *Sei $\phi : E_1 \to E_2$ eine von null verschiedene seperable Isogenie zwischen zwei elliptischen Kurven über K. Dann gilt*

$$\# \ker \phi = \deg \phi,$$

wobei der Kern auf den Punkten über $\overline{K}$ betrachtet wird.

Beweis. Der Beweis hierfür lässt sich in [23], S.72f. Theorem III.4.10. (c) finden. □

4.3.2. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 4.3.5 (Frobenius Abbildung)**.** *Sei E eine elliptische Kurve, gegeben durch eine Weierstraßgleichung über $\mathbb{F}_q$, wobei $q = p^r$ eine Primzahlpotenz ist. Die Abbildung*

$$\phi_q : E(\overline{\mathbb{F}}_q) \to E(\overline{\mathbb{F}}_q), \qquad (x, y) \mapsto (x^q, y^q), \qquad ,$$

mit

$$\phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O},$$

heißt Frobenius-Abbildung.

Lemma 4.3.6. *Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt*

(1) $\phi_q(x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$.

(2) $(x, y) \in E(\mathbb{F}_q)$, genau dann wenn $\phi_q(x, y) = (x, y)$.

Beweis. Sei $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Damit liegt er auf der Kurve, es wird hier die allgemine Weierstraßgleichung verwendet, da der Beweis genau gleich ist.

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

mit $a_i \in \mathbb{F}_q$. Nun wird die gesamte Gleichung zur q-ten Potenz erhoben

$$(y^2 + a_1xy + a_3y)^q = (x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6)^q$$

Da $\text{char}(\mathbb{F}_q) = p$ und $q = p^r$ gilt, folgt aus dem binomischen Lehrsatz $(a+b)^p = a^p + b^p$. Durch r-malige Anwendung erhält man $(a+b)^q = a^q + b^q$.

$$(y^q)^2 + a_1^q(x^qy^q) + a_3^qy^q = (x^q)^3 + a_2^q(x^q)^2 + a_4^qx^q + a_6^q$$

Wegen Lemma 4.1.4 gilt $a^q = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_q$ und daraus folgt

$$(y^q)^2 + a_1(x^qy^q) + a_3^qy^q = (x^q)^3 + a_2^q(x^q)^2 + a_4^qx^q + a_6^q$$

Also enthält die Kurvengleichung auch x^q, y^q und damit gilt $\phi(P) = (x^q, y^q) \in E$. Für $\mathcal{O}$ gilt nach Definition $\phi(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ und damit gilt die Aussage direkt, somit ist die erste Aussage bewiesen.

Sei erneut $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$, dann gilt mit Lemma 4.1.4

$$x \in \mathbb{F}_q \iff x^q = x \quad \text{und} \quad y \in \mathbb{F}_q \iff y^q = y.$$

Daher folgt

$$\begin{aligned}(x,y) \in E(\mathbb{F}_q) &\iff x, y \in \mathbb{F}_q \\ &\iff x^q = x \text{ und } y^q = y \\ &\iff \phi_q(x,y) = (x,y)\end{aligned}$$

Für $\mathcal{O}$ gilt dies ebenfalls. □

Lemma 4.3.7. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht seperabel.*

Beweis. Die Frobenius-Abbildung $\phi_q(x,y) = (x^q, y^q)$ ist ist durch Polynome und damit insbesondere durch rationale Funktionen gegeben. Es bleibt zu zeigen, dass sie ein Gruppenhomomorphismus ist. Seien $P_1 = (x_1, y_1), P_2 = (x_2, y_2) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ mit $x_1 \neq x_2$ und $P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$. Nach den den Additionsformeln 3.2.1 gilt

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Erhebt man die Gleichungen zur q-ten Potenz, so erhält man mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = m'^2 - x_1^q - x_2^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q, \quad \text{mit } m' = \frac{y_2^q - y_1^q}{x_2^q - x_1^q}$$

Dies sind genau die Additionsformeln für die Punkte $\phi_q(P_1)$ und $\phi_q(P_2)$. Somit gilt

$$\phi_q(P_1 + P_2) = \phi_q(P_1) + \phi_q(P_2).$$

Ist $P_2 = -P_1$, so gilt $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$. Da

$$\phi_q(-P_1) = -\phi_q(P_1)$$

und $\phi_q(\mathcal{O}) = \mathcal{O}$ gilt, bleibt die Homomorphieeigenschaft auch in diesem Fall erhalten. Ebenso ist der Fall, dass einer der Punkte $\mathcal{O}$ ist, wegen $P + \mathcal{O} = P$ unmittelbar erfüllt. Es bleibt die Verdopplung eines Punktes $P_1 = (x_1, y_1)$ mit $y_1 \neq 0$. Für $2P_1 = (x_3, y_3)$ gilt

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Nach erheben zur q-ten Potenz folgt erneut mit Lemma 4.1.6

$$x_3^q = {m'}^2 - 2x_1^q, \quad y_3^q = m'(x_1^q - x_3^q) - y_1^q \quad \text{mit } m' = \frac{3^q (x_1^q)^2 + A^q}{2^q y_1^q}.$$

Da $2, 3, A \in \mathbb{F}_q$ sind, gilt mit Lemma 4.1.4 $2^q = 2$,$3^q = 3$, $A^q = A$. Somit sind dies wiederum genau die Verdopplungsformeln für $\phi_q(P_1)$ und daher $\phi_q(2P_1) = 2\phi_q(P_1)$. Für $y_1 = 0$ gilt $2P_1 = \mathcal{O}$, sodass die Aussage ebenfalls erfüllt ist. Damit ist ϕ_q ein Gruppenhomomorphismus und somit ein Endomorphismus von E. Die erste Koordinatenfunktion von ϕ_q ist x^q. Nach der Definition des Grades eines Endomorphismus gilt daher $\deg(\phi_q) = q$. Schließlich gilt $q = p^r$ und $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q) = p$. Daher ist

$$\frac{d}{dx} x^q = q x^{q-1} = 0.$$

Somit ist ϕ_q nicht separabel. □

Bemerkung 4.3.8. *Als Konsequenz aus dem Lemma wird die Abbildung nun immer als Frobenius-Endomorphismus bezeichnet.*

Korollar 4.3.9. *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakterstik $p > 0$. Für $m, bn \in \mathbb{Z}$ ist der Endomorphismus*

$$[m] + [n]\phi_q : E \to E$$

genau dann seperabel, wenn $p \nmid a$. Insbesondere ist $\mathrm{id} - \phi_q$ *seperabel.*

Beweis. Den Beweis findet man in [23], S.79. □

Für $m \geq 1$ bezeichnet.

$$\phi_q^m = \underbrace{\phi_q \circ \cdots \circ \phi_q}_{m\text{-mal}}$$

die m-fache Iteration des Frobenius-Endomorphismus. Dabei gilt

$$\phi_q^m(x, y) = (x^{q^m}, y^{q^m}).$$

Proposition 4.3.10. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und sei $m \geq 1$. Dann gelten*

(1) $\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Der Endomorphismus $\phi_q^m - \mathrm{id}$ *ist seperabel und es gilt* $\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$.

Beweis. (1) Sei $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}_q})$. Da ϕ_q^m der Frobeniusendomorphismus bezüglich $\mathbb{F}_{q^m}$ ist, gilt mit Lemma 4.3.6

$$\begin{aligned} P \in E(\mathbb{F}_{q^m}) &\iff \phi_q^m(P) = P \\ &\iff \phi_q^m(P) = P \\ &\iff \phi_q^m(P) - P = \mathcal{O} \\ &\iff P \in \ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) \end{aligned}$$

Daraus folgt dann $\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Da ϕ_q^m und id Endomorphismen von E sind, ist auch $\phi_q^m - \mathrm{id}$ ein Endomorphismus. Nach Korollar 4.3.9 ist dieser separabel. Insbesondere ist er von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4

$$\#\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$$

und mit dem ersten Teil folgt

$$\#E(\mathbb{F}_{q^m}) = \#\ker(\phi_q^m - \mathrm{id}) = \deg(\phi_q^m - \mathrm{id})$$

□

4.3.3. Hasse-Schranke. Die bisher betrachtete explizite Punktzählung ist für kleine endliche Körper gut durchführbar, bei großen Körpern jedoch aufwendig. Die Hasse-Schranke gibt ein Intervall für die Anzahl der Punkte von $E(\mathbb{F}_q)$ an, ohne alle Punkte einzeln bestimmen zu müssen. Das ist sowohl für die Wahl kryptographischer Kurvenparameter als auch für Schoofs Algorithmus wichtig, der die Gruppenordnung später exakt bestimmt.

Die Darstellung orientiert sich an Werner [28, S. 60–63] sowie Silverman [23, S. 138] [22, S.85, 100]. Die kryptographische Einordnung folgt Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 287].

Satz 4.3.11 (Satz von Hasse)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Kröper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$,*

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}$$

Es ist nun möglich die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F})$ rechteinfach abzuschätzen durch

$$-2\sqrt{q} + q + 1 \leq \#E(\mathbb{F}_q) \leq 2\sqrt{q} + q + 1.$$

Dieses Theorem hat nun eine weitrechende Auswirkung auf die Implementierung von elliptischen Kurven. Die Hasse-Schranke liefert damit ein Intervall für die Gruppenordnung, ohne diese exakt zu bestimmen. Insbesondere liegt $\#E(\mathbb{F}_q)$ bei großen q nahe bei $q + 1$. Soll die Punktgruppe einer Kurve über einem Primkörper eine Größenordnung von 2^{256} haben, muss daher auch die Primzahl p ungefähr 256 Bit groß sein (vgl. [7, S. 287]).

Die Größe $q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ wird auch Spur des Frobenius 4.3.16 genannt.

Definition 4.3.12 (Quadratische Form)**.** *Sei A eine abelsche Gruppe. Eine Funktion*

$$d : A \to \mathbb{R}$$

(1) $d(\alpha) = d(-\alpha)$

(2) Die Abbildung

$$A \times A \to \mathbb{R}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto d(\alpha + \beta) - d(\alpha) - d(\beta)$$

Die quadratische Form d heißt positiv definit, wenn zusätzlich

(3) $d(\alpha) \geq 0$ *für alle* $\alpha \in A$

(4) $d(\alpha) = 0$, *wenn* $\alpha = 0$

Korollar 4.3.13. *Für die elliptische Kurven E_1 und E_2 ist die Abbildung*

$$\deg : \mathrm{Hom}(E_1, E_2) \to \mathbb{Z}, \qquad \phi \mapsto \deg(\phi),$$

eine positivie definite quadratische Form.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [23, Corollary III.6.3, S. 85]. □

Lemma 4.3.14. *Sei A eine abelsche Gruppe und*

$$d : A \to \mathbb{Z}$$

eine positive definite quadratische Form. Dann ist

$$| \, d(\psi - \phi) - d(\phi) - d(\psi) \, | \leq 2\sqrt{d(\phi)d(\psi)}, \quad \psi, \phi \in A.$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [23, Lemma V.1.2, S. 138]. □

Nun sind alle Vorraussetzungen gegeben, um den Beweis des Satz von Hasse durchzuführen.

Beweis. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Außerdem sei $\phi : E \to E, (x, y) \mapsto (x^q, y^q)$ der Frobenius Endomorphismus. Für ein $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \Longleftrightarrow x, y \in \mathbb{F}_q.$$

Das ist äquivalent zu

$$x^q = x \quad \text{und} \quad y^q = y.$$

Also gilt

$$\phi(P) = (x^q, y^q) = (x, y) = P.$$

Folglich erhält man

$$P \in E(\mathbb{F}_q) \Longleftrightarrow \phi(P) = P.$$

Betrachtet man nun den Endomorphismus $\mathrm{id} - \phi : E \to E$. Für einen Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$(\mathrm{id} - \phi)(P) = \mathcal{O} \Leftrightarrow P - \phi(P) = \mathcal{O} \Leftrightarrow P = \phi(P).$$

Somit folgt

$$E(\mathbb{F}_q) = \ker(\mathrm{id} - \phi).$$

Nach Korrolar 4.3.9 ist $\mathrm{id} - \phi = [1] + [-1]\phi$ separabel, da $p \nmid 1$ gilt. Die Abilldung ist außerdem von Null verschieden und somit eine Isogenie. Für eine separable Isogenie gilt mit Lemma 4.3.4,

$$\#E(\mathbb{F}_q) = \#\ker(\mathrm{id} - \phi) = \deg(\mathrm{id} - \phi).$$

Nach Korollar 4.3.13 ist die Abbildung $\deg : End(E) \to \mathbb{Z}$ eine positiv definite quadratische Form. Setzt man in Lemma 4.3.14 $A = \mathrm{End}(E), d = \deg, \psi = \mathrm{id}$ ein, so folgt

$$|\deg(\mathrm{id} - \phi) - \deg(\phi) - \deg(\mathrm{id})| \leq 2\sqrt{\deg(\phi)\deg(\mathrm{id})}.$$

Da

$$\deg(\mathrm{id} - \phi) = \#E(\mathbb{F}_q), \qquad \deg(\phi) = q \qquad \text{und} \qquad \deg(\mathrm{id}) = 1,$$

erhält man

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - q - 1| \leq 2\sqrt{q}.$$

□

4.3.4. Frobenius-Spur und Supersingularität. Die Hasse-Schranke begrenzt die Abweichung der Gruppenordnung von $q+1$. Diese Abweichung heißt Frobenius-Spur. Sie wird später bei Schoofs Algorithmus zur exakten Punktzählung bestimmt. Außerdem lässt sich mit ihr die Supersingularität einer elliptischen Kurve charakterisieren. Diese Eigenschaft ist für die Wahl kryptographischer Kurven relevant, da der MOV-Angriff bei supersingulären Kurven eine Reduktion des diskreten Logarithmusproblems auf einen endlichen Körper kleinen Erweiterungsgrades ermöglichen kann. Die Darstellung der Frobenius-Spur und der Supersingularität orientiert sich an Werner [28, S. 66–73] und Washington [26, S. 126–127, 130–139]. Für die Einordnung des MOV-Angriffs wird Washington [26, S. 156–157] herangezogen.

Definition 4.3.15 (Supersingularität)**.** *Eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ der Charakteristik $p > 0$ heißt supersingulär, wenn*

$$E[p](\overline{\mathbb{F}}_q) = \{\mathcal{O}\}.$$

Dass ist äquivlant zu der Aussage, dass eine elliptische Kurve E supersingulär ist, wenn sie über dem algebraischen Abschluss keine nichttrivialen p Torsionspunkte hat.

Die Bezeichnung supersingulär ist von der Singularität einer algebraischen Kurve zu unterscheiden. Eine elliptische Kurve ist per Definition nichtsingulär. Supersingularität bezeichnet dagegen eine zusätzliche Eigenschaft elliptischer Kurven über Körpern positiver Charakteristik.

Definition 4.3.16. *Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ mit Charakteristik p mit $q = p^r$. Der Wert*

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$$

heißt Spur des Frobenius-Endomorphismus und wird mit

$$t = \mathrm{Spur}(\phi_q)$$

bezeichnet.

Proposition 4.3.17 (Spurkriterium)**.** *Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^r$. Und sei $t = q+1-\#E(\mathbb{F}_q)$ erneut die Frobenius Spur. Dann ist E genau dann supersingular, wenn $t \equiv 0 \mod p$. Daraus folgt $\#E(\mathbb{F}_q) \equiv 1 \mod p$.*

Dies ist äquivalent zu der Aussage eine Kurve heißt supersingulär falls ihre Charakteristik $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ die Spur des Frobenius teilt.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [26, Proposition 4.31, S. 130–131]. □

Beispiel 4.3.18. *Sei E die elliptische Kurve über $\mathbb{F}_7$ mit der Weierstraßgleichung*

$$E : y^2 = x^3 + x.$$

Die Diskriminante ist

$$\Delta = -16(4 \cdot 1^3) = -64 \not\equiv 0 \pmod 7,$$

somit ist die Kurve nichtsingulär. Nun werden die Punkte nachgerechnet

x	$x^3 + x \pmod 7$	y-*Werte*
0	0	0
1	2	± 3
2	3	*keine*
3	2	± 3
4	5	*keine*
5	4	± 2
6	5	*keine*

Tabelle 1. Punkte der Kurve $E : y^2 = x^3 + x$ über $\mathbb{F}_7$

Damit gibt es sieben affine Punkte und zusätzlich den Punkt im Unendlichen. Folglich gilt $\#E(\mathbb{F}_7) = 8$ *und für die Spur des Frobenius ist*

$$\mathrm{Spur}(\phi_q) = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) = 7 + 1 - 8 = 0.$$

Da $7 \mid 0$ *gilt, ist* E *nach dem Spurkriterium supersingulär.*

Nun wird noch ein Beispiel für den Fall Charakteristik ist 2 des Körpers angeschaut.

Beispiel 4.3.19. *Ein weiteres Beispiel betrifft eine elliptische Kurve der Charakterstik 2. Es ist eine Kurve* $E(\mathbb{F}_2)$ *gegeben durch die Weierstraßgleichung*

$$y^2 + y = x^3 + x + 1.$$

Es ist für $x = 0$ $y^2 + y = 1$ *und es gibt somit keine Lösung und für* $x = 1$ $y^2 + y = 1$ *und somit gibt es keine Lösung über dem Körper, also* $E(\mathbb{F}_2) = \{\mathbb{O}\}$. *Es gilt für die Spur* $\mathrm{Spur}(\phi_q) = 2+1-1 = 2$ *und ist damit durch die* $\mathrm{char}(\mathbb{F}_2) = 2$ *teilbar.*

Lemma 4.3.20. *Sei* E *eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper* $\mathbb{F}_q$. *Falls* $E(\mathbb{F}_q)$ *supersingulär ist, so ist auch* $E(\mathbb{F}_{q^m})$ *supersingulär für alle* $m \geq 1$.

Also die Supersingularität bleibt beim Übergang zu einem Erweiterungskörper erhalten.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Werner [28, Lemma 3.4.2, S. 66–68]. □

Lemma 4.3.21. *Sei* $p \geq 5$ *eine Primzahl. Dann ist die Elliptische Kurve* $y^2 = x^3 + 1$ *über* $\mathbb{F}_p$ *supersingulär, genau dann wenn* $p \equiv 2 \mod 3$ *und die elliptische Kurve* $y^2 = x^3 + x$ *über* $\mathbb{F}_p$ *supersingulär, genau dann wenn* $p \equiv 3 \mod 4$.

Das entspricht auch den Bedingungen von dem oben gewählten Beispiel.

Beweis. Ein Beweis findet sich bei Washington [26, Proposition 4.37, S. 135]. □

4.4. Punktzählung

Bei kleinen endlichen Körpern kann die Anzahl der Punkte einer elliptischen Kurve durch Auswertung aller möglichen x-Koordinaten bestimmt werden. Für große Körper ist dieses Vorgehen zu aufwendig. Um eine Kurve für kryptographische Anwendungen auszuwählen, muss ihre Gruppenordnung jedoch bekannt sein: Erst dann lässt sich prüfen, ob sie eine Untergruppe geeigneter Ordnung enthält. Dieser Abschnitt stellt zunächst Baby-Step-Giant-Step und Mestres Verfahren vor. Der Schwerpunkt liegt anschließend auf Schoofs Algorithmus. Er bestimmt die Frobenius-Spur schrittweise modulo kleiner Primzahlen und nutzt die Hasse-Schranke, um daraus die Gruppenordnung eindeutig zu ermitteln. Die Verfahren werden hier in ihren Grundzügen dargestellt. Die Darstellung orientiert sich an Schoof [19, S. 219–228, 233–235] und seiner ursprünglichen Arbeit [18]. Für die Erläuterung von Schoofs Verfahren wird außerdem Werner [28, S. 63–65] und [26, S. 101, 123–127] herangezogen. Der verwendete chinesische Restsatz folgt Werner [28, S. 115–116]. Die Einordnung der Laufzeit folgt Silverman [22, S. 46].

4.4.1. Baby-Step-Giant-Step Verfahren. Für größere Primzahlen ist die direkte Bestimmung der Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ durch vollständiges Durchlaufen aller x-Werte ineffizient. Eine effizientere Möglichkeit basiert auf der Baby-Step-Giant-Step-Strategie von Shanks. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$. Nach dem Satz von Hasse gilt $p+1-2\sqrt{p} \leq \#E(\mathbb{F}_p) \leq p+1+2\sqrt{p}$. Es wird zunächst ein zufälliger Punkt $P \in E(\mathbb{F}_p)$ gewählt. Anschließend wird mit Hilfe des Baby-Step-Giant-Step-Verfahrens wie in 2.3.1 eine ganze Zahl

$$m \in [p+1-2\sqrt{p},\ p+1+2\sqrt{p}]$$

bestimmt, für die $mP = \mathbb{O}$ gilt. Ist m die einzige Zahl innerhalb des Hasse-Intervalls mit dieser Eigenschaft, so muss $m = \#E(\mathbb{F}_p)$ gelten. Exestieren dagegen zwei verschiedene Zahlen m und m' im Hasse-Intervall mit $mP = m'P = \mathbb{O}$, so kann die Gruppenordnung aus diesem Punkt allein nicht eindeutig bestimmt werden. In diesem Fall kann jedoch aus $(m-m')P = \mathbb{O}$ die Ordnung von P ermittelt und das Verfahren mit einem weiteren zufälligen Punkt fortgesetzt werden. Die Ordnung von P ist ein Teiler von $\#E(\mathbb{F}_p)$. Das Verfahren kann anschließend mit einem weiteren zufälligen Punkt wiederholt werden, wobei die bereits gewonnene Information über einen Teiler der Gruppenordnung die weitere Berechnung in der Regel beschleunigt.

Die Laufzeit dieses Ansatzes beträgt

$$O\left(p^{1/4+\varepsilon}\right)$$

für jedes $\varepsilon > 0$. Nach Schoof ist das Verfahren für vergleichsweise größere Primzahlen praktikabel, wird jedoch bei Primzahlen mit mehr als ungefähr 20 Dezimalstellen unpraktisch.

4.4.2. Mestre's Algorithm. Mestres Algorithmus dient dazu, die gruppentheoretischen Probleme zu umgehen, die beim zuvor beschriebenen Baby-Step-Giant-Step-Verfahren auftreten können. Sei dazu eine elliptische Kurve

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

über $\mathbb{F}_p$ gegeben. Zusätzlich wird die quadratische Twistkurve E' von E betrachtet. Für einen quadratischen Nichtrest $g \in \mathbb{F}_p^*$ ist diese gegeben durch

$$E' : gy^2 = x^3 + Ax + B.$$

Zwischen den Gruppenordnungen der beiden Kurven besteht der Zusammenhang

$$\#E(\mathbb{F}_p) + \#E'(\mathbb{F}_p) = 2(p+1).$$

Kann die Gruppenordnung von $E(\mathbb{F}_p)$ mit dem Baby-Step-Giant-Step-Verfahren aufgrund einer ungünstigen Gruppenstruktur nicht eindeutig bestimmt werden, wird das Verfahren stattdessen auf die Twistkurve E' angewendet. Besitzt $E(\mathbb{F}_p)$ einen sehr kleinen Gruppenexponenten, so ist dies für die Gruppe $E'(\mathbb{F}_p)$ im Allgemeinen nicht gleichzeitig der Fall. Dadurch können die zuvor beschriebenen Mehrdeutigkeiten vermieden werden.

4.4.3. Schoofs Algorithm. Für Schoofs Algorithmus werden die sogennanten Divisionspolynome benötigt, die wichtig sind für die Torsionsstruktur.

Definition 4.4.1 (Divisionspolynome)**.** *Für eine elliptische Kurve*

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

existieren Polynome ψ_n, die sogenannten Divisionspolynome. Für $n \geq 2$ gilt für einen Punkt $P = (x, y) \neq \mathcal{O}$

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(P) = 0.$$

Außerdem wird noch ein Theorem über den Frobenius benötigt.

Theorem 4.4.2. *Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und t die Spur des Frobenius Endomorphismus ϕ_q. Dann gilt in* $\mathrm{End}(E)$

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0$$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [26, Theorem 4.10, S. 101]. □

Sei E eine elliptische Kurve über dem Körper $\mathbb{F}_q$ mit $q = p^n$ und p prim und $\mathrm{char}(\mathbb{F}_q) \neq 2, 3$. Schoofs Algorithmus bestimmt die Frobenius-Spur $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ modulo mehreren kleinen Primzahlen $l \neq p$. Seien hierzu $l_1 = 2,\ l_2 = 3,\ l_3 = 5, \ldots, l_r$ verschiedene kleine Primzahlen. Es seien nun $l_1 = 2, l_2 = 3, l_3 = 5, \ldots, l_r$ die ersten r Primzahlen. Nach dem Chinesischen Restsatz [28, S. 115–116, Satz 6.2.1] gilt für $L = l_1 \cdots l_r$ der Isomorphismus

$$\mathbb{Z}/L\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/l_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/l_r\mathbb{Z}.$$

Damit ist t modulo L durch die Restklassen

$$t \bmod l_1, \ldots, t \bmod l_r$$

eindeutig bestimmt. Nach dem Satz von Hasse gilt

$$|t| \leq 2\sqrt{q}$$

und damit ist t als ganze Zahl eindeutig bestimmt, sobald

$$L = l_1 \cdots l_r > 4\sqrt{q}$$

gilt.

Es wird zunächst $t \mod 2$ bestimmt. Da q ungerade ist, gilt

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \equiv \#E(\mathbb{F}_q) \pmod 2.$$

Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ ist genau dann gerade, wenn $E(\mathbb{F}_q)$ einen Punkt der Ordnung 2 enthält. Diese Punkte haben die Form $(x, 0)$. Somit ist $\#E(\mathbb{F}_q)$ genau dann gerade, wenn das Polynom $X^3 + AX + B$ eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$ besitzt. Da die Nullstellen von $X^q - X$ genau die Elemente von $\mathbb{F}_q$ sind, besitzt $X^3 + AX + B$ genau dann eine Nullstelle in $\mathbb{F}_q$, wenn

$$\mathrm{ggT}(X^3 + AX + B,\ X^q - X) \neq 1$$

gilt. Damit lässt sich $t \mod 2$ effizient bestimmen. Für $l \geq 3$ ist die Bestimmung von $t \mod l$ schwieriger. Daher wird hier nur eine Idee skizziert, genauere Informationen findet man in [19] und [18].Für ungerades n ist ψ_n ein Polynom in x. Für $P = (x, y) \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$ gilt

$$P \in E[n] \Longleftarrow \psi_n(x) = 0.$$

Der Frobenius-Endomorphismus erfüllt die Gleichung

$$\phi_q^2 - t\phi_q + q = 0 \quad P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$$

Somit gilt für jeden Punkt $P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$

$$\phi_q^2(P) - t\phi_q(P) + qP = \mathcal{O}.$$

Gesucht ist nun eine Zahl $\tau \in \{0, \ldots, l-1\}$ sodass die Gleichung

$$\phi_q^2(P) - \tau\phi_q + qp = \mathcal{O}$$

für jeden Punkt P aus der endlichen Untergruppe

$$E[l] = \{P \in E(\overline{\mathbb{F}}_q) \mid lp = \mathcal{O}\}$$

gilt. Falls ein solches τ gefunden wird, so muss jedes $P \neq \mathcal{O}$ in $E[l]$

$$(t - \tau)\phi_q(P) = \mathcal{O}$$

sein. Für $P \in E[l] \setminus \{\mathcal{O}\}$ liegt auch $\phi_q(P)$ in $E[l]$, dass heißt $\phi_q(P)$ hat die Ordnung l in der Gruppe $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Daher muss $l \mid (t - \tau)$ gelten und somit

$$t \equiv \tau \mod l.$$

Es wurde die Restklasse $t \mod l$ gefunden. Die Bestimmung von τ wird mithilfe der Gruppengesetze und der Divisionspolynome auf Polynomgleichungen zurückgeführt. Für $\tau = 0, \ldots, l-1$ wird überprüft, für welchen Wert die entsprechende Gleichung auf den l-Torsionspunkten erfüllt ist. Dieser Wert liefert die gesuchte Restklasse $t \bmod l$.

Schoofs Algorithmus ist deterministisch und besitzt eine Laufzeit, die polynomial in $\log q$ ist. Damit kann die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ effizient bestimmt werden. In der Praxis ist der ursprüngliche Schoof-Algorithmus jedoch aufgrund der hohen Grade der Divisionspolynome vergleichsweise aufwendig. Atkin und Elkies entwickelten Verbesserungen, die zur sogenannten SEA-Methode führen und die Berechnungen deutlich effizienter machen. Die Gruppenordnung lässt sich effizient bestimmen, ohne dass damit das diskrete Logarithmusproblem auf der Kurve effizient lösbar wird.

Kapitel 5

Elliptische Kurven Kryptographie

Dieses Kapitel zeigt, wie die zuvor eingeführten mathematischen Grundlagen elliptischer Kurven für kryptographische Verfahren genutzt werden können. In Kapitel 2.1 wurden bereits die Grundlagen der Public-Key-Kryptographie sowie das diskrete Logarithmusproblem eingeführt. Im Folgenden wird dieses Prinzip auf die Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper übertragen. Zunächst werden grundlegende kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven betrachtet. Dazu gehören insbesondere der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und die ElGamal-Verschlüsselung. Anschließend werden relevante Angriffe auf elliptische Kurven und das zugrunde liegende diskrete Logarithmusproblem untersucht. Aufbauend auf diesen Verfahren und Angriffen erfolgt abschließend eine Sicherheitsbetrachtung, aus der praktische Anforderungen an die Wahl kryptographisch geeigneter elliptischer Kurven abgeleitet werden.

5.1. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht es zwei Parteien, über einen öffentlichen Kommunikationskanal ein gemeinsames Geheimnis zu vereinbaren. In dem nun folgenden Fall wird hierzu die additive Gruppe der Punkte einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper verwendet.

Die Darstellung des Double-and-Add-Algorithmus orientiert sich an Silverman cite[S. 30–31]silverman06, Buell [2, S. 217–218] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 288]. Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch folgt Washington [26, S. 170–172] und Fuß und Vymazal [6, S. 195]. Für die anschließende ElGamal-Verschlüsselung und ECDSA wird Washington [26, S. 174–176, 179–180] und [28, S. 104–109] herangezogen. Die kryptographischen Einordnungen basieren auf Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 291].

5.1.1. Double-and-Add-Algorithmus. Sei P ein Punkt einer additiv geschriebenen Gruppe und $n \in \mathbb{N}$. Ziel ist es, das skalare Vielfache

$$nP = \underbrace{P + P + \cdots + P}_{n\text{-mal}}$$

effizient zu berechnen. Eine naive Berechnung erfolgt durch sukzessive Addition:

$$\begin{aligned} 2P &= P + P, \\ 3P &= 2P + P, \\ &\vdots \\ nP &= (n-1)P + P. \end{aligned}$$

Hierfür werden insgesamt $n-1$ Gruppenadditionen benötigt. In Abhängigkeit vom Zahlenwert n liegt die Laufzeit dieser Methode daher in $\mathrm{O}(n)$. Für die Betrachtung der tatsächlichen Eingabegröße ist jedoch die Anzahl der Bits entscheidend, die zur Darstellung von n benötigt wird. Bezeichnet $b = \lfloor \log_2(n) \rfloor + 1$ die Bitlänge von n, so gilt $2^{b-1} \leq n < 2^b$. Der Zahlenwert n wächst somit exponentiell mit seiner Bitlänge b. Daher kann die Laufzeit der naiven Methode äquivalent als $\mathrm{O}(2^b)$ angegeben werden. Insbesondere bei kryptographischen Verfahren wie dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch müssen skalare Vielfache für sehr große Skalare berechnet werden. Die naive Methode ist dafür nicht praktikabel. Eine wesentlich effizientere Berechnung ermöglicht der Double-and-Add-Algorithmus.

Definition 5.1.1 (Double-and-Add-Algorithmus)**.** *Sei P ein Punkt auf einer elliptischen Kurve E und $n \in \mathbb{N}$. Es soll nun das Vielfache $Q = nP$ berechnet werden. Sei $n = (b_{m-1}b_{m-2}\dots b_0)_2$ mit $b_{m-1} = 1$ die Binärdarstellung von n. Der Double-and-Add-Algorithmus verarbeitet die Bits von links nach rechts, beginnend mit dem höchstwertigen Bit b_{m-1}.*

(1) Initialisiere $Q \leftarrow P$

(2) Führe für $i = m-1, m-2, \dots, 0$ die folgenden Schritte aus:

(a) Verdopple den aktuellen Punkt: $Q \leftarrow 2Q$

(b) Falls $b_i = 1$, setze $Q \leftarrow Q + P$

Nach der Verarbeitung aller Bits gilt $Q = nP$. Für $n = 0$ wird unmittelbar $\mathcal{O}$ zurückgegeben.

Sei $n = (b_{m-1}\dots b_1 b_0)_2$ die Binärdarstellung von n mit $m = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$. Der Algorithmus verarbeitet somit m Bits. Dabei werden höchstens m Punktverdopplungen und m Punktadditionen benötigt. Damit liegt die Anzahl der Gruppenoperationen in

$$\mathrm{O}(m) = \mathrm{O}(\log n).$$

Beispiel 5.1.2. *Es soll das skalare Vielfache $46P$ berechnet werden. Zunächst wird der Skalar in Binärdarstellung überführt $46 = (101110)_2$. Die Verarbeitung beginnt beim höchstwertigen Bit (*most significant bit*, MSB). Da dieses stets gleich 1 ist, wird der Startwert $Q = P$ gesetzt. Anschließend werden die verbleibenden Bits von links nach rechts verarbeitet. Für die Berechnung von $46P$ werden somit fünf Verdopplungen und drei zusätzliche Additionen benötigt. Insgesamt sind dies acht Gruppenoperationen. Die naive Methode würde dagegen $46 - 1 = 45$ Additionen erfordern.*

Bit	*Operation*	*Zwischenergebnis*
1	*Initialisierung*	$Q = P$
0	*Verdopplung*	$Q = 2P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 5P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 11P$
1	*Verdopplung und Addition*	$Q = 23P$
0	*Verdopplung*	$Q = 46P$

Tabelle 1. Berechnung von $46P$ mit dem Double-and-Add-Algorithmus

5.1.2. Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Wir betrachten eine möglichkeit einen geheimen Schlüssel zu etablieren nach Diffie und Hellman.

(1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 + Ax + B \mod p$ über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_p$, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_p)$ schwer zu lösen ist.

(2) Alice wählt ein geheimes a, das ein Integer sein soll, berechne $P_a = aP$ und schickt P_a zu Bob.

(3) BoB wählt einen geheimen Integer b, er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b.

(4) Alice berechnet $aP_b = abP$

(5) Bob berechnet $bP_a = baP$

(6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Ein Angreifer kennt die öffentlichen Größen

$$E, \quad \mathbb{F}_q, \quad P, \quad A = aP, \quad B = bP,$$

nicht jedoch die geheimen Skalare a und b. Das zugehörige Computational-Diffie-Hellman-Problem besteht darin, aus diesen öffentlichen Informationen den Punkt

$$abP$$

zu bestimmen.

Definition 5.1.3 (Diffie-Hellman Problem)**.** *Sei $P, aP, bP \in E(\mathbb{F}_q)$ gegeben berechne*

$$abP.$$

Beispiel 5.1.4. *Wir betrachten die elliptische Kurve*

$$E\colon y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$$

über dem Primkörper $\mathbb{F}_{17}$. Durch explizite Bestimmung der Punkte erhält man

$$\#E(\mathbb{F}_{17}) = 19.$$

Da die Gruppenordnung 19 *eine Primzahl ist, erzeugt jeder Punkt aus* $E(\mathbb{F}_{17}) \setminus \{\mathcal{O}\}$ *die gesamte Gruppe. Im Folgenden wird der Generator*

$$P = (0, 6)$$

gewählt. Die Berechnung der Ordnung, des Generators und alle weiteren Punktberechnungen wurde mit Hilfe des im Anhang A angegebene und selbstentickwelten Python-Programm durchgeführt. Alice wählt die geheime Zahl $a = 2$ *und berechnet den öffentlichen Schlüssel* $A = aP = 2P = (9, 1)$*, anschließend schickt Alice Bob* P_a*. Bob wählt* $b = 5$ *und berechnet* $B = bP = 5P = (10, 11)$*, anschließend schickt Bob Alice* P_b*. Alice berechnet nun ihren gemeinsamen Schlüssel* $S_A = aP_b = 2 \cdot (10, 11) = (16, 4)$*, genauso wie Bob* $S_B = bP_a = 5 \cdot (9, 1) = (16, 4)$*. Im Beispiel gilt konkret*

$$2B = 2 \cdot 5P = 10P = 5 \cdot 2P = 5A = (16, 4).$$

Öffentlich bekannt sind die Kurve E*, der Körper* $\mathbb{F}_{17}$*, der Basispunkt* P *sowie die Punkte* $A = aP$ *und* $B = bP$*. Die Zahlen* a *und* b *sowie der gemeinsame Punkt* $S = abP$ *werden dagegen nicht übertragen.*

Ein Angreifer müsste dann wie beschrieben, dass Diffie-Hellman-Problem lösen und abP *finden. Eine Möglichkeit wäre* a *aus* aP *oder* b *aus* bP *mit dem diskreten Logarithmus Problem zu lösen. Anschließend könnte der Angreifer den gemeinsamen Punkt durch*

$$aB = a(bP) = abP$$

.Bei der hier betrachteten Gruppe mit nur 19 *Elementen kann der diskrete Logarithmus durch einfaches Berechnen der Vielfachen*

$$P, 2P, 3P, \ldots$$

gefunden werden. Bei kryptographisch verwendeten Kurven arbeitet man dagegen in einer Untergruppe von sehr großer Primzahlordnung. Eine vollständige Aufzählung der Vielfachen von P *ist dort praktisch nicht durchführbar.*

Der elliptische Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ermöglicht zunächst nur die Vereinbarung eines gemeinsamen Geheimnisses. Er definiert noch kein Verfahren zur eigentlichen Verschlüsselung einer Nachricht. Eine Möglichkeit, die Gruppenstruktur elliptischer Kurven direkt für ein Verschlüsselungsverfahren zu verwenden, ist die elliptische Variante von ElGamal.

5.1.3. ElGamal-Verschlüsslung. Alice möchte Bob eine Nachricht senden. Hierzu benötigt sie zunächst Bobs öffentlichen Schlüssel. Bob wählt dazueine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ sowie einen Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$. Die Parameter werden so gewählt, dass das diskrete Logarithmusproblem in der betrachteten Gruppe als schwer lösbar gilt. Die hierfür erforderlichen Sicherheitsbedingungen werden in Abschnitt 5.3 näher betrachtet. Bob wählt ein geheimes $b \in \mathbb{Z}$ und berechnet den Punkt $B = bP$. Der Wert b bildet Bobs privaten Schlüssel, während die öffentlichen Parameter $E, \mathbb{F}_q, P$ und der Punkt B öffentlich bekannt gegeben werden. Wenn Alice Bob eine Nachricht schicken möchte geht sie wie folgt vor

(1) Alice lädt Bobs öffentlichen Schlüssel runter

(2) Sie schreibt ihre Nachricht als ein Punkt $M \in E(\mathbb{F}_q)$

(3) Nun wählt Alice einen geheimen Schlüssel k und berechnet $M_1 = kP$

(4) Anschließend berechnet Alice $M_2 = M + kB$

(5) Nun sendet Alice M_1, M_2 an Bob

Bob entschlüsselt die Nachricht indem er $M = M_2 - bM_1$ berechnet. Das funktioniert da Bob b kennt und daher

$$M_2 - bM_1 = (M + kB) - b(kP) = M + k(bP) - bkP = M$$

berechnen kann. Eine dritte Person Eve, die die Nachrichten M_1 und M_2 abfängt, kann nur durch Lösen des DL-Problems b aus den öffentlichen Informationen P und B berechnen. Wenn sie b nicht errechnen kann, ist das zugrunde liegende DL Problem praktisch nicht effizient lösbar.

Wenn Alice das selbe k zweimal verwendet, ist $M_1' = kP = M_1$. Eve kann das Wissen nutzen, um M zu berechnen indem sie $M_2' - M_2 = M' - bM_1' - (M - bM_1) = M' - M$ berechnet. Wenn Eve nun Wissen über M erhält, kann sie dadurch auch automatisch M' berechnen und alle weiteren Nachrichten die anschließend mit k verschlüsselt werden.

Bemerkung 5.1.5. *In praktischen Anwendungen werden asymmetrische Verfahren in der Regel nicht zur direkten Verschlüsselung längerer Nachrichten verwendet. Stattdessen wird ein gemeinsames Geheimnis erzeugt, aus dem mit einer Hashfunktion ein symmetrischer Schlüssel abgeleitet wird (vgl. [7, S. 291]). Soll aber direkt eine Nachricht gesendet werden, so muss diese erst kodiert und dann auf einen Kurvenpunkt abgebildet werden.*

5.1.4. Digitaler Signatur Algorithmus. Neben der Verschlüsselung von Nachrichten sind digitale Signaturen ein wichtiger Bestandteil der Kryptographie. Der Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, kurz ECDSA, ermöglicht es, die Authentizität und Integrität einer Nachricht zu überprüfen. Eine digitale Signatur kann damit beispielsweise verwendet werden, um zu überprüfen, ob ein Softwareupdate tatsächlich vom angegebenen Herausgeber stammt und nach der Signierung nicht verändert wurde.

Sei E eine elliptische Kurve über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ und sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt großer Primzahlordnung n. Alice wählt einen privaten Schlüssel $a \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet den öffentlichen Schlüssel $Q = aP$. Es werden folgende Informationen veröffentlicht

$$\mathbb{F}_q, \quad E, \quad r, \quad G, \quad P.$$

Möchte Alice eine Nachricht m signieren, geht sie wie folgt vor:

(1) Sie wählt eine zufällige Zahl $k \in \{1, \ldots, n-1\}$ und berechnet $R = kP = (x_R, y_R)$

(2) Nun berechnet sie mit einer vorher festgelegten Hashfunktion einen Wert $z = h(m)$.

(3) Aus der x-Koordinate wird $r = x_R \bmod n$ bestimmt.

(4) Anschließend berechnet sie $s = k^{-1}(z + ar) \bmod n$.

Die digitale Signatur besteht aus dem Paar

$$(r, s).$$

Um die Signatur zu verifizieren geht Bob wie folgt vor:

(1) Er berechnet ebenfalls den Hashwert $z = h(m)$ sowie $w = s^{-1} \bmod n$.

(2) Dannach bestimmt er $u_1 = s^z w \bmod r$ und $u_2 = s^r w \bmod n$.

(3) Er berechnet den Punkt $V = u_1 P + u_2 Q = (x_V, y_V)$.

(4) Wenn $R = \mathcal{O}$ so ist die Unterschrift ungültig.

(5) Die Singatur ist gültig, wenn $x_V \bmod n = r$ gilt.

Die Korrektheit folgt aus

$$V = u_1 P + u_2 Q = s^{-1} z P + s^{-1} r Q = s^{-1}(zP + arG) = s^{-1}(z + ar)P = kP = R$$

Damit besitzt V dieselbe x-Koordinate wie R, sodass $x_V \bmod n = r$ gilt.

5.2. Angriffe auf ECC

Die in Kapitel 2 eingeführten Verfahren Baby-Step-Giant-Step und Pohlig-Hellman lassen sich auch auf die von einem Punkt P erzeugte Untergruppe einer elliptischen Kurve anwenden. Dies wird zunächst an zwei Beispielen veranschaulicht. Anschließend wird mit dem MOV-Algorithmus ein Angriff betrachtet, der das diskrete Logarithmusproblem für geeignete Kurven auf ein Problem in der multiplikativen Gruppe eines endlichen Erweiterungskörper zurückführt.

Die Darstellung der allgemeinen Verfahren orientiert sich an Washington [26, S. 146–153] sowie Güneysu, Paar und Pelzl [7, S. 256]. Für den beim Pohlig-Hellman-Verfahren verwendeten chinesischen Restsatz werden Karpfinger [9, S. 90] und Werner [28, S. 114–116] herangezogen. Die Darstellung des MOV-Algorithmus folgt Washington [26, S. 156–157] und [28, S. 83–89].

5.2.1. Allgemeine Methoden. In Abschnitt 2.3.1 wurde der Baby Step Giant Step Algorithmus verwendet nun soll dieser nochmal an einem Beispiel für elliptische Kurven aufgegriffen werden.

Beispiel 5.2.1. *Es wird erneut das Beispiel aus Kapitel 4 aufgegriffen, aber es wird angenommen, dass die Gruppenordnung unbekannt sei. Sei $G = E(\mathbb{F}_{17})$, wobei E gegeben ist durch $y^2 = x^3 + 2x + 2$. Sei $P = (0, 6)$ und $Q = (3, 16) = kP$ nach dem Satz von Hasse 4.3.11 kann eine obere Schranke ausgerechnet werden*

$$\#E(\mathbb{F}_q) \leq 17 + 1 + 2\sqrt{17} < \sqrt{27}$$

also $\#E(\mathbb{F}_q) \leq 26$. Daher sei $m = \lceil \sqrt{26} \rceil = 6$. Die Punkte iP für $1 \leq i < 6$ sind

$$(0, 6), (9, 1), (6, 3), (7, 6), (10, 11)$$

Anschließend werden die Giant Steps $Q - jmP$ berechnet für $j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$(3, 16), (13, 10), (0, 6), (10, 6), (5, 16), (9, 1).$$

Es wird bei $j = 2$ beendet, da der Punkt mit $1P$ übereinstimmt. Nun kann k einfach nachgerechnet werden,

$$Q = (30, 40) \equiv (13, 6) = kP = (1 + 2 \cdot 6)P = 13P$$

und damit ist $k = 13$ der gesuchte diskrete Logarithmus. Alles wurde mit Hilfe von A, die Konsolenausgabe ist in ??.

Nun wird das Pohlig Hellmann Verfahren aus Kapitel 2 2.3.2 ebenfalls für elliptische Kurven ausgeführt.

Beispiel 5.2.2. *Sei $G = E(\mathbb{F}_{599})$ für die elliptische Kurve $E\colon y^2 = x^3 + 1$. Gegeben seien die Punkte $P = (60, 19)$ und $Q = (277, 239)$. Das Python-Programm liefert $\operatorname{ord}(P) = 600$. Gesucht ist ein $k \in \{0, \ldots, 599\}$ mit $Q = kP$. Wegen $600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$ bestimmen wir wie in Kapitel 2 zunächst k modulo 8, 3 und 25. Alle Koordinatenrechnungen erfolgen modulo 599.*

Bestimmung von *$k \bmod 8$. Wir schreiben $k \equiv z_0 + 2z_1 + 4z_2 \pmod 8$ mit $z_i \in \{0, 1\}$. Der Punkt $R = \frac{600}{2}P = 300P = (598, 0)$ hat die Ordnung 2. Die Berechnung ergibt $300Q = \mathcal{O} = 0R$, also $z_0 = 0$. Die weiteren Ziffern ergeben sich aus*

$$Q_1 = \frac{600}{2^2}(Q - z_0 P) = 150Q = (598, 0) = R,$$
$$Q_2 = \frac{600}{2^3}(Q - (z_0 + 2z_1)P) = 75(Q - 2P) = 75(35, 243) = \mathcal{O}.$$

Somit sind $z_1 = 1$ und $z_2 = 0$, weshalb $k \equiv 0 + 2 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 2 \pmod 8$ gilt.

Bestimmung von *$k \bmod 3$. Hier ist $R = \frac{600}{3}P = 200P = (0, 1)$. Aus $200Q = (0, 598) = 2R$ folgt unmittelbar $k \equiv 2 \pmod 3$.*

Bestimmung von *$k \bmod 25$. Wir schreiben $k \equiv z_0 + 5z_1 \pmod{25}$ mit $z_0, z_1 \in \{0, \ldots, 4\}$ und setzen $R = \frac{600}{5}P = 120P = (84, 179)$. Aus $120Q = (84, 179) = R$ folgt $z_0 = 1$. Anschließend berechnen wir*

$$Q_1 = \frac{600}{5^2}(Q - P) = 24(130, 129) = (491, 465) = 3R.$$

Daher ist $z_1 = 3$ und damit $k \equiv 1 + 5 \cdot 3 = 16 \pmod{25}$.

Zusammensetzen der Ergebnisse. *Aus $k \equiv 2 \pmod 8$ und $k \equiv 2 \pmod 3$ folgt $k \equiv 2 \pmod{24}$. Mit $k = 2 + 24t$ ergibt die verbleibende Kongruenz*

$$2 + 24t \equiv 16 \pmod{25} \quad \Longleftrightarrow \quad t \equiv 11 \pmod{25}.$$

Somit gilt $k \equiv 266 \pmod{600}$. Der gesuchte diskrete Logarithmus ist also $k = 266$.

5.2.2. MOV-Algorithmus. Beim MOV-Algorithmus handelt es sich um eine spezielle Methode, die das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven in $E(\mathbb{F}_q)$ mithilfe der Weil-Paarung auf das DL-Problem in der Gruppe $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ für ein gewisses $m \in \mathbb{N}$ reduziert. Ist der Erweiterungsgrad m hinreichend klein, kann diese Reduktion effizienteren Angriff auf das ursprüngliche DL-Problem ermöglichen. Insbesondere supersinguläre elliptische Kurven sind aufgrund ihrer kleinen Einbettungsgrade für diesen Angriff anfällig.

Es wird für doe Reduktion die sogennante Weil-Paarung verwendet. Sei hierzu $p = \operatorname{char}(\mathbb{F}_q)$ und $n \in \mathbb{N}$ mit $\gcd(n, p) = 1$. Die Weil-Paarung ist eine bilineare, nicht ausgeartete Abbildung

$$e_n : E[n] \times E[n] \to \mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q),$$

wobei $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$ die Gruppe der n-ten Einheitswurzeln bezeichnet. Für ausführlichere Informationen über die Eigenschaften siehe [28, S. 83].

Nach Theorem 4.2.7 gilt $E[n] \cong \mathbb{Z}_n \oplus \mathbb{Z}_n$. Somit exestiert es einen Punkt $P \in E[n]$ der Ordnung n. Aufgrund von der Bilinearität von e_n ist Menge

$$\{e_n(P, Q) | Q \in E[n]\}$$

eine Untergruppe von $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Sei nun $d = \#\{e_n(P,Q)|Q \in E[n]\}$, dann gilt nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 $d \mid n$. Somit folgt für jedes $Q \in E[n]$

$$1 = e_n(P,Q)^d = e_n(dP,Q).$$

Aufgrund der Nichtausgeartetheit der Weil-Paarung folgt $dP = \mathcal{O}$. Da P die Ordnung n besitzt, folgt daraus $n \mid d$. Zusammen mit $d \mid n$ ergibt sich $d = n$. Damit ist die Abbildung $e_n(P,-)$ surjektiv.

Sei nun $P \in E(\mathcal{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n mit $\gcd(n,p) = 1$ und $Q = kP \in \langle P \rangle$ gegeben, wobei $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ ist. Gesucht ist der diskrete Logarithmus k von Q zur Basis P.

Der Algorithmus läuft nun wie folgt ab

(1) Wähle ein m, sodass $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Berechne einen Punkt $R \in En$, sodass $a = e_n(P,R)$ eine primitive n-te Einheitswurzel ist. Insbesondere hat a die Ordnung n in $\mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$.

(3) Berechne $b = e_n(Q,R)$.

(4) Löse das DL-Problem $b = a^k$ in $\mathbb{F}_{q^m}^\times$.

Proposition 5.2.3. *Der MOV-Algorithmus bestimmt unter den genannten Voraussetzungen den diskreten Logarithmus k von Q zur Basis P modulo n, sofern das reduzierte diskrete Logarithmusproblem gelöst wird.*

Beweis. Nach Definition hat der Punkt P die Ordnung n und damit ist die zuvor betrachtete Weil-Paarung

$$e_n(P,-) : E[n] \to \mu_n(\overline{\mathbb{F}}_q)$$

surjektiv. Daraus folgt, dass ein Punkt $R \in E[n]$ exestiert, dessen Bild unter $e_n(P,-)$ eine primitive n-te Einheitswurzel ist. Wegen der Galois-Äquivarenz und da $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$, gilt

$$a = e_n(P,R) \in \mathbb{F}_{q^m}^\times \quad \text{und} \quad b = e_n(Q,R) \in \mathbb{F}_{q^m}^\times.$$

Wegen der Bilinearität der Weil-Paarung und $Q = kP$ folgt

$$b = e_n(Q,R) = e_n(kP,R) = e_n(P,R)^k = a^k$$

Da a eine primitive n-te Einheitswurzel ist, besitzt die Untergruppe $\langle a \rangle \subseteq \mathbb{F}_{q^m}^\times$ die Ordnung n. Durch das Lösen des DL-Problems $b = a^k$ erhält man die Restklasse von k modulo n. Da auch P die Ordnung n besitzt, ist der diskrete Logarithmus von Q zur Basis P damit eindeutig modulo n bestimmt. □

Nun wird noch der alternative Fall betrachtet, dass n und p nicht teilerfremd sind. In diesem Fall lässt sich n als

$$n = n'p^a$$

mit $a \geq 1$ und $\gcd(n',p) = 1$ darstellen. Setzt man nun $P_1 = n'P$ und $P_2 = p^aP$, so besitzt P_1 die Ordnung p^a und P_2 die Ordnung n'. Analog zum Pohlig-Hellman-Verfahren genügt es, die beiden DL-Probleme

$$n'Q = kn'P = kP_1 \quad \text{und} \quad p^aQ = kp^aP = kP_2$$

zu lösen. Dadurch erhält man die Restklassen von k modulo p^a und modulo n'. Da $\gcd(p^a, n') = 1$ gilt, folgt mit dem Chinesischen Restsatz, dass auch die Restklasse von k modulo n bekannt ist. Falls p klein genug ist, könnte das erste DL-Problem mit dem Verfahren von Pohlig-Hellman gelöst werden. Auf das zweite könnte dann wieder der MOV-Algorithmus anwendet werden, da die Ordnung n' teilerfremd zur Charakteristik p ist.

Es soll nun untersucht werden, warum supersinguläre Kurven anfällig für den MOV-Algorithmus sind. Nach dem Satz von Hasse gilt für die Frobenius-Spur

$$t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q) \in [-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}].$$

Nach Proposition 4.3.17 ist eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ genau dann supersingulär, wenn $p \mid t$ gilt, wobei $p = \mathrm{char}(\mathbb{F}_q)$ ist. Der folgende Satz beschreibt die möglichen Werte der Frobenius-Spur genauer.

Satz 5.2.4. *Sei $q = p^r$ mit p prim. Dann gelten die folgenden Aussagen*

(1) Für jedes $t \in [-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}]$, das nicht durch p teilbar ist, exestiert eine elliptische Kurve E über $\mathbb{F}_q$ mit $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$

(2) Ist umgekehrt $E(\mathbb{F}_q)$ supersinguläre, so nimmt $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ einen der Werte

$$0, \pm\sqrt{q}, \pm\sqrt{2q}, \pm\sqrt{3q}, \pm 2\sqrt{q}$$

an.

Beweis. Ein Beweis findet sich in [27, Theorem 4.1, S. 536]. □

Nach Lemma 4.3.20 bleibt die Supersingularität einer elliptischen Kurve bei Erweiterung des Grundkörpers erhalten. Für supersinguläre elliptische Kurven lassen sich darüber hinaus kleine Erweiterungsgrade m bestimmen, für die sämtliche n-Torsionspunkte über $\mathbb{F}_{q^m}$ definiert sind.

Die folgende Proposition gibt für $m \in \{1, \ldots, 6\}$ Erweiterungsgrade und ihre Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_{q^m})$ an.

Proposition 5.2.5. *Sei E eine supersinguläre elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$ und $t = q+1-\#E(\mathbb{F}_q)$. Sei außerdem $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n. Dann lassen sich m und d entsprechend der folgenden Tabelle wählen, sodass $E[n] \subseteq E(\mathbb{F}_{q^m})$ gilt. Die Zahl d gibt für jedes m den Exponenten der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$ an, also die kleinste Zahl, sodass $dR = \mathcal{O}$ für alle $R \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ gilt.*

t	0	$\pm\sqrt{q}$	$\pm\sqrt{2q}$	$\pm\sqrt{3q}$	$\pm 2\sqrt{q}$
m	2	3	4	6	1
d	$q+1$	$\sqrt{q^3} \pm 1$	q^2+1	q^3+1	$\sqrt{q} \mp 1$

Beweis. Ein Beweis findet sich in [11, Table I, S. 85]. □

Mithilfe der Proposition lässt sich der MOV-Algorithmus für supersinguläre elliptische Kurven erneut formulieren. Seien $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung n mit $\gcd(n,p) = 1$ und $Q = kP \in \langle P \rangle$ gegeben. Gesucht ist der diskrete Logarithmus k von Q zur Basis P.

(1) Berechne $t = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ und bestimme mit der obigen Tabelle ein m mit $E[n] \Subset E(\mathbb{F}_{q^m})$ und den Exponenten d der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$.

(2) Wähle einen beliebigen Punkt $R' \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ und setze $R = \frac{d}{n}R'$.

(3) Berechne $a = e_n(P,R)$ und $b = e_n(Q,R)$.

(4) Löse das DL-Problem $b = a^{k'}$ in $\mathbb{F}_{q^m}^\times$.

(5) Falls $k'P = Q$, so ist $k' = k$ der gesuchte diskrete Logarithmus. Andernfalls wiederhole den Algorithmus ab Schritt 2.

Proposition 5.2.6. *Unter den genannten Voraussetzungen liefert der Algorithmus bei erfolgreichem Ablauf den diskreten Logarithmus von Q zur Basis P modulo n.*

Beweis. Da $P \in E(\mathbb{F}_{q^m})$ die Ordnung n besitzt und d der Exponent der Gruppe $E(\mathbb{F}_{q^m})$ ist, gilt $n \mid d$. Somit ist der Punkt $R = \frac{d}{n}R'$ in Schritt zwei wohldefiniert ist. Wegen

$$nR = dR' = \mathcal{O}$$

folgt $R \in E[n]$. Daher lässt sich die Weil-Paarung berechnen. Wenn $a = e_n(P,R)$ eine primitive Einheitswurzel ist, so ist die Relation $k' \equiv k \bmod n$ erfüllt, womit das DL-Problem gelöst ist. Anderfalls gilt $b = a^k$ in $\mathbb{F}_{q^m}^\times$ für den diskreten Logarithmus k. Sei nun α die Ordnung von a. Durch das Lösen des DL-Problems $b = a^{k'}$ erhält man $k' \equiv k \pmod{\alpha}$. Ist a eine primitive n-te Einheitswurzel, so gilt $\alpha = n$ und somit

$$k' \equiv k \pmod{n}.$$

Da P ebenfalls die Ordnung n besitzt, folgt daraus $k'P = Q$. Besitzt a dagegen eine kleinere Ordnung, so wird lediglich die Restklasse von $k$modulo α bestimmt. Wenn nun ein Vertrer k' diser Restklasse gewählt wird, kann der Fall $k'P \neq Q$ auftreten. In diesem Fall muss der Algorithmus mit einem neuen R' wiederholt werden. □

Es bleibt zu untersuchen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Algorithmus terminiert. Nach der vorherigen Proposition gilt

$$E(\mathbb{F}_{q^m}) \cong \mathbb{Z}_d \oplus \mathbb{Z}_d.$$

Da $n \mid d$ ist, bildet die Abbildung

$$R' \longmapsto \frac{d}{n}R'$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass a eine primitivte n-te Einheitswurzel ist und damit der Algorithmus teminiert, beträgt $\frac{\varphi(n)}{n}$, für die Eulersche φ-Funktion. Im Durschnitt werden $\frac{n}{\varphi(n)}$ Durchläufe benötigt. Für große n gilt daher die Abschätzung

$$\frac{n}{\varphi(n)} \leq \log\log n, \quad n \geq 5$$

was für sehr große n schnell klein wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der multiplikativen Gruppe $\mathbb{F}_q^\times$ Algorithmen exestieren, die das DL-Problem schneller lösen als allgemeine

Verfahren wie zum Beispiel das Pohlig-Hellman-Verfahren. Der MOV-Algorithmus löst also das DL-Problem in subexponentieller Zeit, weswegen diese Kurven für kryptographische Zwecke ungeeignet sind.

5.3. Sicherheitsbetrachtung und praktische Konsequenzen

Die folgende Sicherheitsbetrachtung und die daraus abgeleiteten praktischen Konsequenzen stützen sich auf [21, S. 32–34, 57, 78, 82–83], [2, S. 225], [6, S. 199–202], [28, S. 89–95, 97–98, 104–109], [26, S. 169], [22, S. 6], [24] sowie [3, S. 35–36].

5.3.1. Warum elliptische Kurven verwenden? Die Sicherheit der betrachteten Verfahren beruht auf der Annahme, dass die zugrunde liegenden mathematischen Probleme bei geeigneter Parameterwahl praktisch nicht effizient gelöst werden können. Für die Wahl eines Verfahrens sind neben dem angestrebten Sicherheitsniveau auch die Parametergrößen und der Implementierungsaufwand relevant. Es gibt daher aus einer allgemeinen Sicherheitsbetrachtung keinen Grund ein Verfahren dem Anderen vorzuziehen. Für geeignete elliptische Kurven sind keine wesentlich schnelleren klassischen Verfahren als generische Algorithmen mit einem Aufwand von ungefähr $\sqrt{|G|}$ Gruppenoperationen bekannt. Ein wesentlicher Vorteil elliptischer Kurven besteht darin, dass für ein vergleichbares Sicherheitsniveau wesentlich kleinere Parameter benötigt werden. Tabelle 1 zeigt beispielsweise, dass für einen Rechenaufwand von ungefähr 2^{128} für das ECDLP eine Bitlänge von etwa 256 Bit angesetzt wird, während für Faktorisierungsprobleme beziehungsweise diskrete Logarithmen in $\mathbb{F}_p^*$ Größenordnungen von etwa 3200 Bit erforderlich sind. Für noch größere Schlüssellängen verschiebt sich das Verhältnis weiter zugunsten elliptischer Kurven. Eine praktische Folge der kleineren Parameter ist ein geringerer Speicher- und Rechenbedarf. Wird eine elliptische Kurve über einem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit einer etwa 256 Bit langen Primzahl p verwendet, so besitzen auch die Koordinaten der Kurvenpunkte höchstens etwa 256 Bit. Nach der Hasse-Schranke liegt zudem die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_p)$ in derselben Größenordnung wie p. Auch die benötigten Skalarmultiplikationen können effizient durchgeführt werden. Für einen 256 Bit langen Skalar benötigt das Double-and-Add-Verfahren ungefähr 256 Punktverdopplungen und bei annähernd gleichverteilten Bits im Mittel etwa 128 zusätzliche Punktadditionen. Die Kombination aus vergleichsweise kleinen Operanden und effizienter Skalarmultiplikation ist ein wesentlicher praktischer Vorteil elliptischer Kurven.

$\log_2(R)$	ECDLP	Faktorisierung/DLP in $\mathbb{F}_p^*$
60	120	700
70	140	1000
100	200	1900
128	256	3200
192	384	7900
256	512	15500

Abbildung 1. Vergleich des Rechenaufwands für das ECDLP und für Faktorisierungsprobleme beziehungsweise diskrete Logarithmen in $\mathbb{F}_p^*$, nach [21, S. 34, Tabelle 2.3].

5.3.2. Geeignete elliptische Kurven. Nicht jede elliptische Kurve ist für kryptographische Anwendungen geeignet. Es sollen eine elliptische Kurve $E(\mathbb{F}_q)$ und ein Punkt $P \in E(\mathbb{F}_q)$ so gewählt werden, dass das zugehörige diskrete Logarithmusproblem praktisch nicht lösbar ist. Sei $P \in E(\mathbb{F}_q)$ ein Punkt der Ordnung $n = \mathrm{ord}(P)$. Generische Angriffe auf das ECDLP besitzen einen Aufwand von ungefähr $\mathrm{O}(\sqrt{n})$. Da $n \leq \#E(\mathbb{F}_q)$ gilt, folgt aus dem Satz von Hasse

$$n \leq q + 1 + 2\sqrt{q} = (\sqrt{q} + 1)^2.$$

Für kryptographische Anwendungen wird die Ordnung n so gewählt, dass sie von derselben Größenordnung wie q ist. Setzt man $b = \log_2 q$, so gilt $q = 2^b$ und damit

$$\sqrt{q} = 2^{b/2}.$$

Der Aufwand wächst somit exponentiell mit der Bitlänge von q.

Daraus folgt zunächst, dass die verwendete Untergruppe eine ausreichend große Ordnung besitzen muss. Das zuvor betrachtete Baby-Step-Giant-Step-Verfahren zeigt dies unmittelbar, da es das ECDLP mit einem Aufwand von ungefähr $\mathrm{O}(\sqrt{n})$ Gruppenoperationen lösen kann.

Das Pohlig-Hellman-Verfahren zeigt darüber hinaus, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Primfaktorzerlegung von n für die Sicherheit relevant ist. Besitzt n ausschließlich kleine Primfaktoren, kann das ECDLP auf entsprechend kleinere diskrete Logarithmusprobleme reduziert werden. Daher wird für kryptographische Anwendungen typischerweise ein Basispunkt P gewählt, dessen Ordnung n eine große Primzahl ist.

Der MOV-Angriff zeigt, dass neben der Größe der Untergruppe auch die algebraische Struktur der Kurve berücksichtigt werden muss. Besitzt die verwendete Untergruppe einen kleinen Einbettungsgrad m, kann das ECDLP mithilfe einer Paarung auf ein diskretes Logarithmusproblem in

$$\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$$

übertragen werden. Die NIST empfiehlt daher einen ausreichend großen Einbettungsgrad. Dabei ist der Einbettungsgrad m die kleinste positive ganze Zahl, für die

$$q^m \equiv 1 \pmod{n}$$

gilt. Er muss ausreichend groß sein, damit das übertragene diskrete Logarithmusproblem nicht effizient gelöst werden kann.

Ein weiterer Spezialfall sind sogenannte anomale elliptische Kurven. Eine elliptische Kurve $E/\mathbb{F}_p$ heißt anomal, wenn

$$\#E(\mathbb{F}_p) = p.$$

In diesem Fall gilt für die Frobenius-Spur

$$t = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p) = 1.$$

Für solche Kurven existieren spezielle Angriffe von Satoh, Araki, Smart und Semaev die das ECDLP in $\mathrm{O}(\log p)$ lösen. Aus Platzgründen wird der zugrundeliegende Angriff in dieser Arbeit nicht behandelt, eine Darstellung findet sich in [28, S. 89–95] und [24].Für die betrachteten kryptographischen Anwendungen werden solche Kurven ausgeschlossen. Über einem Primkörper wird daher gefordert, dass

$$\#E(\mathbb{F}_p) \neq p.$$

Um die Anforderungen überprüfen zu können, muss die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ bekannt sein. Sie lässt sich wie das vorherige Kapitel gezeigt hat mit einem Punktzählverfahren wie dem Schoof-Algorithmus effizient bestimmen. Anschließend wird untersucht, ob sie einen ausreichend großen Primfaktor n besitzt, der als Ordnung der verwendeten Untergruppe geeignet ist.

Nach dem Satz von Lagrange 2.2.4 teilt $n = \mathrm{ord}(P)$ die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$. Daher ist

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_q)}{n}$$

eine positive ganze Zahl. Sie wird als Kofaktor bezeichnet. Ein kleiner Kofaktor bedeutet, dass die verwendete Untergruppe einen großen Anteil der gesamten Kurvengruppe umfasst.

Zusammen mit den Empfehlungen von NIST und BSI ergeben sich folgende Anforderungen:

(1) **Große Primzahlordnung der verwendeten Untergruppe:** Der Basispunkt P soll eine große Primzahlordnung

$$n = \mathrm{ord}(P)$$

besitzen. Dadurch werden insbesondere Angriffe mit Baby-Step-Giant-Step erschwert und eine effiziente Anwendung des Pohlig-Hellman-Verfahrens verhindert.

(2) **Kleine Kofaktorgröße:** Die Gruppenordnung soll die Form

$$\#E(\mathbb{F}_q) = h \cdot n$$

besitzen, wobei n eine große Primzahl und h ein kleiner, zu n teilerfremder Kofaktor ist. NIST fordert für die dort empfohlenen Kurven insbesondere $h \leq 2^{10}$ (vgl. [3, S.35]).

(3) **Ausschluss anomaler Kurven:** Es soll

$$\#E(\mathbb{F}_q) \neq q$$

gelten, da für anomale Kurven spezielle effiziente Angriffe auf das ECDLP existieren.

(4) **Großer Einbettungsgrad:** Sei m die kleinste positive ganze Zahl mit

$$q^m \equiv 1 \pmod{n}.$$

Der Einbettungsgrad m muss ausreichend groß sein, damit der MOV-Angriff das ECDLP nicht auf ein leichteres diskretes Logarithmusproblem in einem kleinen Erweiterungskörper übertragen kann. NIST fordert für die empfohlenen Kurven $m \geq 2^{10}$ (vgl. [3, S.35]).

(5) **Bekannte und geprüfte Gruppenordnung:** Die Gruppenordnung $\#E(\mathbb{F}_q)$ muss bekannt sein, damit die Ordnung der verwendeten Untergruppe, der Kofaktor und weitere Sicherheitsbedingungen überprüft werden können. Hierfür können Punktzählverfahren wie der Schoof-Algorithmus eingesetzt werden.

(6) **Standardisierte Kurvenparameter:** Da die sichere Erzeugung geeigneter Kurvenparameter nicht trivial ist, sollten standardisierte und bereits analysierte Parametersätze verwendet werden.

Beispiel 5.3.1. *Die zuvor beschriebenen Anforderungen lassen sich am Beispiel der standardisierten Kurve P-256 veranschaulichen. Sie ist über dem Primkörper $\mathbb{F}_p$ mit*

$$p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$$

definiert und besitzt die Weierstraßgleichung

$$E: \quad y^2 = x^3 - 3x + b.$$

Dabei ist der Koeffizient b fest vorgegeben durch

$$b = 41058363725152142129326129780047268409 1$$
$$144410159937255548352563140394674012 91.$$

Die beiden Ziffernfolgen sind hierbei als eine zusammenhängende Dezimalzahl zu lesen. Die Parameter und ihre Erzeugung sind in [3, Abschnitt 3.2.1.3 und Anhang C.2.1.1] beschrieben.

Die Gruppenordnung ist die Primzahl

$$n = 11579208921035624876269744694940757352 9$$
$$996955224135760342422259061068512044369.$$

Auch hier bilden die beiden Ziffernfolgen eine zusammenhängende Dezimalzahl. Der standardisierte Basispunkt G besitzt die Ordnung n und erzeugt somit die gesamte Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$. Daraus folgt unmittelbar

$$h = \frac{\#E(\mathbb{F}_p)}{\mathrm{ord}(G)} = \frac{n}{n} = 1.$$

Da n eine Primzahl ist, bietet die Zerlegung der Untergruppenordnung durch das Pohlig-Hellman-Verfahren keinen Vorteil. Außerdem gilt $n \neq p$, sodass die Kurve nicht anomal ist. P-256 erfüllt auch die Anforderung an den Einbettungsgrad gemäß der NIST.

0 Die Ordnung n besitzt eine Bitlänge von 256 Bit. Generische Angriffe auf das ECDLP erfordern daher ungefähr $\sqrt{n} \approx 2^{128}$ Gruppenoperationen. Dies entspricht einem klassischen Sicherheitsniveau von ungefähr 128 Bit.

Kapitel 6

Quantencomputer und ihre Auswirkung auf die Krytographie

Kryptographische Verfahren bilden eine wesentliche Grundlage für die Sicherheit moderner digitaler Kommunikation. Insbesondere Verfahren auf Basis elliptischer Kurven finden aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Schlüssellängen und hohen Sicherheit breite Anwendung. Ihre Sicherheit beruht wesentlich auf der angenommenen Schwierigkeit des diskreten Logarithmusproblems auf elliptischen Kurven. Die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer stellt diese Sicherheitsannahme jedoch infrage. So weist auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auf die Bedrohung klassischer Signaturverfahren durch hinreichend große Quantencomputer hin und empfiehlt:"wegen der Bedrohung der klassischen Signaturverfahren durch die fortschreitende Entwicklung hinreichend großer Quantencomputer sollte eine Migration zu quantensicheren Verfahren erfolgen"(vgl. BIS [S.59][21]). Im Folgenden werden zunächst die mathematischen Grundlagen des Quantencomputings erläutert. Anschließend wird Shors Algorithmus vorgestellt und dessen Bedeutung für die Sicherheit elliptischer Kurven untersucht.

6.1. Grundlagen des Quantencomputings

Der erste Abschnitt befasst sich erstmal damit was ein Quantencomputer ist und wie dieser funktioniert. Hierbei werden Grundbegriffe wie Quibts und Superposition erklärt. Es handelt sich hier nur um eine oberflächliche Betrachtung, welche bewusst nicht auf physikalische Details eingeht. Das Grundlagen Kapitel basiert dabei auf [2, S.227–229], [1, S.107–111, 115] und [20, S.7].

Ein klassischer Computer verarbeitet Information mithilfe elektronischer Schaltelemente, die jeweils zwei unterscheidbare Zustände annehmen können. Jeder Schalter kann physikalisch offen (0) oder geschlossen (1) sein. Die kleinste Informationseinheit eines Computers wird als Bit bezeichnet und kann respektive die Werte 0 und 1 annehmen. Ein Register besteht aus n Bits und besitzt somit 2^n mögliche Zustände, wobei es sich zu jedem Zeitpunkt in genau einem dieser Zustände befindet. Berechnungen laufen durch die schrittweise Transformation eines Anfangszustand in einen Endzustand, es stellt also einen deterministischen Prozess dar. Dabei werden logische Operationen ausgeführt, die schaltungstechnisch durch sogenannte Gatter realisiert werden.

Quantencomputer unterscheiden sich fundamental voon klassischen Computern, diese basieren auf der Mitte der 1920er Jahre entdeckten Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik. Insbesondere

ermöglichen quantenmechanische Eigenschaften wie Superposition und Interferenz neue Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Quantencomputer können bei geeigneten Berechnungen unterschiedliche Ausgangsdaten parallel berücksichtigen und den sogennanten Quanteparallelismus realisieren. Allerdings können die dabei verarbeiteten Informationen nicht unmittelbar vollständig ausgelesen werden, da eine Messung des Quantenzustands lediglich ein einzelnes Ergebnis liefert. Die kleinste logische Einheit eines Quantencomputers ist ein Quantenbit, kurz Qubit genannt. Ein Qubit beinhaltet ein quantenmechanisches System und einen zugehörigen Messvorgang, der nur zwei mögliche Ergebnisse hervorbringen kann. In Analogie zum klassischen Bit werden diese mit 0 und 1 bezeichnet. Die zugehörigen Basiszustände werden in der Dirac-Notation durch $|0\rangle$ und $|1\rangle$ dargestellt. Allgemein wird diese Schreibweise

$$|\psi\rangle$$

als Ket-Vektor bezeichnet und ist der Zustandsvektor eines quantenmechanischen Systems.

Im Gegensatz zu einem klassischen Bit ist ein Qubit nicht auf die beiden Basiszustände beschränkt, sondern kann sich auch in einer Superposition dieser Zustände befinden. Ein solcher Zustand lässt sich als Linearkombination

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$$

mit komplexen Koordinaten $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$ darstellen. Die Koeffizienten werden Wahrcheinlichkeitsamplitude genannt und erfüllen die Normierungsbedingung

$$|a_o|^2 + |a_1|^2 = 1.$$

Dabei geben die Koeffizienten im Quadrat $|a_0|^2$ und $|a_1|^2$ die Wahrscheinlichkeit an, bei einer Messung das Ergebnis 0 beziehungsweise 1 zu erhalten. Der Zustand eines Qubits wird jedoch nicht allein durch diese Wahrscheinlichkeiten bestimmt. Auch die relativen Phasen der komplexen Amplituden sind von Bedeutung, insbesondere für das Auftreten von Interferenzeffekten bei Quantenberechnungen. Dabei beschreiben verschiedene als Koordinatenvektoren aufgeefasste Amplitudenpaare (a_0, a_1) den gleichen physikalischen Zustand, wenn sie sich nur um einen komplexen Faktor mit Betrag 1 unterscheiden. Der Zustandsraums eines einzelnen Qubits wird somit durch den zweidimensionalen komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^2$ beschrieben, wobei physikalische Zustände durch normierte Vektoren repräsentiert werden.

Ein Quantenregister besteht aus einer Anzahl von n nach außen isolierten miteinander wechselwirkenden Qubits. Der Zustand eines solchen Registers wird durch einen normierten Vektor im 2^n-dimensionalen komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^{2^n}$ beschrieben. Die 2^n Basiszustände werden durch $|0\rangle, \ldots, |2^n - 1\rangle$ bezeichnet. Ein allgemeiner Zustand des Quantenregisters lässt sich als Linearkombination dieser Basiszustände darstellen

$$|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle + \ldots + a_{2^n-1}|2^n - 1\rangle$$

bezeichnet. Es handelt sich bei $a_0, a_1, \ldots, a_{2^n-1}$ um komplexwertige Koordinaten, die die Bedingunng $|a_0|^2 + \cdots + |a_{2^n-1}|^2 = 1$ erfüllen. Bei einer Messung in der Rechenbasis wird der Wert i mit Wahrscheinlichkeit $|a_i|^2$ erhalten.

Der Zustandsraum eines Quantenregisters ergibt sich aus dem Tensorprodukt der Zustandsräume seiner einzelnen Qubits. Für ein Register aus zwei Qubits ergeben sich beispielsweise die vier

Basiszustände.

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$
$$|01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$$
$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle$$
$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

Hat man nun mehrere Quantenreigster wie zum Beispiel bei Shors Algorithmus, kann mit der Schreibweise auch der Zustand verschiedener Register angegeben werden. Sind $|a\rangle$ und $|b\rangle$ Basiszustände zweier Register und ist ein drittes Register mit dem Wert 0 initialisiert, so kann für für den gemeinsamen Zustand

$$|a, b, 0\rangle := |a\rangle \otimes |b\rangle \otimes |0\rangle$$

geschrieben werden. Dabei können die einzelnen Register jeweils mehrere Qubits umfassen.

Die Zustände eines Quantenregisters können durch sogennante Quantengatter verändert werden. Mathematisch werden diese durch unitäre lineare Abbildungen auf dem Zustandsraum beschrieben. Eine solche Abbildung U erfüllt

$$\overline{U}^T U = I,$$

wobei $\overline{U}^T$ die adjungierte Abbildungbezeichnet. Dadurch bleibt die Normierung der Zustandsvektoren erhalten.

Beispiel 6.1.1. *Betrachtet wird ein Quantenregister mit zwei Qubits. Ein Quantengatter U sei durch folgende Transformationen der Basiszustände definiert*

$$\begin{aligned} |00\rangle &\rightarrow |00\rangle \\ |01\rangle &\rightarrow |01\rangle \\ |10\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + |11\rangle) \\ |11\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |11\rangle) \end{aligned}$$

Für den Anfangszustand

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |11\rangle)$$

ergibt sich aufgrund der Linearität von U

$$U|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}U|10\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}U|11\rangle = \frac{1}{2}(|10\rangle + |11\rangle) - \frac{1}{2}(|10\rangle - |11\rangle) = |11\rangle.$$

Die Wahrscheinlichkeitsamplituden des Zustandes $|10\rangle$ heben sich gegenseitig auf, während sich die Amplituden des Zustandes $|11\rangle$ addieren. Daher wird bei einer anschließenden Messung mit Wahrscheinlichkeit 1 das Ergebnis 11 erhalten. Das eben beschriebene Phänomen wird als Quanteninterferenz bezeichnet.

Nicht jede mathematische Transformation lässt sich durch ein Quantengatter realisieren, da die Zustandsänderungen eines abgeschlossenen Quantensystems durch unitäre Abbildungen beschrieben werden. Darüber hinaus bieten Quantencomputer nicht bei jeder Berechnung einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber klassischen Computern. Entscheidend ist vielmehr, ob sich die Eigenschaften der Quantenmechanik, insbesondere Superposition und Interferenz, zur effizienten Lösung eines bestimmten Problems nutzen lassen.

Ein Beispiel hierfür ist Shors Algorithmus, der auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer unter anderem die effiziente Lösung des diskreten Logarithmusproblems ermöglicht. Damit stellt er eine potenzielle Bedrohung für kryptographische Verfahren dar, deren Sicherheit auf der Schwierigkeit dieses Problems beruht.

6.2. Shors Algorithmus und das diskrete Logarithmusproblem

Shors Algorithmus in seiner ursprünglichen Form ermöglicht es mithilfe eines Quantencomputers nichttriviale Teiler großer natürlicher Zahlen in Polynomialzeit zu bestimmen. Damit könnten hinreichend leistungsfähige Quantencomputer die Sicherheit der RSA-Verschlüsslung gefährden. Shor entwickelte außerdem eine alternative Form seines Algorithmus zum Lösen des diskreten Logarithmusproblems mithilfe von Quantencomputern. Im Folgenden wird dessen grundlegende Funktionsweise betrachtet, wobei bewusst auf eine vollständige mathematische Herleitung verzichtet wird.

([30] Quantum Computational THeory, S. 155–161), [30, S. 155–161]

[13, S. 1–3]

[20, S. 19–21] angeblich Seite 1484–1509

[12, S. 75 f., 100–102]

[1, S. 114]

Zur Veranschaulichung der zugrunde liegenden Idee wird zunächst die Periodizität der modularen Exponentiation anhand eines einfachen Beispiels betrachtet. Periodiztät bedeutet, dass in einem gewissen Abstand eine Funktion immer die gleiche Struktur wieder aufweist, es gilt also für eine Funktion $f(x) = f(x+h)$ für eine Periode h. Sei p eine Primzahl, $g \in \mathbb{F}_p^\times$ und $h \in \langle g \rangle$. Gesucht ist ein Exponent r mit

$$g^r \equiv h \pmod{p}.$$

Für das folgende Beispiel seien $p = 17$, $g = 2$ und $h = 8$ gewählt. Die aufeinanderfolgenden Potenzen von 2 modulo 17 ergeben:

r	1	2	3	4	5	6	7	8
$2^r \bmod 17$	2	4	8	16	15	13	9	1
$2^{r+8} \bmod 17$	2	4	8	16	15	13	9	1

Es ist zu erkennen, dass sich die Funktionswerte nach jeweils acht Schritten wiederholen. Insbesondere gilt $2^8 \equiv 1 \pmod{17}$ und damit ist die Ordnung von 2 in der Gruppe $\mathbb{F}_p^\times$ 8. Die Periode der Funktion $f(r) = 2^r \bmod 17$ ist somit 8. Nach dem Satz von Lagrange2.2.4 gilt

$$\operatorname{ord}(2) = 8 \mid 16 = |\mathbb{F}_{17}^\times|.$$

Durch das Wissen über die Periode wird die Anzahl möglicher Exponenten auf $\{0, \ldots, 7\}$ beschränkt. Bei größeren Gruppen kann aber auch hier der Brute-Force Ansatz sehr aufwändig sein.

Shors Algorithmus führt daher eine Funktion mit zwei Variablen, um die Periodiztät im Zusammenhang mit dem diskreten Logarithmus zu berechnen. Für das aktuelle Beispiel gilt

$$f(a, b) = g^a h^b = 2^a 8^b \bmod 17.$$

Nun können verschiedene Paare ausprobiert werden

$$\begin{aligned} f(0,0) &= 1, \\ f(5,1) &= 2^5 \cdot 8 \equiv 1 \pmod{17}, \\ f(2,2) &= 2^2 \cdot 8^2 \equiv 1 \pmod{17}. \end{aligned}$$

Man erkennt, dass für unterschiedliche Eingabewerte die Funktionswerte übereinstimmen. Da $8 = 2^r$ für den gesuchten Exponenten r gilt, lässt sich die Funktion schreiben als

$$f(a, b) = 2^{a+rb} \bmod 17.$$

Somit gilt insbesondere

$$f(a - r, b + 1) = f(a, b),$$

wobei die Exponenten modulo 8 betrachtet werden. Die Periodizität hängt daher vom unbekannten Exponenten r ab. Shors Algorithmus nutzt die Eigenschaften der Quanten-Fourier-Transformation um Informationen über die Struktur der Funktion zu erfahren, ohne jeden Möglichkeit einzelnd zu überprüfen.

Sei p eine Primzahl und g ein Generator der multiplikativen Gruppe $\mathbb{F}_p^\times$. Für ein gegebenes Element $x \in \mathbb{F}_p^\times$ ist der Exponent $r \in \{0, \ldots, p-2\}$ gesucht, sodass

$$g^r \equiv x \bmod p.$$

Der Algorithmus verwendet drei Quantenregister. Die ersten beiden Register dienen zur Darstellung der Exponenten a und b, währemd im dirtten Register der Funktionswert $g^a x^{-b}$ gespeichert wird. Die Zustände $|\psi_i\rangle$ beschreiben dabei jeweils den Gesamtzustand des Quantensystems nach einem Berechnungsschritt. Es wird für den Algorithmus die Quanten-Fouriertransformation benötigt

Definition 6.2.1 (Quanten-Fouriertransformation)**.** *Sei $N \in \mathbb{N}$ und $|x\rangle$ ein Basiszustand mit $x \in \{0, \ldots, N-1\}$. Dann ist die Qanten-Fouriertransformation (QFT) der Dimension N definiert durch*

$$\mathrm{QFT}_N : |x\rangle \to= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{c=0}^{N-1} \exp\left(\frac{2\pi i x y}{N}\right) |y\rangle.$$

[13], S.2

Zunächst wird eine geeignete Zahl q mit $p \leq q \leq 2p$ gewählt, sodass q nahe bei p liegt.

(1) Zu Beginn werden die ersten beiden Quantenregister in eine gleichmäßge Superposition von $|a\rangle$ und $|b\rangle$ mod $p-1$ gebracht, während das dritte Register mit 0 initalisiert wird. Dadurch befindet sich der Quantencomputer im Zustand

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{p-1}\sum_{a=0}^{p-2}\sum_{b=0}^{p-2}|a,b,0\rangle.$$

(2) Anschließend wird die Funktion $f(a,b) = g^a x^{-b} \bmod p$ berechnet und im dritten Register gespeichert. Der Quantencomputer ist im Zustand

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{p-1}\sum_{a=0}^{p-2}\sum_{b=0}^{p-2}|a,b,g^a x^{-b} \bmod p\rangle.$$

(3) Es wird nun die Fourier-Transformation $\mathrm{QFT_q}$ verwendet, um $|a,b\rangle$ in den Zustand

$$\frac{1}{q}\sum_{c=0}^{q-1}\sum_{d=0}^{q-1}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)|c,d\rangle.$$

zu transformieren. Dabei haben die Zustände die Wahrscheinlichkeitamplitude

$$\frac{1}{\sqrt{q}}\exp(\frac{2\pi iac}{q}).$$

respektive bd anstatt ac. Dadurch wechselt die Maschine in den Zustand

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{(p-1)q}\sum_{a,b=0}^{p-2}\sum_{c,d=0}^{q-2}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)|c,d,g^a x^{-b} \bmod p\rangle.$$

(4) Nun wird der Zustand des Quantencomputers gemessen. Die Wahrscheinlichkeit um den Zustand $|c,d,g^k \bmod p\rangle$ zu beobachten ist dabei

$$\mathrm{Prob}(c,d,g^k) = \left|\frac{1}{(p-1)q}\sum_{\substack{a,b \\ a-rb\equiv k \pmod{p-1}}}\exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right)\right|^2.$$

Denn es gilt $x = g^r$ und damit folgt,

$$g^a x^{-b} = g^{a-rb}.$$

Somit tragen nur die Exponentenpaare (a,b) zum Messergebnis für die

$$a - rb \equiv k \bmod p-1$$

gilt.

(5) Es wird die Kongruenz

$$a = k + br - (p-1)\left\lfloor\frac{br+k}{p-1}\right\rfloor$$

in die Wahrscheinlichkeitsamplitude eingesetzt um diese zu vereinfachen, damit ergibt sich

$$\left| \frac{1}{(p-1)q} \sum_{b=0}^{p-2} \exp\left(\frac{2\pi i}{q} (kc + brc - (p-1)c \left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor + bd \right) \right|^2$$

als Wahrscheinlichkeit den Zustand $|c, d, g^k \bmod p\rangle$ zu erhalten.

(6) Abschließend wird untersucht, welche Messergebnisse (c, d) mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten. Nach Shor [20, S. 20–21] liefern geeignete Messwerte eine Näherungsbeziehung der Form

$$\left| \frac{d}{q} + \frac{rc'}{p-1} - j \right| \leq \frac{1}{2q},$$

wobei $j \in \mathbb{Z}$ und

$$c' = \frac{c(p-1) - (c(p-1) \bmod q)}{q}$$

eine ganze Zahl ist.

Durch Rundung von $\frac{d(p-1)}{q}$ auf die nächste ganze Zahl m ergibt sich

$$m \equiv -rc' \pmod{p-1}.$$

Ist c' modulo $p-1$ invertierbar, kann der gesuchte Exponent mithilfe des erweiterten euklidischen Algorithmus bestimmt werden:

$$\boxed{r \equiv -m(c')^{-1} \pmod{p-1}.}$$

Andernfalls können weitere Messungen und klassische Berechnungen notwendig sein.

Mit Shors Algorithmus können Infomrationen über die Periodizitätsstruktur der Funktion $f(a, b) = g^a x^{-b}$ gewonnen werden, ohne sämtliche möglichen Exponenten systematisch überprüfen zu müssen. Die Quanten- Fouriertransformation nutzt dabei die Interferenz der Wahrscheinlichkeitsamplituden, sodass geeignete Messergebnisse Rückschlüsse auf den unbekannten diskreten Logarithmus ermöglichen. Da die Messergebnisse probabilistisch sind, können mehrere Durchläufe erforderlich sein. Dennoch lässt sich das diskrete Logarithmusproblem mithilfe eines Quantencomputers in Polynomialzeit bezüglich der Eingabelänge lösen. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zu den zuvor betrachteten klassischen Verfahren dar, genauer gesagt $\log \mathrm{n}^3$.

6.3. Shors Algorithmus für ECC

Eicher-Opokus Quantum Algorithmus ist eine Abwandlung von Shors Algorithmus um das DL-Problem zu lösen. [30], S.216–219

Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Es ist $P\mathbb{F}_q$ ein Punkt mit Ordnung n. Außerdem sei der Punkt $Q = kP$ gegeben mit einem unbekannten k so wie bisher gegeben. Es soll nun das Problem

$$r \equiv \log_P Q \mod p$$

gelöst werden.

(1) Zuerst werden die drei benötigten Quantenregister initalisiert

$$|\psi_1\rangle = |\mathcal{O}, \mathcal{O}, \mathcal{O}\rangle$$

(2) Wählre ein q mit $p \leq q \leq 2p$.

(3) Füge wieder in die ersten beiden Register die gleichmäßige Superposition hinzu von allen $|a\rangle$ und $|b\rangle \pmod p$. Im dritten Register wird dann $aP + bQ \bmod p$ berechnet und dadurch befindet sich der Quantencomputer in dem Zustand

$$\psi_2 = \frac{1}{q} \sum_{a=0}^{q-1} \sum b = 0qq - 1|a, b, aP + bQ \bmod p\rangle.$$

$aP + bQ \pmod p$ kann effizient mit dem Double-And-Add Algorithmus5.1.1 bestimmt werden.

(4) Benutze die Fourier Transformation QFT_N um wieder $|a, b\rangle$ auf $|c, d\rangle$ abzubilden. Der Zustand $|a, b\rangle$ a wird dann zu

$$\frac{1}{q} \sum_{c=0}^{q-1} \sum_{d=0}^{q-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac + bd)\right) |c, d\rangle.$$

transformiert. Dabei haben die Zustände die Wahrscheinlichkeitamplitude

$$\frac{1}{\sqrt{q}} \exp(\frac{2\pi iac}{q}).$$

respektive bd anstatt ac. Dadurch wechselt die Maschine in den Zustand

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{(p-1)q} \sum_{a,b=0}^{p-2} \sum_{c,d=0}^{q-2} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac + bd)\right) |c, d, aP + bQ \bmod p\rangle.$$

(5) Es wird der Zustand des Quantencomputers gemesen, um den Zustand $|c, d, kP \bmod p\rangle$ zu erhalten

$$\mathrm{Prob}(c, d, g^k) = \left| \frac{1}{(p-1)q} \sum_{\substack{a,b \\ a - rb \equiv k \pmod{p-1}}} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac + bd)\right) \right|^2.$$

Da $aP + Bq \equiv kP \bmod p$ ist.

(6) Nutze die Relation $a = rb + k - (p-1)\left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor$ und setze sie in die Wahrscheinlichkeit von oben ein um die Amplitude $|c, d, kP \bmod p\rangle$ zu erhalten

$$\frac{1}{q} \sum_{b=0}^{p-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}\left(brc + kc + bd - c(p-1)\left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor\right)\right).$$

Dadurch ist die Maschine in dem Zustand

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{q} \sum_{b=0}^{p-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}\left(brc + kc + bd - c(p-1)\left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor\right)\right) |c, d, kP \bmod P\rangle.$$

Die wahrscheinlichkeit den Zustand $|c, d, kP \bmod p\rangle$ zu messen ist daher

$$\left| \frac{1}{q} \sum_{b=0}^{N-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q} \left(brc + kc + bd - c(p-1) \left\lfloor \frac{br+k}{p-1} \right\rfloor \right) \right) \right|^2 .$$

Da $\exp(2\pi ikc/q)$ die Wahrscheinlichkeit nicht ändern kann es umgeschrieben werden zu

$$\left| \frac{1}{q} \sum_{b=0}^{p-1} \exp\left(\frac{2\pi i}{q} bT \right) \exp\left(\frac{2\pi i}{q} V \right) \right|^2 .$$

$$T = rc + d - \frac{r}{p-1}\{cp\}_q \quad \text{und} \quad V = \left(\frac{br}{p} - \left\lfloor \frac{br+k}{p} \right\rfloor \right) \{cp\}_q .$$

wobei $\{\alpha\}_q$ für $\alpha \bmod q$ mit $-q/2 < \{\alpha\}_q < q/2$.

(7) Nun kann man r aus (c, d). Sei j die nächste Ganzzahl zu T/q und $b \in [0, p-2]$, dann ist

$$|\{T\}_q| = |rc + d - \frac{r}{p-1}\{cp\}_q - jq| \leq \frac{1}{2}.$$

Daher ist

$$|\{cp\}_q \leq \frac{q}{12}$$

und damit

$$|V| \leq \frac{q}{12}$$

Daher kann $(c, d), r$ mit hoher Wahrscheinlichkeit berechnet werden.

Bei DLP multiplikative Gruppe $\mathbb{Z}_p^*$ und ECDLP in $E(\mathbb{Z}_p)$, wobei ECDLP schwieriger ist als DLP. Diese zusätzliche Sicherheit ist aber ein Problem gegen Quatenangriffe, da ECC einfacher zu brechen ist als RSA.

Quantum Computing, Qantum Kryptographie und Quanten Key Distribution. QKD does not encrypt data directly. Instead, it establishes a shared secret key between two parties in such a way that any attempt by an eavesdropper to intercept the key leaves detectable traces. Once the key is established and verified as secure, the parties use it with a classical encryption algorithm like AES to encrypt their communication. Limitations of QKD Despite its theoretical security, QKD faces practical limitations:

Distance constraints: Photons traveling through optical fiber are absorbed or scattered, limiting QKD range to roughly 100 kilometers without trusted repeater nodes. Quantum repeaters could extend range but remain in early development. Infrastructure requirements: QKD requires dedicated quantum channels, single-photon sources, and detectors. This infrastructure is expensive and not compatible with existing classical networks. Key distribution only: QKD only establishes keys. It does not encrypt data, authenticate parties, or provide digital signatures. Trusted nodes: Long-distance QKD networks currently rely on trusted nodes that break the quantum link into segments, reintroducing some vulnerabilities. Point-to-point only: QKD links are inherently point-to-point, limiting scalability for multi-party communications.

Großes Problem Harvest Now Decrypt later

Aufwand für die Berechnugn des privaten ECC-Schlüssel aus öffentlichen Daten mit Hilfe ines Quantencomputers Es ist nicht eindeutig bestimmtbar wie viele Ressourcen benötigt werden, denn

dafür ist auch Wissen über die Struktur des zugrundeliegenden Primkörpers und der Variablen A und B nötig. Es wird ausgeganngen von kurzen weierstraßform. Es ist ein Primkörper $\mathbb{F}_q$ mit p^r und $n = \lceil \log_2(p) \rceil$

Noch erklären was Toffoli-Gatter sind [29, S.60]

Tabelle 1. Quantenressourcen in Abhängigkeit von der Bitlänge N des Moduls.

N	Anzahl der Qubits	Anzahl der Toffoli-Gatter	Toffoli-Tiefe
160	1466	$1{,}449 \cdot 10^{10}$	$1{,}37 \cdot 10^{10}$
224	2042	$4{,}22 \cdot 10^{10}$	$3{,}87 \cdot 10^{10}$
256	2330	$6{,}30 \cdot 10^{10}$	$5{,}80 \cdot 10^{10}$
384	3484	$2{,}26 \cdot 10^{11}$	$2{,}08 \cdot 10^{11}$
521	4719	$5{,}70 \cdot 10^{11}$	$5{,}25 \cdot 10^{11}$

Gefahr auch für Blockchains, Ethereum, Bitcoin alle Nutzen ECC

Als Quantenrestente Verfahren Moduk-Lattice-Based oder Hash-based (https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography). Was ist mit hyperelliptischen Kurven? Sei $G = \langle g \rangle$ eine zyklische Gruppe bekannter Ordnung n und $h \in G$ und exestiert nun ein $r \in \{0, \cdots, n-1\}$, sodass

$$h = g^r.$$

In Kapitel 2 wurden schon einige klassische Verfahren zum lösen des DL-Problem dargestellt. Man kann nun mit Hilfe eines Quantencomputers das DL-Problem lösen indem man zwei mal Modular exponenziert und zwei mal eine Quanten-Fourier-Transformationen durchführt. Der Algorithmus verwendet dabei drei Quantenregister.

Zu Beginn werden die Quantenregister in eine gleichmäßge Superposition gebracht

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{p-1} \sum_{a=0}^{p-2} \sum_{b=0}^{p-2} |a, b \bmod p\rangle.$$

Es soll nun $g^r \equiv h \mod p$ berechnet werden. Also

$$r = \log_g h \bmod p - 1.$$

Man kann nun eine Funktion aufstellen

$$f(a,b) = g^a x^{-b} \equiv 1 \bmod p$$

mit

$$a - br \equiv k \bmod p - 1.$$

Das gilt weil $g^a x^{-b} \equiv g^a (g^r)^{-b} \equiv g^{a-br} \equiv g^k \bmod p$. Es muss also r gelöst werden mit

$$r \equiv (a-k) b^{-1} \bmod p - 1.$$

Erstes Register wieder hinzufügen

Im dritten Register wird wird berechnet

$$\frac{1}{n}\sum_{a=0}^{n-1}\sum_{b=0}^{n-1}|a,b,g^{a-rb}\rangle.$$

Anschließend findet eine Quanten-Fourier-Transfomration statt, die für eine Gruppe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ wie folgt definiert ist

$$QFTN_N : |x\rangle \mapsto |\psi_x\rangle = \frac{1}{N}\sum_{c=0}^{N-1}\exp(2\pi i\frac{ac}{N}/)|y\rangle.$$

Diese wird nun auf die ersten beiden Register angewendet, während das dritte Register unverändert bleibt.

Nun wird das dritte Register gemesen. Angenommen diese Messung liefert nun das Gruppenelement g^k. Da $h = g^r$ gilt, müssen die zugehörigen Exponenten die Kongruenz

$$a + rb \equiv k \bmod n$$

erüllen. Daraus folgt

$$a \equiv k - rb \bmod n.$$

Die ersten beiden Register befinden sich nach der Messung somit im Zustand

$$|\psi_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{b=0}^{n-1}|k - rb, b\rangle,$$

wobei die Exponenten modulo n zu verstehen sind.

([13], S. 1–3)

Zum Start wird eine Zahl q genommen, für diese wird ein Exponent von 2 gesucht, sodass q nahe bei p liegt, also $p < q < 2p$. Nun werden die ersten zwei Register in den Quantencomputer eingeführt in der uniformen Superposition von allen $|a\rangle$ und $|b\rangle \bmod p-1$ und berechnen $g^a x^{-b} \bmod p$ im dritten Register. Dadurch ist der Computer in dem Zustand

$$\frac{1}{p-1}\sum_{a=0}^{p-2}\sum_{b=0}^{p-2}|a,b,g^a x^{x-b} \bmod p\rangle.$$

Nun wird die Fouriertransformationen verwendet A_q um $|a\rangle \to |c\rangle$ und $|b\rangle \to |d\rangle$ zu senden mit der Wahrscheinlichkeitamplitude $\frac{1}{q}\exp(2\pi i(ac+bd)/q)$. Dadurch wird der Zustand $|a,b\rangle$ in den Zustand

$$\frac{1}{q}\sum_{a=0}^{q-1}\sum_{b=0}^{q-1}\exp(\frac{2\pi i}{q}/(ac+bd))c,d\rangle$$

umgewandelt. Dadurch bleibt der Quantencomputer in folgendem Zustand

$$\frac{1}{(p-1)q}\sum_{a=0}^{p-2}\sum_{b=0}^{p-2}\exp(\frac{2\pi i}{q}/(ac+bd))|c,d,g^a x^{-b} \bmod p\rangle.$$

Die Wahrscheinlichkeit um einen Zustand $|c, d, y\rangle$ mit $y \equiv g^k \bmod p$ zu beobachten ist

$$\left| \frac{1}{(p-1)q} \sum_{\substack{a,b \\ a-rb\equiv k}} \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(ac+bd)\right) \right|^2$$

wo die Summe über ganz (a, b) verteilt ist, sodass $a - rb \equiv k \bmod p-1$. Man hat nun zwei Moduli $p-1$ und q, die man beide verfolgen muss. Nun wird die Relation

$$a = br + k - (p-1)\lfloor \frac{br+k}{p-1} \rfloor$$

in den vorherigen Ausdruck eingesetzt um die Amplitude auf $|c, d, g^k \bmod p\rangle$ zu erhalten

$$\frac{1}{(p-1)q} \sum_{b=0} p - 2 \exp\left(\frac{2\pi i}{q}(brc + kc + bd - c(p-1)\lfloor \frac{br+k}{p-1} \rfloor)\right). \tag{4}$$

Der absolute Wert der Quadrate dieser Amplitude ist die Wahrschienlichkeit den Zustand zu erhalten. $\exp(2\pi ikc/q)$ kann ignoriert werden, da es die Wahrscheinlichkeit nicht ändern.

Nun werden die Exponent in zwei Teile Geteilt und b ausmultipliziert um

$$\frac{1}{(p-1)q} \sum_{b=0}^{p-2} \exp\left(\frac{2\pi i}{q} bT\right) \exp\left(\frac{2\pi i}{q} V\right)$$

mit $T = rc + d - \frac{r}{p-1}\{c(p-1)\}_q$ und $V = \left(\frac{br}{p-1} - \lfloor \frac{br+l}{p-1} \rfloor\right)\{c(p-1)\}_q$. Hier ist mit $\{z\}_q$ das Residuum von $z \bmod q$ gemeint mit $-q/2 < \{z\}q \leq q/2$.

Nun werden potenzielle Ergebnisse in gut und schlecht klassifiziert. Bei gut genügenden Ergebnisse, ist es sehr wahrscheinlich ein r abzzleiten und die Chance für ein gutes Ergebniss ist konstant. Hierbei ist

$$|\{T\}_q| = |rc + d - \frac{r}{p-1} c(p-1)_q - jq| \leq \frac{1}{2} \tag{5}$$

wobei j die nächste Ganzzahl zu T/q ist und b zwischen 0 und $p-2$ liegt.

Wenn nun gilt

$$|\{c(p-1)\}_q| \leq q/12, \tag{6}$$

dann ist $|V|$ maximal $q/12$, also ist die Phase vom zweiten Exponentialterm nie weiter weg als $\exp(\pi i/6)$ von 1, also es gilt $\exp(\frac{2\pi i}{q}V) \leq \exp(\frac{\pi i}{6})$. Wenn Bedingung 5 und 6 beide gelten, dann spricht man von einem guten Ergebnis. Es gilt $0 \leq b \leq p-2$ und daher $0 \leq \exp(2\pi ibT/q) \leq 2\pi iW$ mit

$$W = \frac{p-2}{q}\left(rc + d - \frac{r}{p-1}\{c(p-1)\}_q - jq\right)$$

und j wie in **??**. Daher ist der Komponent der ersten Amplitude des ersten Exponenten in Gleichung 4 $\cos(2\pi \left|\frac{W}{2} - \frac{Wb}{p-2}\right|) \leq \exp(\pi iW)$ und kann dabei um mindesten $\pi i/6$ varieren, weben dem zweiten Exponentialterm. [20], S.19– 21

(1) Rate eine Zahl g

(2) Aus g mit Quantenberechnung ein p berechnen

(3) $g^{p/2}+1$ ist näher an der Wahrheit als g

Shors algorithmus hat 4 Schritte

(1) Quantum Fourier Transformation, Qubits sind in einer Superposition von Zustände initalisiert, übersetzt Quanteninfomrationen in ein Frequenzspektrum

(2) Modulare Exponentation

(3) Nochmal Quantum Fourier Transformation, Transformiert den Zustand und wandelt die periodischen Information in Quanten Zustände, was wichtig ist um die Ordnung der Untergruppe zu finden

(4) Die Ergebnisse der QFT werden gemessen und mit Hilfe von Wahrscheinlichkeit bewertet. Dann wird Eucklid verwendet um den grlßten gemeinsamen Teiler zu finden.

(Applied Quantum Computing S.100-102)

Generell Paper beschäftigt sich nur mit Kurven über GF(p). Alles was klassisch berechnet werden kann, soll klassisch berechnet werden, um Qubits und Gatter zu sparen. Sei G eine endlcihe zyklische Gruppe und a der Generator von G. Dann gibt es ein Element $b \in G$ mit $a^d = b$

Für elliptische Kurven

Elliptische Kurven über $GF(p^n)$ sind endliche abelsche Gruppen wie bereits gezeigt. Sei P ein Punkt auf der Kurve E, diese Kurve soll alle Sicherheitsbetrachtungen aus Kapitel 5 einhalten und daher dass DL-Problem schwer zu lösen sein.

Also Körper ist $\mathbb{F}_p$ mit $p > 3$ und eine ellitpische Kurve $E : y^2 = x^3 + ax + b$ über diesem Körper. Sei $P = (x, y)$ ein Punkt auf E mit einer großen Ordnung n, sodasss $nP = \mathcal{O}$ gilt. Es gibt nun einen zweiten Punkt $Q \in E$ mit $kP = Q$ was wie bereits eingeführt das diskrete Logarithmus Problem ist für ein $k \in \mathbb{Z}$.

Es muss nun die folgende Transfomartion durchgeführt werden

$$\frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}\sum_{y=0}^{2^n-1}|x,y\rangle \rightarrow \frac{1}{2^n}\sum_{x=0}^{2^n-1}\sum_{y=0}^{2^n-1}|x,y,xP+yQ\rangle$$

Um nun große Skalarmultiplikationen durchzuführen kann wieder die Double-And-Add Methode verwendet werden5.1.1. Um $xP+yQ$ zu berechnen wird durchgehend das Gruppenelement P und Q verdoppelt mit $P_i = 2^iP$ und $Q_i = 2^iQ$. Dann werden P_i und Q_i immer zusammen addiert, wenn die dazugehörigen Bits x und y zusammengerechnet 1 ergeben, also

$$xP + yQ = \sum_i x_iP_i + \sum_i y_iQ_i$$

mit $x = \sum_i x_i 2^i, y = \sum_i y_i 2^i, P_i = 2^iP$ und $Q_i = 2^iQ$. P_i und Q_i können vorher schon klassisch berechnet werden. Um die eben beschriebene Transformation zu starten, beginnt man mit dem Zustand $\sum_{x,y}|x,y,\mathcal{O}\rangle$. Das dritte Register wird mit dem neutralen Element $\mathcal{O}$ initalisiert und nennt sich Akkumulator. Danach wird P_i und Q_i zu dem Register hinzugefügt und auf die entsprechenden Bits von x und y konditioniert. (Shors discrete log for ECC S.3–10)

Input Register eliminieren

Dekomposition des diskreten logarithmus quantum Algorithmus in eine Sequence von Gruppenshifts

$$U_A : |S\rangle \rightarrow |S + A\rangle, \qquad S, A \in E.$$

Decomposition im Group Shift

Nach einer gedachten Messung des dirtten Registers erhält man

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{y=0}^{q-1} |x_0 - dy, y\rangle.$$

(Shors discrete log for ECC S.10–)

Probleme von Quantencomputern

- Nur bestimmte Transformationen können mit einem Quantencomputer berechnet werden.
- Da ergebnis auch quantenmechanischer Zustand, zeigt die Messung in der Regel ein zufälliges Verhalten, also muss Berechnung mehrfach durchgeführt und statistisch ausgewertet werden.
- Technologische Herausforderungen, quantenmechanische Transformation mit niedriger Fehleranfälligkeit und sicherer Quantenfehlerkorrektur realisieren.

[1], S.114 Why aren't quantum computers more widely used if they're so much faster than con ventional machines? Even while engineering has evolved substantially, developing a quantum computer remains a daunting undertaking. The circuit was hardwired to only factor the number 15, not any other input, as the approach is intended to do. For example, the maximum number factored by a quantum computer using Shor's technique is 15. To put this in context, Shor's approach would need to be applied to a 1024-bit integer in order to crack 1024-bit RSA keys, which are currently rec ommended for corporate use. This would necessitate a quantum computer orders of magnitude more powerful than that needed to divide 15 by 5 and 3. ([12], S. 75f.)

Quantencomputer versucht Periode der Funktion zu finden, also das gilt $f(x + r) = f(x)$. Er berechnet nicht die ganzen Potenzen durch, sondern

(1) Quantencomputer erzeugt Überlagerung vieler Eingabewerte: $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$

(2) Die Funktion wird kohärent ausgewertet: $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x, f(x)\rangle$

(3) Quanten-Fourier-Transformation: Durch Interferenz werden bestimmte Messergebnise wahrscheinlicher, die Informationen über die Peridoe enthalten

(4) Messung und Nachbverarbeitung: Aus den Messergebnissen wird die Periode r mittels klassischer Berechnungen rekonstruiert.

Literatur

[1] Jörg Bewersdorf. *RSA- und Elliptic-Curve Kryptographie. Von den mathematischen und algorithmischen Grundlagen bis zur Kryptoanalyse mit Quanten computern*. Hrsg. von Springer Nature. Berlin: Springer-Verlag GmbH, 2026. DOI: 10.1007/978-3-662-73468-1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-73468-1.

[2] Duncan Buell. *Grundlagen der Kryptographie. Einführung in die mathematischen und algorithmischen Grundlagen*. Hrsg. von Springer International Publishing. Springer Vieweg Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-50431-0.

[3] Lily Chen u. a. *Recommendations for discrete logarithm-based cryptography*. Technische Richtlinie NIST SP 800-186. NIST, 2023.

[4] Emily Clader und Dustin Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2025.

[5] Otto Forster. *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015.

[6] Jürgen Fuß und Anna Vymazal. *Kryptographie*. Hrsg. von Springer Vieweg. Berlin: Springer Nature, 2025. ISBN: 78-3-662-70845-3. DOI: 10.1007/978-3-662-70845-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70845-3.

[7] Tim Güneysu, Christof Paar und Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024.

[8] Michael Kaplan. *Computeralgebra*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.

[9] Christian Karpfinger. *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024.

[10] Stefan Liebscher. *Projektive Geometrie der Ebene: Ein klassischer Zugang mit interaktiver Visualisierung*. Hrsg. von Springer-Lehrbuch Masterclass. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2017. ISBN: 978-3-662-54080-0. DOI: 10.1007/978-3-662-54080-0. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-54080-0.

[11] Alfred Menezes, Scott Vanstone und Tatsuaki Okamoto. „Reducing elliptic curve logarithms to logarithms in a finite field“. In: *Proceedings of the Twenty-Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*. STOC '91. New Orleans, Louisiana, USA: Association for Computing Machinery, 1991, S. 80–89. ISBN: 0897913973. DOI: 10.1145/103418.103434. URL: https://doi.org/10.1145/103418.103434.

[12] Marius Iulian Mihailescu Mihailescu, Stefania Loredana Nita und Barna Valentin Marascu Valentina. *Applied Quantum Computing and Cryptography. Challenges, Opportunities, and*

Performance Analysis for Algorithms. Hrsg. von Springer Nature Switzerland AG. Springer Naature Switzerland AG, 2025. ISBN: 978-3-031-77145-3. DOI: 10.1007/978-3-031-77145-3. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-77145-3.

[13] Michele Mosca und Christof Zalka. *Exact quantum Fourier transforms and discrete logarithm algorithms*. 2003. arXiv: quant-ph/0301093 [quant-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0301093.

[14] Stefan Müller-Stach und Jens Piontkowski. *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011.

[15] Amos R. Omondi. *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature, 2020. ISBN: 978-3-030-34142-8.

[16] Daniel Plaumann. *Einführung in die Algebraische Geometrie: Mit zahlreichen Beispielen und Anmerkungen für den optimalen Einstieg*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-61779-3. DOI: 10.1007/978-3-662-61779-3_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61779-3_1.

[17] Jürgen Pöschel. *Etwas Analysis. Eine Einführung in die eindimensionale Analysis*. Hrsg. von Springer Fachmedien. Wiesbaden: Springer Spektrum Wiesbaden, 2014. ISBN: 978-3-658-05799-2. DOI: 10.1007/978-3-658-05799-2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-05799-2.

[18] René Schoof. „Elliptic Curves Over Finite Fields and the Computation of Square Roots mod p“. In: *Mathematics of Computation* 44.170 (1985), S. 483–494.

[19] René Schoof. „Counting points on elliptic curves over finite fields“. In: *Journal de théorie des nombres de Bordeaux* 7.1 (1995), S. 219–254. URL: https://www.numdam.org/item/JTNB_1995__7_1_219_0/.

[20] Peter W. Shor. „Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer“. In: *SIAM Journal on Computing* 26.5 (Okt. 1997), S. 1484–1509. ISSN: 1095-7111. DOI: 10.1137/s0097539795293172. URL: http://dx.doi.org/10.1137/S0097539795293172.

[21] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen*. Technische Richtlinie BSI TR-02102-1. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2026.

[22] Joseph H. Silverman. *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc. Juni 2006.

[23] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York, 2009.

[24] N. P. Smart. „The Discrete Logarithm Problem on Elliptic Curves of Trace One“. In: *Journal of Cryptology* 12 (1999), S. 93–196. DOI: 10.1007/s001459900052.

[25] Gernot Stroth und Rebecca Waldecker. *Elementare Algebra und Zahlentheorie*. Hrsg. von Springer Nature Switzerland. Birkhäuser Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-39771-4. DOI: 10.1007/978-3-031-39771-4. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39771-4.

[26] Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.

[27] William C. Waterhouse. „Abelian varieties over finite fields.“ In: *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 2.4 (1969), S. 521–560. DOI: 10.24033/asens.1183.

[28] Annette Werner. *Elliptische Kurven in der Kryptographie*. Hrsg. von Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. ISBN: 2-540-42518-7. DOI: 10.1007/978-3-642-56351-5. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56351-5.

[29] Frank K. Wilhelm u. a. *Status of quantum computer development*. Studie. Version 2.1. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Aug. 2024.

[30] Song Y. Yan. *Quantum Computational Number Theory*. Hrsg. von Springer Cham. Heidelberg: Springer International Publishing Switzerland, 2015. ISBN: 978-3-319-25823-2. DOI: 10.1007/978-3-319-25823-2. URL: https://10.1007/978-3-319-25823-2.

[31] Sander Zwegers. „An elementary approach to the group law on elliptic curves“. In: *Archiv der Mathematik* 123 (2024), S. 477–486.

Anhang A

Python-Code

Der Punkt im Unendlichen wird durch `None` dargestellt.

```
import math
import matplotlib.pyplot as plt

"Elliptische Kurve: y^2 = x^3 + ax + b (mod p)"
"Punkte sind in der Formq=(x_1,y_1)"

def is_on_curve(P,a,b,p):
    if P is None:
        return True
    x,y = P
    return (y**2 - x**3+a*x+b) % p == 0


def double_point(P,a,p):
    x1, y1 = P
    if  y1 % p == 0: #Vertikale Tangente: Punkt ist Unendlich
        return None
    m = ((3*x1**2+a) * pow(2 * y1, -1, p)) % p
    x3 = (m**2-2*x1) % p
    y3 = (m*(x1-x3)-y1) % p
    return x3,y3

def add_points(P,Q,a,p):
    # Points at infinity
    if P is None:
        return Q
    if Q is None:
        return P

    x1, y1 = P
    x2, y2 = Q

    # P + (-P) = infinity
    if x1 == x2 and (y1 + y2) % p == 0:
        return None

    if P == Q:
        return double_point(P, a, p)

   # P != Q
    m = ((y2-y1) * pow(x2 - x1, -1, p)) % p
    x3 = (m**2-x1-x2) % p
    y3 = (m*(x1-x3)-y1) % p
    return x3, y3

def calculate_curve_points(a, b, p):
    points = []
    for x in range(p):
```

```
        for y in range(p):
            if (y**2-x**3-a*x-b)%p == 0:
                points.append((x,y))
    return points

def point_order(P,a,p,group_order):
    R = None

    for n in range(1,group_order+1):
        R = add_points(P,R,a,p)
        if R is None:
            return n

def find_generator(a,b,p):
    points = calculate_curve_points(a,b,p)
    group_order = len(points)+1

    for P in points:
        order = point_order(P,a,p,group_order)

        if order == group_order:
            return P, order
    return None,None

def calculate_multiples(P,a,p,order):
    multiples = []
    R = None

    for n in range(1,order):
        R = add_points(R,P,a,p)
        multiples.append(R)

    return multiples

def plot_curve_points(P , a, b, p):
    curve_points = calculate_curve_points(a,b,p)
    group_order = len(curve_points) + 1
    multiples = calculate_multiples(P,a,p,group_order)

    xs = [point[0] for point in curve_points]
    ys = [point[1] for point in curve_points]

    plt.figure(figsize=(8, 8))
    plt.scatter(xs, ys, s=80, color="green")
    plt.scatter(P[0], P[1], color="red", s=120, edgecolors="black",
        zorder=3,
        label=f"P = {P}") #Generator hervorheben
    for n,point in enumerate(multiples, start=1):
        if point is not None:
            plt.annotate(
                f"{n}P",
                point,
                xytext=(6, 4),
                textcoords="offset points"
            )

    plt.xticks(range(p))
    plt.yticks(range(p))
    plt.xlim(-0.5, p - 0.5)
    plt.ylim(-0.5, p - 0.5)
    plt.grid(True, alpha=0.4)
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.title( rf"$E: y^2 \equiv x^3 + {a}x + {b}"
    rf"\;(\mathrm{{mod}}\; {p})$")
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(
        "ell_curve_finite_field.png",
        dpi=300,
        bbox_inches="tight"
    )
```

```
121     plt.show()
```

Listing A.1. Punktarithmetik auf elliptischen Kurven über Primkörpern