

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Como construir infinitas curvas elipticas con un rango fijo.

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martin Mereb

23 de octubre de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El objetivo de esta tesis es recopilar la teoria necesaria para la construccion de ejemplos de familias de curvas elipticas de un rango fijo, junto con todos los nuevos metodos que vayan se vayan incorporando en aplicaciones al area. Sobre este tema han habido recientes avances que combinan ideas y desarrollos previos en un resultado novedoso. La idea es que este documento se vaya actualizando conforme avance el área como un resumen de los metodos que surjan.

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva eliptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsion y el rango de su parte libre.

Nos enfocaremos en el rango, que es un valor del que se sabe mucho menos que la torsion, y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango maximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el record actual de rango al menos 31 por Alpöge y Howell [Duj26], o el maximo dado un grupo de torsion fijo, ver [EK20]; que valores de rango aparecen infinitas veces, con una heuristica por Park, Poonen, Voight y Wood [PPVMW19] que predice infinitas curvas de cada rango hasta 20 y solo finitas de rango mayor que 21, dejando abierto el caso 21; muchas conjeturas que lo relacionan con otros invariantes de la curva, siendo la mas famosa la de Birch y Swinnerton-Dyer; y la de dar familias *explicitas* de curvas de un rango fijo, que recien en el ultimo tiempo se comenzaron a obtener ejemplos gracias a una inteligente combinacion de resultados ya conocidos. Hay tambien resultados de densidad, como el de Bhargava y Shankar que nos dice que el rango promedio es menor a $3/2$, cota que se fue mejorando.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r via especializaciones de una curva eliptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando el metodo del descenso, que se usaba en casos particulares, junto con resultados de combinatoria aditiva para aplicarlo en toda una familia, se logró encontrar una forma de acotar superiormente el rango. Logrando que la cota superior sea igual a la inferior obtenemos una familia de curvas de un rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para todo $0 \leq r \leq 4$ y para todo cuerpo de numeros K.

Tambien surge el interes de resultados analogos fijando cierta condicion para la curva, y en nuestro caso lo haremos con el j-invariante. Los valores que tienen un comportamiento diferente son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aqui.

Estructura de la tesis y notacion

La estructura de la tesis será la siguiente: en el capitulo 1 reuniremos resultados generales sobre curvas elipticas que vayamos a usar mas adelante; el capitulo 2 presenta las herramientas que nos permiten obtener un minimo para el rango, que son las superficies elipticas o K3 y los teoremas de especializacion para bajar a curvas elipticas; el tercero se encarga de la cota superior, junto con el desarrollo de la teoria para hacerla computable y ejemplos; en el cuarto incluiremos resultados de distribucion de primos, que provienen de otro area y por lo tanto usaremos como "caja negra", pero que son principales para la generacion de infinitos ejemplos que cumplan nuestras condiciones; y finalmente en el ultimo capitulo reuniremos las aplicaciones, con desarrollos que se fueron presentando como ejemplos a lo largo de la tesis, para presentar un resultado nuevo. Cada capitulo tiene una recapitulacion donde se pueden encontrar la teoria del mismo pero concentrada como para su aplicacion directa al problema que nos interesa.

Antes de empezar fijemos la notacion que usaremos. A lo largo de la tesis trabajaremos mayormente con cuerpos de numeros (extensiones finitas de $\mathbb{Q}$) y los denotaremos K; y, aunque muchos resultados se pueden extender a cuerpos arbitrarios, otros tantos no, y no haremos mencion en cada caso. El grupo de puntos de una curva eliptica E sobre K, por ser un grupo abeliano finitamente generado, lo escribiremos

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r,$$

donde T es el grupo de torsion y $r = \operatorname{rg} E(K)$ es el rango.

Usaremos la notacion habitual de teoria de numeros algebraica, que resumimos a continuacion: Denotaremos $\mathcal{O}_K$ al anillo de enteros, $\bar{K}$ a una clausura algebraica y $G_K = \operatorname{Gal}(\bar{K}/K)$. El grupo $E[n]$ contiene todos los puntos anulados por $[n]$ sobre $\bar{K}$, mientras que $E(K)[n]$ contiene solo los

definidos sobre K; la misma convencion vale para cualquier isogenia ϕ. Los lugares de K forman el conjunto M_K. Para un lugar v, K_v es la completacion respecto a la valuacion de v; si es finito y corresponde al ideal primo $\mathfrak{p}$, tambien escribiremos $K_\mathfrak{p}$ y usaremos la valuacion $v_\mathfrak{p}$, con $v_\mathfrak{p}(0) = +\infty$.

Para nuestro caso particular de interes fijamos $\omega = (-1+\sqrt{-3})/2$, de modo que $\omega^2+\omega+1 = 0$. Usaremos una curva en especifico, pero la iremos presentando con mas o menos generalidad para simplificar la notacion. $E_d : y^2 = x^3 + d$ será la mas general, llamada curva de Mordell; luego, para asegurarnos el punto de 3-torsion $(0, t)$, tomaremos $d = t^2$ y la llamaremos $E_t : y^2 = x^3+t^2$; despues usaremos $t = k^2 - 1$, con el cual tenemos un punto libre sobre el cuerpo de funciones, y la curva será $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$; finalmente escribiremos $k = a/b$ y, tras el cambio $(x, y) \mapsto (b^2x, b^3y)$, tendremos

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ((b - a)b(b + a))^2.$$

En el modelo con coeficientes enteros usaremos $t = (b-a)b(b+a)$. El signo no cambia la ecuacion, que depende de t^2, y determina cual de los dos puntos $(0, \pm t)$ llamamos $T_0 = (0, t)$.

El subindice indica la parametrizacion que estamos usando, siempre con coeficiente no nulo.

Índice general

1. Preliminares: curvas elipticas y grupo de Mordell-Weil **7**
- 1.1. Motivacion . . . 7
- 1.2. Curvas elípticas . . . 7
- 1.3. Mas resultados sobre curvas elipticas . . . 9
  - 1.3.1. Modelo de Weierstrass . . . 9
  - 1.3.2. Reduccion y puntos de torsion . . . 9
  - 1.3.3. Puntos en la curva . . . 10
  - 1.3.4. Altura canonica e independencia . . . 11
  - 1.3.5. Isogenias . . . 12
  - 1.3.6. Curvas con $j = 0$ . . . 13
  - 1.3.7. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo . . . 15
  - 1.3.8. Popurrí . . . 16
- 1.4. Recapitulacion . . . 16

2. Superficies elipticas **19**
- 2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil . . . 19
- 2.2. Superficies elipticas racionales y K3 . . . 21
- 2.3. Teoremas de especializacion . . . 22
- 2.4. Construir superficies elipticas de rango alto . . . 24
  - 2.4.1. Construcciones mediante identidades . . . 25
  - 2.4.2. Herramientas geometricas y el metodo de Elkies . . . 25
- 2.5. Otras herramientas . . . 26

3. Metodo de descenso y grupo de Selmer **29**
- 3.1. Teoria de Selmer y morfismo de descenso . . . 30
  - 3.1.1. Sucesion exacta de Kummer . . . 30
  - 3.1.2. Como calcular los espacios homogeneos . . . 31
  - 3.1.3. Morfismo de descenso . . . 32
  - 3.1.4. Grupos de Selmer y Sha . . . 34
  - 3.1.5. Calculo del grupo de Mordell-Weil . . . 36
- 3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales . . . 37
  - 3.2.1. Elegir los representantes . . . 37
  - 3.2.2. De la clase a una ecuación . . . 38
  - 3.2.3. Las herramientas locales . . . 39
  - 3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales . . . 40
- 3.3. Nuestro caso particular . . . 41
  - 3.3.1. El morfismo para el 3-descenso . . . 41
  - 3.3.2. Condiciones para descartar . . . 42
  - 3.3.3. Símbolos para los primos de t . . . 44
  - 3.3.4. Relaciones entre los simbolos . . . 44
  - 3.3.5. Restricciones sobre los exponentes . . . 45
  - 3.3.6. Recapitulacion . . . 45

4. Teoremas de distribucion de primos **47**
4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir 47
4.2. Sobre cuerpos de numeros 47
4.3. Recopilación final: patrones de primos para especializar 48

5. Familia de curvas elipticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2 **55**
5.1. Los parametros y el grupo de Mordell-Weil 55
5.2. Infinitas clases de isomorfismo 55
5.3. Un ejemplo y el procedimiento para producir otros 56

Capítulo 1

Preliminares: curvas elipticas y grupo de Mordell-Weil

1.1. Motivacion

Una ecuacion diofantica es una ecuacion polinomial de la que buscamos soluciones enteras o racionales. Esto en general nos interesa porque pueden modelar problemas que nos interesen. Veamos algunos ejemplos:

- Pedir que el producto de tres enteros consecutivos sea un cuadrado nos lleva a $y^2 = (x-1)x(x+1)$.
- Escribir un numero como suma de dos cubos racionales nos lleva a ecuaciones como $u^3+v^3 = 9$. Su completacion proyectiva es una cubica no singular con el punto racional $(1:-1:0)$.
- Encontrar un triangulo rectangulo de lados racionales y area entera n equivale (luego de algunas cuentas) a encontrar un punto con $y \neq 0$ en $y^2 = x^3 - n^2x$.
- Encontrar un elemento que sea unidad en dos cuerpos cuadraticos $\mathbb{Q}(\sqrt{a})$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{b})$ simultaneamente es equivalente a encontrar un punto sobre $\mathbb{Q}$, no trivial, en la curva $y^2 = x(x+a)(x+b)$.
- Encontrar un triangulo rectangulo cuya hipotenusa y suma de catetos sean cuadrados perfectos es equivalente a encontrar un punto racional en la curva $y^2 = x^3 + 8x$.
- Suponer que existe una solucion (a,b,c) no trivial a $X^n + Y^n = Z^n$ y analizar la curva $y^2 = x(x-a^n)(x+b^n)$ lleva a muchos años desarrollo de la matematica.
- Encontrar puntos racionales con todas sus coordenadas positivas de la curva $y^2 = x^3 + 109x^2 + 224x$ nos puede ayudar a resolver un viral de WhatsApp.

En particular todos estos se modelan con curvas elipticas y se ayudan de toda la teoria desarrollada de las mismas para encontrar las soluciones.

1.2. Curvas elípticas

Veamos una definicion de curva eliptica más enfocada a la teoria que nos interesa, salteando detalles tecnicos y demostraciones. Para ver las definiciones formales correctas de estos temas ver [ST15] y luego [Sil09] y finalmente [Sil94].

Definición (Curva elíptica)**.** Una *curva eliptica* E definida sobre un cuerpo de numeros K es una ecuacion de la forma

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

donde A y B son elementos de K y vale que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

De una curva eliptica nos interesa el conjunto de puntos racionales denotado $E(K)$ que consta de los pares (x, y) de elementos en K que cumplen la ecuacion, junto con "el punto en el infinito" (un elemento distinguido que proviene de ver la curva proyectivamente, y que denotaremos $\mathcal{O}$). Este conjunto tiene una estructura de grupo con una descripcion geometrica muy elegante.

Para dos puntos P y Q en $E(K)$, definimos una operacion entre ellos que denotaremos como una suma como $P + Q$ será el punto opuesto al que se encuentre sobre la curva alineado con ellos. Este será nuevamente un punto de $E(K)$ porque es simplemente el inverso en y del punto que se encuentra en la interseccion de la recta que conecta P y Q y la curva E, definido por dos ecuaciones con coeficientes en K de grados 1 y 3 respectivamente para las cuales dos de las tres intersecciones ya pertenecen al cuerpo. Aprovechando la notacion aditiva, notaremos tambien $2 \cdot P$ para $P + P$, que se calcula con la tangente a la curva por ese punto, y en general $n \cdot P$ para sumar n veces.

Es facil ver que esa operacion es conmutativa, ya que el orden de los puntos no cambia la recta que los une; y si nos creemos que "el punto en el infinito" corresponde geometricamente a hacer tender la coordenada y a infinito, entonces pertenece a cualquier recta vertical y es facil ver que corresponde al elemento neutro, y que el cada punto tiene un inverso que es simplemente invertir su coordenada y. Lo que no es facil es ver que es asociativa, pero se puede encontrar en cualquier bibliografia. Con todo esto tenemos:

Definición (Grupo de Mordell-Weil)**.** Dada curva eliptica E definida sobre un cuerpo de numeros K, llamamos *grupo de Mordell-Weil de* E al grupo conmutativo $(E(K), +)$.

Un hecho muy importante sobre este grupo es el siguiente:

Teorema (Mordell-Weil)**.** *El grupo* $(E(K), +)$ *es finitamente generado.*

La demostracion de este teorema consta principalmente de dos partes: dar una altura[1] para cada punto de la curva que controle el crecimiento al duplicarlo, salvo un error acotado, y probar que el conjunto $E(K)/2E(K)$ es finito via el metodo de descenso que veremos en mas detalle en el capitulo 3. Como el grupo es finitamente generado, y usando el teorema de estructura, nos queda:

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$$

donde T es un grupo finito correspondiente a la torsion de la curva, y tenemos la esperada:

Definición (Rango)**.** El *rango de una curva elíptica*, denotado por r, es el exponente de la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

Sobre el grupo de torsion de una curva eliptica se conocen resultados que califican muy bien todos los posibles y cotas para su crecimiento. Recopilando algunos de ellos, Mazur [Maz77] dio una completa clasificacion de todos los que pueden aparecer sobre $\mathbb{Q}$; Merel [Mer96] dio una cota para el exponente de los grupos que pueden aparecer sobre un cuerpo de numeros cualquiera en funcion de su grado, que ultimamente nos da tambien una cota del orden; sobre cuerpos cuadraticos ya se conocian los posibles por Kenku-Momose [KM88] y Kamienny [Kam92], y luego sobre los especificos que nos interesan, Najman [Naj11] la redujo más aún; y para cada uno de estos, hay un modelo que lo parametriza bien recopilado en [Rab10], si es que al lector le interesa trabajar con alguno en particular.

Sobre el rango hay recopilados resultados en la introduccion. Para justificar tambien el estudio de las curvas elipticas, el teorema de Faltings que nos habla sobre curvas de genero mayor a 1, que no tendran "rango":

Teorema (Faltings)**.** *Una curva no singular de genero mayor a 1 tiene solo finitos puntos sobre* K*.*

Juntando ese teorema con el resultado conocido de que una curva de genero cero no tiene puntos o es isomorfa a $\mathbb{P}^1$, las curvas elipticas pueden ser considerado el caso mas interesante de curvas cuando se habla de puntos racionales sobre cuerpos de numeros.

[1] Una altura es una funcion que nos de valores en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ para cada punto, que cumpla (entre otras cosas) que la cantidad de puntos con altura menor a una constante sea finita. El ejemplo canonico para $\mathbb{Q}$ es $H(a/b) = \text{máx}\{|a|, |b|\}$ para a/b irreducible, y la de la curva no es muy distinta.

1.3. Mas resultados sobre curvas elipticas

Recopilemos algunos resultados que se conocen sobre curvas elipticas y que nos pueden ayudar a utilizarlas para resolver las preguntas que las motivan.

1.3.1. Modelo de Weierstrass

Motivados por el estudio de ecuaciones diofanticas, muchas veces vamos a querer trabajar con coeficientes enteros[2] en nuestras curvas, y es bueno saber que siempre podemos encontrar un modelo con coeficientes enteros.

Primero definamos el discriminante de una curva que nos va a ayudar:

Definición (Discriminante)**.** Para $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ definimos el discriminante de E como

$$\Delta_E = -16(4A^3 + 27B^2).$$

Notemos que para una ecuacion de esa forma vale que E es una curva eliptica si y solo si $\Delta_E \neq 0$ (salvo caracteristica 2).

Ahora observemos que si en la ecuacion $y^2 = x^3 + Ax + B$ reemplazamos por $x = \tilde{x}/u^2$ e $y = \tilde{y}/u^3$ nos queda la ecuacion $\tilde{y}^2/u^6 = \tilde{x}^3/u^6 + A\tilde{x}/u^2 + B$, y cancelando los u tenemos

$$\tilde{y}^2 = \tilde{x}^3 + u^4 A\tilde{x} + u^6 B.$$

De esta forma, metiendo en u los valores necesarios para cancelar los denominadores de nuestros coeficientes A y B podemos tener un modelo con coeficientes enteros. Y el discriminante del nuevo modelo será

$$\Delta_{\tilde{E}} = -16\left(4(u^4A)^3 + 27(u^6B)^2\right) = u^{12}\Delta_E.$$

De la misma manera podemos eliminar elementos que aparezcan a potencias altas en los coeficientes, y en el discriminante terminaremos dividiendo por un u^{12}. Con todo esto demostramos lo siguiente:

Proposición. *Para toda curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K existe un modelo con coeficientes enteros.*

Hablando de enteros, un resultado importante es

Teorema (Nagell-Lutz)**.** *Para curvas sobre $\mathbb{Q}$, si los coeficientes de nuestro modelo $y^2 = x^3 + Ax + B$ son enteros, todos los puntos de torsion distintos de $\mathcal{O}$ tienen coordenadas enteras.*

Este teorema viene acompañado tambien de que, para P de torsion, $y(P)^2$ divide a $4A^3+27B^2$, lo que hace facil el calculo de estos puntos. Para cuerpos de numeros en general hay cotas locales para los denominadores de los puntos de torsion, pero para cuadraticos imaginarios especificamente se probó un analogo en [MCB25].

1.3.2. Reduccion y puntos de torsion

Reducir una ecuacion modulo un primo nos permite trabajar con un grupo finito. Esto es especialmente util para acotar la torsion: en los primos adecuados, un punto de torsion conserva su orden al reducir.

Sea $\mathfrak{p} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ un ideal primo. Diremos que E tiene *buena reduccion* en $\mathfrak{p}$ si admite una ecuacion de Weierstrass con coeficientes enteros en $\mathfrak{p}$ cuya reduccion es no singular, o lo que es equivalente, si al reducir sus coeficientes a $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ queda una curva no singular. En particular, si un modelo entero tiene discriminante no divisible por $\mathfrak{p}$, tenemos buena reduccion. Que $\mathfrak{p}$ divida el discriminante de un modelo cualquiera no alcanza para afirmar que la reduccion es mala: primero puede ser necesario cambiar de modelo.

[2] Si estamos en $\mathbb{Q}$ son enteros, en un cuerpo de numeros K estamos hablando del anillo de enteros del cuerpo: $\mathcal{O}_K$.

Proposición (Buena reduccion)**.** *Si E/K tiene buena reduccion en $\mathfrak{p}$, la reduccion de coordenadas proyectivas define un morfismo de grupos*

$$E(K) \longrightarrow \bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}), \qquad P \longmapsto \bar{P}.$$

Si $\mathfrak{p} \nmid n$, este morfismo es inyectivo sobre $E(K)[n]$. En particular, los puntos de torsion de orden coprimo con $\mathfrak{p}$ conservan su orden.

El uso de coordenadas proyectivas permite reducir tambien los puntos cuyas coordenadas afines tienen denominadores divisibles por $\mathfrak{p}$; algunos de ellos reducen a $\mathcal{O}$.

La forma de aplicar este resultado es contando los puntos de $\bar{E}(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})$, incluyendo $\mathcal{O}$, que consta de probar con finitos casos. Luego, si un primo $\ell \neq p$ divide el orden de un punto de torsion racional, tiene que dividir tambien ese cardinal; y comparando con varios primos de buena reduccion obtenemos restricciones. Igualmente no necesariamente conseguiremos llegar hasta el orden de la torsion de esta forma.

La buena reduccion tambien controla el cuerpo que necesitamos para definir los puntos de torsion. Esto nos permite limitar los primos donde puede aparecer ramificacion al hacer descenso.

Proposición (Torsion y ramificacion)**.** *Sea E una curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K, y sea $K(E[n])$ el cuerpo obtenido agregando las coordenadas de todos sus puntos de n-torsion. Si E tiene buena reduccion en un primo $\mathfrak{p} \trianglelefteq \mathcal{O}_K$ y $\mathfrak{p} \nmid n$, entonces $K(E[n])/K$ no ramifica en $\mathfrak{p}$.*

Asi, para buscar los posibles primos de ramificacion, basta considerar los de mala reduccion y los que dividen n.

1.3.3. Puntos en la curva

Para encontrar puntos mencionamos la idea de la ley del grupo (la operacion que lo define) pero podemos verla explicitamente y usarla para calcular elementos. Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y un punto $P = (x_1, y_1)$ para calcular $2 \cdot P$ primero necesitamos la tangente a la curva por el punto P. Calculamos la pendiente derivando

$$2y\frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \implies m = \frac{3{x_1}^2 + A}{2y_1}$$

y reemplazamos la ecuacion de la recta $y - y_1 = m(x - x_1)$, que debe contener (al inverso de) $2P$, en nuestra curva

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

que nos queda la cosa horrible

$$x^3 - m^2x^2 + (A + 2m^2x_1 - 2my_1)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2 = 0$$

pero ya sabemos que x_1 es raiz doble, asi que viendo el coeficiente de x^2 tenemos que $-m^2 = -(2x_1 + x(2P))$, o lo que es lo mismo y nos da la coordenada x de la duplicacion de un punto:

$$x(2P) = m^2 - 2x_1.$$

Ahora para obtener la coordenada $y(2 \cdot P)$ reemplazamos en la recta e invertimos (porque esa era la definicion de la ley de grupo):

$$y(2P) = -(m(x(2P) - x_1) + y_1) = m(3x_1 - m^2) - y_1.$$

De esta forma obtuvimos el duplicado de un punto mediante funciones racionales en las coordenadas del anterior. Con la misma logica y muchas cuentas podemos obtener formulas para $n \cdot P$ para todo n y seguiran siendo funciones racionales (cocientes de polinomios). Incluso existe una recursion para calcular todos estos polinomios y se implementan computacionalmente.

Teorema (Polinomios de división)**.** *Sea $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ una curva elíptica y $P = (x, y)$ un punto sobre ella. Existen polinomios $\psi_n, \phi_n \in \mathbb{Z}[A, B, x, y]$[3] definidos a partir de*

$$\psi_0 = 0, \quad \psi_1 = 1, \quad \psi_2 = 2y,$$

$$\psi_3 = 3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2,$$

$$\psi_4 = 4y\left(x^6 + 5Ax^4 + 20Bx^3 - 5A^2x^2 - 4ABx - A^3 - 8B^2\right),$$

$$\psi_{2m+1} = \psi_{m+2}\psi_m^3 - \psi_{m-1}\psi_{m+1}^3,$$

$$\psi_{2m} = \frac{\psi_m}{2y}\left(\psi_{m+2}\psi_{m-1}^2 - \psi_{m-2}\psi_{m+1}^2\right),$$

$$\phi_n = x\psi_n^2 - \psi_{n+1}\psi_{n-1}$$

tales que si $\psi_n(P) \neq 0$ se tiene

$$[n]P = \left(\frac{\phi_n(P)}{\psi_n(P)^2}, \frac{\psi_{2n}(P)}{2\psi_n(P)^4}\right).$$

Corolario. *Luego de reemplazar las apariciones de y^2 con $x^3 + Ax + B$, tanto ϕ_n como ψ_n^2 pueden considerarse polinomios en x, y sus términos principales son*

$$\phi_n(x) = x^{n^2} + \textit{términos de menor grado},$$

$$\psi_n(x)^2 = n^2x^{n^2-1} + \textit{términos de menor grado.}$$

En particular esto muestra que el grado de la multiplicacion por n (como isogenia) es n^2.

Corolario. *Para todo punto $P = (x, y) \in E$,*

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(x)^2 = 0.$$

Por lo tanto, las raíces de ψ_n^2 son exactamente las coordenadas x de los puntos de n-torsión de E.

Tambien nos interesará saber la estructura de los puntos de torsion en un cuerpo algebraicamente cerrado, ya que esto nos acotará lo que pueda aparecer abajo.

Proposición. *Para una curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K y un entero $n \geq 1$,*

$$E[n] := E(\bar{K})[n] \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2.$$

En particular, hay n^2 puntos de n-torsion sobre $\bar{K}$.

Una forma de verlo es estudiar $E(\mathbb{C})$: la teoria compleja identifica este grupo con $\mathbb{C}/\Lambda$, donde Λ es un reticulado. Los puntos anulados por n corresponden entonces a $(\frac{1}{n}\Lambda)/\Lambda \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$. Como sus coordenadas satisfacen los polinomios de division son algebraicas sobre K.

1.3.4. Altura canonica e independencia

Una forma de probar independencia de puntos en con la altura canonica de la curva, que es parte de una teoria de alturas mas general que tambien aparecerá en las superficies.

Teorema (Néron-Tate)**.** *Sea E una curva eliptica sobre un cuerpo de numeros K. Existe una altura canonica $\hat{h} : E(K) \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumple*

$$\hat{h}([m]P) = m^2\hat{h}(P) \qquad y \qquad \hat{h}(P) = 0 \iff P \textit{ es de torsion.}$$

El emparejamiento

$$\langle P, Q\rangle = \hat{h}(P + Q) - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q)$$

es bilineal y define una forma cuadratica definida positiva en la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

[3] En particular, si A y B son enteros, estos polinomios serán enteros.

La aplicacion que nos interesa es que, dados puntos $P_1, \cdots, P_r$, calculamos su matriz de alturas:

$$M = (\langle P_i, P_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq r},$$

y los puntos son independientes modulo torsion si y solo si $\det M \neq 0$. Si calculamos las alturas por aproximaciones, debemos controlar el error para certificar que el determinante no es cero.

1.3.5. Isogenias

Los mapas entre curvas elipticas serán las isogenias:

Definición (Isogenias)**.** Una isogenia $\phi : E \to E'$ es un morfismo entre curvas elipticas que manda $\mathcal{O}_E \mapsto \mathcal{O}_{E'}$.

Lo mas importante es que respetan la ley del grupo: $\phi(P+Q) = \phi(P) + \phi(Q)$. Estos morfismos estarán definidos por funciones racionales en las coordenadas de los puntos, permitiendonos calcularlas explicitamente, hablar del cuerpo de definicion de una isogenia, y llevandose bien con la accion de Galois que veremos mas adelante. Los primeros ejemplos de isogenias son la multiplicacion por enteros m:

Definición. La multiplicacion por m la denotamos

$$[m] : E \to E$$

definida por $[m](P) = m \cdot P$ es una isogenia.

Las propiedades principales sobre isogenias son las siguientes:

Proposición. *Toda isogenia no constante es sobreyectiva.*

Este hecho proviene directo de la geometria algebraica: un mapa de curvas tiene que tener imagen cerrada, y por no ser constante es toda la curva E'. Con ello definimos el grado de una isogenia.

Definición (Grado de una isogenia)**.** El grado de una isogenia no constante sobre un cuerpo de numeros K es el cardinal de una fibra sobre $\bar{K}$.

Lo que mas se usa es el cardinal del nucleo de la isogenia $\mathrm{gr}(\phi) = \#E[\phi]$, o la siguiente proposicion:

Proposición. *El grado de una isogenia no constante coincide con el grado de la extension de cuerpos de funciones de las curvas:*

$$\mathrm{gr}(\phi) = [K(E) : \phi^*(K(E'))]$$

Para el caso de cuerpos genericos, donde una isogenia puede no ser separable, esta es la definicion que se usa de grado.

Un resultado que vamos a usar muy seguido nos dice que, salvo isomorfismo, una isogenia esta determinada por su nucleo, y eso nos permitirá definir el cociente de una curva eliptica E por un subgrupo $G \leq E(K)$ finito:

Proposición. *Si $\phi : E_1 \to E_2$ y $\psi : E_1 \to E_3$ son dos isogenias con el mismo nucleo, entonces existe un isomorfismo $\eta : E_2 \to E_3$ tal que $\psi = \eta \circ \phi$*

La construccion de E/G y de la isogenia cociente tambien son explicitas, utilizando las formulas de Vélu. Esto nos permite partir de un punto de torsion conocido y construir la isogenia con la que haremos descenso.

Proposición (Isogenia asociada a un punto de torsion)**.** *Sea $T_0 \in E(K)$ un punto de orden n. Existe una curva eliptica $E' = E/\langle T_0 \rangle$ y una isogenia $\phi : E \to E'$ definida sobre K, con*

$$\mathrm{nu}(\phi) = \langle T_0 \rangle, \qquad \mathrm{gr}(\phi) = n.$$

Mas generalmente, basta que el subgrupo finito que queremos tomar como nucleo sea estable por Galois; no hace falta que todos sus puntos sean racionales.

Para calcularla, escribimos $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y $G = \langle T_0 \rangle$. Las formulas de Vélu dan, fuera del nucleo,

$$X(P) = x(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} \left(x(P+Q) - x(Q) \right),$$
$$Y(P) = y(P) + \sum_{Q \in G \setminus \{\mathcal{O}\}} \left(y(P+Q) - y(Q) \right).$$

Estas funciones definen $\phi(P) = (X(P), Y(P))$. Una presentacion breve de las formulas, incluyendo los coeficientes de la curva cociente, está en las notas de Sutherland [Sut23].

Asociada a una isogenia $\phi : E \to E'$ tendremos su isogenia dual $\hat{\phi} : E' \to E$ que cumple que $\hat{\phi} \circ \phi = [\mathrm{gr}(\phi)]_E$ y $\phi \circ \hat{\phi} = [\mathrm{gr}(\phi)]_{E'}$.

En particular, dos curvas isogenas sobre K tienen el mismo rango: al pasar a las partes libres y tensorizar con $\mathbb{Q}$, la isogenia tiene inversa $\hat{\phi}/\mathrm{gr}(\phi)$. Por eso en el caso general podremos calcular el rango usando cualquiera de las dos curvas del descenso.

Ejemplo 1.3.1. Tomemos la familia $E_t : y^2 = x^3 + t^2$, con $t \neq 0$. El punto $T_0 = (0, t)$ tiene orden 3, y entonces $G = \{\mathcal{O}, T_0, -T_0\}$. Como $x(T_0) = 0$ se simplifican muchas cuentas.

Para $P = (x, y)$ fuera de G, las pendientes de las rectas por P y $\pm T_0$ son $(y \mp t)/x$, de donde

$$x(P \pm T_0) = \frac{(y \mp t)^2}{x^2} - x, \qquad y(P \pm T_0) = \frac{y \mp t}{x}\left(x - x(P \pm T_0)\right) - y.$$

Usando la formulas de Velú y la ecuacion de la curva, las coordenadas de la imagen de P, que seran (X, Y) nos quedan

$$X = x + x(P+T_0) + x(P-T_0) = x + \frac{(y-t)^2}{x^2} - x + \frac{(y+t)^2}{x^2} - x = \\ = \frac{2y^2 + 2t^2}{x^2} - x = \frac{2x^3 + 4t^2}{x^2} - x = x + \frac{4t^2}{x^2},$$

$$Y = y + y(P+T_0) + y(P-T_0) = \cdots = \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3}$$

Entonces nos quedó

$$\phi(x, y) = \left(\frac{x^3 + 4t^2}{x^2}, \frac{y(x^3 - 8t^2)}{x^3} \right).$$

Finalmente, para saber la curva imagen, veamos

$$Y^2 - X^3 = \frac{y^2(x^3 - 8t^2)^2 - (x^3 + 4t^2)^3}{x^6} = \frac{(x^3 + t^2)(x^3 - 8t^2)^2 - (x^3 + 4t^2)^3}{x^6} = \\ = \frac{(x^9 - 15x^6t^2 + 48x^3t^4 + 64t^6) - (x^9 + 12x^6t^2 + 48x^3t^4 + 64t^6)}{x^6} = -27t^2.$$

Asi construimos una isogenia de grado 3 hacia $E'_t : Y^2 = X^3 - 27t^2$, con nucleo $\{\mathcal{O}, (0, t), (0, -t)\}$.

1.3.6. Curvas con $j = 0$

Otro valor asociado a una curva eliptica es su j-invariante, que las clasifica completamente salvo isomorfismo sobre $\bar{K}$.

Definición. Dada una curva eliptica $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ sobre K, su j-invariante es el numero

$$j_E = 1728 \frac{4A^3}{4A^3 + 27B^2} = \frac{(-48A)^3}{\Delta_E}$$

Nosotros trabajaremos con curvas de j-invariante igual a 0. De la definicion vemos que siempre tendran la forma $y^2 = x^3 + B$ para algun $B \neq 0$, pero tambien se puede ver que, reemplazando B por $u^6 B$ y utilizando el mismo truco que con el determinante obtenemos la misma curva. Vamos a resumirlo en la siguiente proposicion, donde cambiaremos la notacion de B a d para representar un elemento libre de potencias sextas. A estas curvas se las conoce como *curvas de Mordell*.

Proposición 1.3.2. *Sean $d, d' \in K^\times$. Las curvas $E_d : y^2 = x^3 + d$ y $E_{d'} : y^2 = x^3 + d'$ son isomorfas sobre K si y solo si $d'/d \in (K^\times)^6$.*

Para nuestros modelos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ y $E_{t'} : y^2 = x^3 + (t')^2$, la condicion equivale a que t'/t sea un cubo en K.

Algo particular que ocurre en la familia de Mordell es el fenomeno de multiplicacion compleja, que no veremos aca toda su generalidad, pero en este caso nos da que, siempre que tengamos $\omega \in K$, tendremos un morfismo definido en la misma curva que nos permite obtener dos puntos independientes a partir de uno. El mapa

$$[\omega](x, y) = (\omega x, y), \qquad [\omega](\mathcal{O}) = \mathcal{O},$$

es un automorfismo de la curva definido sobre K.

Proposición 1.3.3. *En estas condiciones,* $\operatorname{rg} E(K)$ *es par. Si $P \in E(K)$ no es de torsion, entonces P y $[\omega]P$ son independientes.*

Demostración. Como los puntos $P, [\omega]P, [\omega]^2 P$ están sobre la misma recta horizontal su suma es $\mathcal{O}$, lo que nos dice en terminos de isogenias que $[1] + [\omega] + [\omega]^2 = 0$. Esto nos permite decir que $E(K)$ es un $\mathbb{Z}[\omega]$-modulo. Luego, el espacio $E(K) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, de modo que su dimension sobre $\mathbb{Q}$ es par. Para ver independencia, si $mP + n[\omega]P = \mathcal{O}$, aplicamos $m + n[\omega]^2$ y obtenemos

$$(m^2 - mn + n^2)P = \mathcal{O}.$$

Como P tiene orden infinito y $m^2 - mn + n^2$ solo se anula para $m = n = 0$, los dos puntos son independientes. El mismo argumento se aplica a una relacion modulo torsion, multiplicandola primero por el orden de torsion de ese punto. □

Para nuestras curvas pusimos la condicion de que $d = t^2$ sea un cuadrado para tener en el cuerpo el punto $(0, t)$ que será de 3-torsion y usaremos en el descenso. Si hubiesemos querido que haya otro punto de 3-torsion definido sobre el cuerpo (lo cual ayuda considerablemente al descenso) nos hubieramos topado con el siguiente problema:

Proposición 1.3.4. *Sea K un cuerpo de numeros que contiene ω. Todas las curvas de j-invariante 0 cuya 3-torsion está completamente definida sobre K son isomorfas sobre K a $E : y^2 = x^3 + 16$.*

Demostración. Podemos escribir la curva como E_t. La condicion de que toda la 3-torsion esté en K nos dice que el polinomio de division ψ_3 debe partirse completamente por el teorema 1.3.3.

$$\psi_3(x) = 3x(x^3 + 4t^2).$$

Como $x = 0$ es nuestro punto, el otro factor debe tener una raiz $c \in K^\times$. Entonces de $c^3 = -4t^2$ tenemos que $t = 4(c^2/4t)^3 = tu^3$ para un $u \in K^\times$. De esta forma, como por la proposicion 1.3.2 potencias cubicas en t nos dan la misma curva, todas serán isomorfas a $E : y^2 = x^3 + 4^2$.

Reciprocamente, los nueve puntos de $E[3]$ son los generados por

$$(0, 4), \quad (-4, 4(1 + 2\omega))$$

y todos pertenecen a K. Observemos para facilitar la cuenta que $1 + 2\omega = \sqrt{-3}$. Tambien es facil encontrar explicitamente todos poniendo ω y ω^2 en las coordenadas x, y $\pm$ en las coordenadas y. □

Con esto clasifiquemos completamente la torsion de nuestras curvas para luego poder dar un resultado exacto sobre el grupo de Mordell-Weil. Recordemos que sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ los grupos posibles de torsion son mas que sobre $\mathbb{Q}$, y usaremos la clasificacion completa dada por Najman [Naj10] para este cuerpo.

Proposición 1.3.5. *Sea $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t \neq 0$. La torsion de $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ es*

$$T \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} & t \in (K^\times)^3, \\ (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2 & t \in 4(K^\times)^3, \\ \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} & \textit{en los demas casos.} \end{cases}$$

Demostración. Partimos del punto $(0,t)$ de orden 3. Si tenemos un punto de orden 2, debe satisfacer $y=0$, es decir, $x^3=-t^2$, y entonces tendremos tres puntos de orden 2 (agregando ω en la x). En la lista de Najman esto descarta los grupos ciclicos de orden 6 o 12 y el grupo $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ya que no tienen 3 puntos de 2-torsion. Otra razon es que, si hay 2-torsion, t debe ser un cubo para que $x^3=-t^2$ tenga solucion, lo que nos da una unica curva posible modulo cubos.

Tampoco puede aparecer torsion ciclica de orden 9: el endomorfismo $[\omega]$ actuaria sobre ella como multiplicacion por un entero h que cumpliese $h^2+h+1\equiv 0 \pmod 9$. Modulo 3 esto exige $h\equiv 1$, pero entonces $h^2+h+1\equiv 3 \pmod 9$.

Solo quedan los tres grupos del enunciado, y los primeros dos ya los caracterizamos. □

1.3.7. Reconocer si la curva proviene de un subcuerpo

Siguiendo el enfoque de Savoie [Sav25], diremos que una curva está *genuinamente definida sobre* K si no es isomorfa sobre K a una curva definida sobre un subcuerpo propio. Para $K=\mathbb{Q}(\omega)$ solo debemos descartar que provenga de $\mathbb{Q}$. Tener un coeficiente no racional no basta: un cambio de variables podria eliminarlo. En este capitulo veremos como nos aseguramos que nuestra familia de curvas lo cumpla.

Proposición 1.3.6. *Para $K=\mathbb{Q}(\omega)$, la curva $E_d: y^2=x^3+d$ proviene de $\mathbb{Q}$ si y solo si d es congruente a un racional módulo potencias sextas de K.*

En particular, si algun primo $\mathfrak{p}$ aparece en la factorizacion de (d) con una potencia no multiplo de 6, y su conjugado $\bar{\mathfrak{p}}$ no, entonces la curva está genuinamente definida sobre K.

Demostración. Una curva sobre $\mathbb{Q}$ con $j=0$ admite un modelo $y^2=x^3+q$, con $q\in\mathbb{Q}^\times$, asi que la primera equivalencia sale de la proposicion 1.3.2. La segunda nos dice que, mirando sobre el primo bajo $\mathfrak{p}$, se cumple lo que queremos. □

Para trabajar con primos sobre cuerpos de numeros se suele elegir una congruencia que nos los determine salvo unidades, de forma que tendamos un unico representante para el ideal generado.

Definición. Diremos que un primo π de $\mathbb{Z}[\omega]$ es *primario* si es congruente a 1 modulo 3.

Lema. *Sean π,π' primos primarios, entonces si son asociados son iguales.*

Demostración. Los seis elementos de $\mathcal{O}_K^\times=\{\pm1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$ tienen residuos distintos modulo 3. Como $\pi\equiv\pi'\equiv 1 \pmod 3$, una igualdad $\pi'=\varepsilon\pi$ fuerza $\varepsilon=1$. □

Si queremos tambien asegurarnos que no sean conjugados entre si podemos agregar una condicion de congruencia módulo 2.

Lema. *Sean π,π' primos primarios congruentes a ω módulo 2, entonces $(\pi')\neq(\bar\pi)$.*

Demostración. Supongamos que $(\pi')=(\bar\pi)$. Entonces deben ser iguales por el lema anterior, pero reduciendo módulo 2 tenemos $\pi'\equiv\omega$ y $\bar\pi\equiv\bar\omega=\omega^2$, que son distintos. □

Juntaremos estos lemas para probar lo que queriamos. Todo este procedimiento es analogo al realizado por Savoie en [Sav25].

Corolario 1.3.7. *Sean $a,b\in\mathbb{Z}[\omega]$, con $a\neq 0$, tales que $b-a, b, b+a$ sean primos congruentes a $4+3\omega$ modulo 6. Entonces $E_{a,b}: y^2=x^3+((b-a)b(b+a))^2$ está genuinamente definida sobre K, su torsion es $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ y los puntos*

$$P=(a^2-b^2, a(a^2-b^2)), \qquad [\omega]P$$

son independientes. Si dos pares de parametros a,b producen conjuntos distintos de ideales primos $\{(b-a),(b),(b+a)\}$, las curvas correspondientes no son isomorfas sobre K.

Demostración. Juntando los lemas mostramos que los tres primos son no asociados y que ninguno de sus conjugados divide $t=(b-a)b(b+a)$. Como para todos ellos vale $v_{\mathfrak{p}}(t)=1$, el valor de t no puede ser un cubo ni 4 veces otro, por lo que la proposicion 1.3.5 da torsion $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Para $d=t^2$

tenemos $v_{\mathfrak{p}}(d) = 2$ y $v_{\bar{\mathfrak{p}}}(d) = 0$, asi que la proposicion 1.3.6 nos dice que debe estar genuinamente definida sobre K. El punto P pertenece a la curva por:

$$a^2(a^2-b^2)^2 = (a^2-b^2+b^2)(a^2-b^2)^2 = (a^2-b^2)^3 + b^2(a^2-b^2)^2,$$

y su coordenada x no es cero. Como todos los puntos de torsion los conocemos, P tiene orden infinito; y la independencia se sigue de la proposicion 1.3.3. Por ultimo, para ver que dos distintas no son isomorfas miramos un primo que aparezca en un conjunto y no en el otro. Este tiene valuacion ± 1 en el cociente de los parametros t, por lo tanto no es un cubo y aplicamos la proposicion 1.3.2 para concluir. □

1.3.8. Popurrí

Cuando tengamos una curva eliptica definida sobre K nos van a interesar los puntos en $E(\bar{K})$ y a su vez la accion de Galois del grupo absoluto G_K en nuestros puntos, que en un punto $P = (x, y) \in E(\bar{K})$ será

$$\sigma(P) = (\sigma(x), \sigma(y)) \in E(\bar{K}).$$

Esta accion la usaremos mas adelante para determinar cuando un punto está en $E(K)$, que serán los fijos por la accion; y tiene otra variedad de aplicaciones. Nos interesara en particular que, para isogenias definidas sobre K, su nucleo $E[\phi]$ será un G_K-modulo porque la accion de galois conmuta con la isogenia (es una funcion racional con coeficientes en K). Tambien tiene muchas aplicaciones, la principal siendo que a una curva eliptica se le puede asociar una representacion de Galois utilizando esta accion sobre los grupos $E[l^m]$ para cada primo l, y esto lleva a una amplia teoria de representaciones asociadas a curvas elipticas, formas modulares y L-series.

Otra herramienta muy utilizada tambien en la geometria algebraica es el concepto de divisores: sumas formales indexadas, en este caso, por los puntos de la curva.

$$D = \sum_{P \in E} n_P(P).$$

Pidiendo soporte finito, estos forman el grupo de divisores de la curva $\mathrm{Div}(E)$. Cada divisor tendrá un grado que será la suma en $\mathbb{Z}$ de sus coeficientes n_P, cada funcion racional en la curva tiene un divisor asociado relacionado a sus raices y polos, y cocientando el grupo de divisores por el de asociados a funciones se obtiene el grupo de Picard denotado $\mathrm{Pic}(E)$. El gran resultado sobre curvas elipticas es que $E \cong \mathrm{Pic}^0(E)$ el subgrupo de grado cero; que nos dice que si al ver a un divisor como una suma de puntos en la curva corresponde a $\mathcal{O}$, entonces hay una funcion en la curva que tiene como raices o polos esos puntos con la multiplicidad en que aparecian, es decir el divisor es principal.

Tambien es importante mencionar que existe el *emparejamiento de Weil*, que, dado un n, es una funcion

$$e_n : E[n] \times E[n] \to \mu_n$$

bilineal, alternada, no degenerada y compatible con la accion de Galois. Ademas este emparejamiento cumple muchas más propiedades, y algunas contaremos cuando las vayamos a utilizar.

De la misma manera, asociada a la dual de una isogenia ϕ de grado n existe

$$e_{\hat{\phi}} : E'[\hat{\phi}] \times E[\phi] \to \mu_n$$

que nos servirá para, cuando $E[\phi]$ sea ciclico y fijemos un generador Q_0, dar un isomorfismo $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ compatible con Galois. Esta identificacion puede describirse explicitamente con funciones racionales, y usaremos esto para el metodo para acotar el rango superiormente.

1.4. Recapitulacion

Es importante detenerse un segundo a pensar en para que sirve todo esto. Dijimos que estabamos trabajando con $E(\mathbb{Q})$ el conjunto de soluciones (sobre los racionales para simplificar) de nuestra ecuacion, y encontramos una estructura para él, es decir una relacion entre soluciones que nos

permitirá encontrar nuevas, estimar cuantas nos faltan y saber cuando las tenemos todas. Tomemos los ejemplos

$$E_1 : y^2 = x^3 + 1 \quad E_2 : y^2 = x^3 + 2$$

que a simple vista uno esperaria que se comporten parecido, y tambien que son interesantes si uno quiere saber cuando un cuadrado es el siguiente o dos más que un cubo.

Simplemente probando encontramos valores para cada una:

$$P_1 = (2, 3) \in E_1(\mathbb{Q}) \text{ pues } 3^2 = 2^3 + 1$$

$$\text{y } P_2 = (-1, 1) \in E_2(\mathbb{Q}) \text{ pues } 1^2 = (-1)^3 + 2.$$

Como vimos en la seccion anterior, podemos calcular los valores de $n \cdot P_i$ para algunos n. Primero veamos con la formula de duplicacion:

$$x(2 \cdot P_1) = \left(\frac{3x(P_1)^2}{2y(P_1)}\right)^2 - 2x(P_1) = \left(\frac{3 \cdot 2^2}{2 \cdot 3}\right)^2 - 2 \cdot 2 = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0$$

y el valor de $y(2 \cdot P_1)$ es 1, por lo que obtuvimos un punto nuevo de la curva, el $(0, 1)$. Ahora veamos $3 \cdot P_1$ como $2 \cdot P_1 + P_1$ calculando la pendiente entre ellos y luego donde interseca la curva:

$$m = \frac{y(P_1) - y(2P_1)}{x(P_1) - x(2P_1)} = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1 \implies x(3P_1) = m^2 - x(2P_1) - x(P_1) = 1 - 2 = -1$$

y reemplazando en la ecuacion obtenemos $y(3P_1)^2 = (-1)^3 + 1 = 0$ por lo que encontramos el punto $(-1, 0)$, necesariamente de 2-torsion. Esto nos dice que el punto $(2, 3)$ con el que empezamos era de orden 6. Haciendo otras cuentas simples podemos ver que esa es toda la torsion y más adelante veremos una forma de probar que el rango de esta curva es 0, pero si asumimos ahora que podemos hacer todo esto entonces tendriamos una prueba de que: "El unico caso no trivial de un cubo racional que al sumarle 1 es un cuadrado es el 8".

El caso de $P_2 = (-1, 1)$ es distinto:

$$x(2 \cdot P_2) = \left(\frac{3 \cdot (-1)^2}{2 \cdot 1}\right)^2 - 2 \cdot (-1) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2 = \frac{17}{4}.$$

Como vemos que el punto nuevo encontrado no es entero, por el teorema de Nagell-Lutz sabemos que no es de torsion, por lo cual podemos saber que la curva tendrá rango positivo, es decir infinitas soluciones, sin mas que haber encontrado un punto "obvio" y haberlo duplicado con la formula. Y no solo sabemos que existen infinitas soluciones, sino que tambien las podemos generar. Por ahora, con unos simples calculos ya encontramos que

$$\left(-\frac{71}{8}\right)^2 = \left(\frac{17}{4}\right)^3 + 2,$$

pero usando los polinomios que mencionamos previamente podriamos calcular muy rapidamente $10 \cdot P_2$ para descubrir la solucion:

$$\left(\frac{7101756495124011219835271161698654764912754876409}{503495702843736899291241563309296288291069637783 2}\right)^2 = \left(-\frac{643637522494550708791373072390 23}{293763056960316465372944069236324}\right)^3 + 2.$$

Capítulo 2

Superficies elipticas

En este capitulo presentaremos a las superficies elipticas de un modo orientado a la aplicacion que nos interesa: proveer familias de ejemplos de curvas elipticas con puntos independientes prefijados, que en particular tienen una cota inferior del rango, y con parametros que podamos controlar.

Si queremos trabajar con curvas elipticas que cumplan una propiedad fija, lo natural es agregarles un parametro T y codificar en él la informacion que querramos. Lp que mas nos va a interesar es la seccion de los teoremas de especializacion, que nos dice que al especializar nuestro parametro en un elemento del cuerpo, la curva eliptica que queda cumple las propiedades deseadas. La mejor referencia para comenzar con el tema puede ser el capitulo 3 del "advanced" de Silverman [Sil94], y para seguir recomendamos el articulo por Schütt y Shioda [SS10].

Por ejemplo, si nos interesa el caso de j-invariante igual a 0 nuestras curvas tendran la forma $y^2 = x^3 + d$; y si ademas queremos tener un punto de 3-torsion asegurado para el 3-descenso, entonces, notando que si $x = 0$ queda $y^2 = d$ y esto puede tener dos soluciones, tenemos que la curva

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2$$

tiene siempre un punto de 3-torsion y j-invariante igual a 0 ($t \neq 0$ para que no sea singular). Ahora vamos a querer presentar un resultado donde tengamos una familia de curvas de rango positivo, asi que busquemos mas condiciones sobre t para que esta curva tenga un punto asegurado. Probando el caso mas simple: poner $x = t$ y ver que forma tendria que tener y, llegamos a que si $t^3+t^2 = t^2(t+1)$ es un cuadrado entonces podriamos reemplazar en y. De esta forma encontramos la familia

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$$

que tiene el punto $(k^2-1, k(k^2-1))$. Este punto tiene orden infinito sobre $\mathbb{Q}(k)$, como comprobaremos al estudiar un cambio de parametro en la seccion 2.2. Esto da rango generico positivo, aunque no necesariamente en cada especializacion: para $k = 0$ el punto tiene orden 2, y para $k = \pm 1$ la ecuacion es singular.

2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil

Hay varias definiciones de lo que es una superficie eliptica, pero la idea deberia ser tener una familia de curvas elipticas "a un parametro". Podemos considerar

$$F_T : y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$$

para dos funciones racionales $A(T), B(T) \in K(T)$ y querriamos que cuando reemplazamos T por $t \in K$ tengamos una curva eliptica $F_t : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)$. Para ello necesitamos que el discriminante

$$\Delta_{F_T} = -16(4A(T)^3 + 27B(T)^2)$$

no se anule; lo que se traduce a pedir que la funcion Δ_{F_T} no sea constantemente cero, que t no sea una raiz de ella y evidentemente tenemos que tener cuidado con los valores de los polos de $A(T)$ y $B(T)$.

Tambien es posible querer tener más parametros, pero pensando tambien en querer especializar "una sola vez", es decir tener una relacion entre ellos que los haga una familia a un parametro. Si fuesen dos parametros relacionados, esto se podria representar como una curva $\mathcal{C}$, pensandola como la relacion entre los parametros, y con A y B viviendo en el cuerpo $K(\mathcal{C})$ de funciones definidas en los puntos de la curva; y nuevamente con alguna condicion para que cada evaluacion de A y B en un punto de la curva nos de una curva eliptica. El caso anterior sería tambien un caso particular de este tomando la recta $\mathbb{P}^1(K)$.

Otra forma de definir superficies elipticas (la que usaremos finalmente) es considerar el t como una variable más y ver el conjunto

$$\mathcal{E} = \left\{(x, y, t) \in K^3 : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)\right\}$$

que es una subvariedad de dimension dos de K^3 (es decir una superficie) formada por una familia de curvas elipticas. Nuevamente esto no basta y nos faltan muchos detalles tecnicos sobre los puntos de discriminante cero y los polos de las funciones; y tambien de nuevo se puede considerar $t \in \mathcal{C}$ y ver $\mathcal{E} \subseteq K^2 \times \mathcal{C}$.

Algo que estamos pasando por alto en esta lógica es que las curvas elipticas, como las definimos, vienen provistas de un punto distinguido $\mathcal{O}$, en particular que deberiamos estar considerando pares de la forma $(\mathcal{E}_t, \mathcal{O}_t)$ de curvas elipticas con su elemento neutro. La familia algebraica $\mathcal{E}$, que proviene de una ecuacion en A y B funciones en $\mathcal{C}$, tiene que tener tambien la propiedad de que los puntos $\mathcal{O}_t$ sean una familia algebraica, es decir que tambien esten definidos como una funcion en $\mathcal{C}$. Esta propiedad se puede ver tambien como que la funcion $\sigma_{\mathcal{O}} : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ que nos da $\sigma_{\mathcal{O}}(t) = \mathcal{O}_t$ debe ser un morfismo de variedades algebraicas. Observemos que si tenemos nuestros puntos en $\mathcal{E}$ como (x, y, t) entonces la proyeccion π en la tercera coordenada cumple que $\pi(\sigma_{\mathcal{O}}(t)) = t$, que es la definicion de pedir que $\sigma_{\mathcal{O}}$ sea una seccion de π.

Entonces estamos listos y motivados para la definicion:

Definición 2.1.1 (Superficie eliptica)**.** Dada $\mathcal{C}$ una curva no singular, una superficie eliptica sobre $\mathcal{C}$ consiste de lo siguiente:[1]

I. una variedad $\mathcal{E}$ de dimension dos,

II. un morfismo $\pi : \mathcal{E} \to \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{E}_t = \pi^{-1}(t)$ es una curva eliptica para todo $t \in \mathcal{C}(\bar{K})$ salvo finitos,

III. y una seccion distinguida $\sigma_{\mathcal{O}}$ de π.

Esta nocion de superficie eliptica es equivalente a la de una curva eliptica definida sobre un cuerpo $K(\mathcal{C})$, la demostracion de esto requiere herramientas de geometria algebraica y muchas definiciones, no la daremos aca pero esta bien mencionar el analogo al grupo de puntos y sus propiedades:

Definición 2.1.2 (Grupo de secciones)**.** El conjunto

$$\mathcal{E}(\mathcal{C}) = \{\text{secciones } \sigma : \mathcal{C} \to \mathcal{E}\}$$

con las operaciones

$$(\sigma_1 + \sigma_2)(t) = \sigma_1(t) +_{\mathcal{E}_t} \sigma_2(t) \quad \text{y} \quad (-\sigma)(t) = -_{\mathcal{E}_t}(\sigma(t))$$

realizadas sobre las fibras, pues (casi todas) son curvas elipticas y entonces podemos sumar e invertir sobre ellas, y con elemento neutro $\sigma_{\mathcal{O}}$, es el grupo abeliano de secciones de la superficie eliptica.

Dos cosas que querriamos ahora son un analogo al teorema de Mordell-Weil, es decir que este grupo sea finitamente generado, y poder distinguir los casos triviales de los interesantes. Esto ultimo se refiere a que uno podria tener una curva eliptica definida sobre K y decir que está definida sobre $K(\mathcal{C})$, o tambien tenerla sobre $K(\mathcal{C})$ pero que sea isomorfa a una definida sobre K, y ambos casos

[1] Trabajamos con curvas y superficies lisas y proyectivas, y con el modelo relativamente minimal de la superficie. Estas hipotesis y la construccion a partir de la ecuacion se desarrollan en [Sil94, cap. III, seccion 3].

querriamos evitarlos para que la superficie realmente parametrice una familia de curvas elipticas "distintas". Es facil ver que esta condicion es equivalente a pedir que la superficie $\mathcal{E}$ no sea de la forma $E_0 \times \mathcal{C}$ para una curva eliptica E_0 definida sobre el cuerpo K, ya que en este caso todas las fibras serian E_0. La equivalencia de superficies que nos interesa aca es mediante mapas birracionales (racionales en ambas direcciones) que respeten el morfismo $\mathcal{E} \to \mathcal{C}$. Si $\mathcal{E} \sim E_0 \times \mathcal{C}$ se dice que la superficie es *split*, y caso contrario *non-split*. Resulta que en el caso de cuerpos arbitrarios estos dos elementos vienen de la mano:

Teorema 2.1.3 (Mordell-Weil para cuerpos de funciones)**.** *Sea $\mathcal{E} \to \mathcal{C}$ una superficie eliptica definida sobre un cuerpo K. Si $\mathcal{E}$ es non-split, entonces $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ es finitamente generado.*

Este teorema corresponde al 6.1 del capitulo 3 del libro de Silverman [Sil94], y su demostracion se puede encontrar alli, principalmente leyendo la seccion anterior. En realidad, para cuerpos de numeros especificamente, el teorema es cierto sin pedir la hipotesis de non-split. Veamos rapidamente por qué en el caso de $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$: Si la superficie es de la forma

$$E_0 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1,$$

entonces sus secciones serán morfismos $\mathbb{P}^1 \to E_0$, pero estos deben ser constantes[2]. Luego, si a cada seccion le asignamos su imagen (un punto en E_0) tenemos el isomorfismo $E(K(\mathbb{P}^1)) \cong E_0(K)$, y sabemos que el segundo es finitamente generado por el teorema de Mordell-Weil original (aca usamos que K es un cuerpo de numeros). Para una curva en general no tendremos la asociacion directa a puntos, sino una sucecion exacta corta

$$0 \to E_0(K) \to E_0(K(\mathcal{C})) \to \mathrm{Hom}_K(J_\mathcal{C}, E_0) \to 0$$

donde ambos grupos de los costados son finitamente generados.[3]

La teoria de superficies elipticas a partir de este punto se pone mas tecnica, con metodos para estudiar las fibras de mala reduccion y clasificarlas, eliminar las singularidades de la superficie con herramientas de geometria algebraica, concluyendo con una clasificacion de superficies no-singulares.

2.2. Superficies elipticas racionales y K3

En esta seccion presentaremos una clasificacion de las superficies elipticas, hay herramientas para estudiar su rango y mas propiedades en cada caso que no presentaremos pero se pueden buscar, especialmente en el articulo de Schutt-Shioda [SS10]. Seguiremos la presentacion de Elkies [Elk07], basada en el trabajo de Shioda [Shi90].

Dada una familia $y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$, luego de eliminar denominadores y tomar $A, B \in K[T]$, sus grados (como polinomios) permiten clasificar la superficie. Para que esto tenga sentido necesitamos decir algo sobre modelos, porque podriamos tener muchas ecuaciones para una misma superficie. Esto se realiza solo para la clasificacion u otros motivos geometricos. Por ejemplo, el modelo minimal de nuestra superficie usa un T^2 que podria simplificarse a T, pero perderia la informacion aritmetica que nos interesa.

Para obtener una ecuacion de Weierstass minimal, debemos eliminar todo polinomio irreducible q para el cual $q^4 \mid A$ y $q^6 \mid B$ con el mismo metodo que usabamos en curvas: el cambio $x = q^2 x_1$, $y = q^3 y_1$ divide los coeficientes por q^4, q^6 y el discriminante por q^{12}. Luego de esto tenemos que proyectivizar, es decir agregar el punto del infinito a nuestra recta de parametros. Para esto se define el numero m como el menor entero no negativo tal que

$$\mathrm{gr}(A) \leq 4m, \qquad \mathrm{gr}(B) \leq 6m,$$

y con él se hace el cambio de variables

$$X = \frac{x}{T^{2m}}, \qquad Y = \frac{y}{T^{3m}}.$$

[2] Esto es un hecho conocido de geometria algebraica: todos los morfismos de una curva de genero 0 a una de genero 1 son constantes.

[3] Para escribir esta sucesion con la sobreyectividad indicada suponemos que $\mathcal{C}$ tiene un punto en K, que usamos como punto base. $J_\mathcal{C}$ es su jacobiana.

Por la definicion de m nos quedan polinomios en $s = 1/T$ y podemos evaluarlos en 0 para obtener el comportamiento en $T = \infty$.

Lo que nos faltaria es resolver los puntos singulares de la superficie, que se hace geometricamente mediante blow-ups, que no vamos a contar pero no hace falta tampoco. Una vez hecho esto tenemos el *modelo minimal de Kodaira-Neron*, y la siguiente clasificacion:

Proposición 2.2.1. *Dado un modelo minimal, el entero m determina los siguientes casos [SS10]:*

1. *Si $m = 0$, la curva es constante y $\mathcal{E}$ es el producto de una curva eliptica por $\mathbb{P}^1$.*
2. *Si $m = 1$, $\mathcal{E}$ es una superficie eliptica geometricamente racional.*
3. *Si $m = 2$, $\mathcal{E}$ es una K3 eliptica.*
4. *Si $m > 2$, $\mathcal{E}$ es una superficie propiamente eliptica, de dimension de Kodaira 1.*

Para nuestra aplicacion, el caso $m = 0$ no nos interesa ya que corresponde a una superficie split. El caso $m = 1$ permite calcular el rango geometrico (que nos interesa para nuestro rango sobre $K(T)$) a partir de las fibras singulares y buscar generadores de los puntos resolviendo finitas identidades. Aqui *geometricamente racional* significa birracional a $\mathbb{P}^2$ sobre $\bar{K}$. Con $m = 2$ podemos alcanzar rangos geometricos mayores y aprovechar distintas fibraciones elipticas[4] sobre una misma K3. Ambos tienen igualmente cotas de maximo rango posible.

El caso $m > 2$ tambien permite construir familias de rango alto, pero no presenta esa posiblidad de tener mas de una fibracion eliptica. El rango que uno puede obtener en la superficie se reduce a medida que aumenta la cantidad de fibras singulares, y el metodo para deshacernos de ellas era el de cambiar la fibracion por una con menos, y por eso no se utilizan estas superficies para los metodos que queremos.

No vamos a entrar en estos temas, pero en los articulos citados se encuentran las herramientas para trabajar con cada caso. Todavia no fueron aplicadas estas herramientas mas complejas en los tipos de resultados que nos interesan.

2.3. Teoremas de especializacion

Vamos a comentar la recopilacion del apendice C, seccion 20, de Silverman [Sil09], conservando tambien la version que usaremos para nuestra familia.

Recordemos que a nosotros nos interesa generar una familia de curvas elipticas con caracteristicas particulares de su grupo de Mordell-Weil, y que dijimos que ibamos a hacer esto via especializacion de una superficie eliptica. Hasta ahora vimos (comentamos) la construccion de ese grupo en el contexto de superficies elipticas y algunas de sus propiedades. Veamos ahora cuando esas propiedades se traspasan a las curvas que obtenemos.

Si tenemos una superficie eliptica $\mathcal{E} \to \mathcal{C}$ y un punto $P \in E(K(\mathcal{C}))$ en la curva eliptica asociada, habiamos definido que la seccion $\sigma_P : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ que notamos $t \mapsto P_t$ era el analogo a los puntos. Intuitivamente era como elegir en cada curva *el mismo punto* a lo largo de la superficie. Dando vuelta esta asignacion podemos decir que cada $t \in \mathcal{C}(K)$ cuya fibra sea no singular define un mapa de especializacion

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K), \qquad P \longmapsto P_t.$$

En una ecuacion de Weierstrass, eso no es mas que reemplazar el parametro T por t, usando coordenadas proyectivas si aparecen polos. Es un morfismo de grupos por la definicion que dimos de suma de secciones.

Conservar el grupo al especializar

El teorema de irreducibilidad de Hilbert nos decia que, dado un polinomio irreducible en dos variables, hay infinitas especializaciones en una de ellas que lo mantienen irreducible (como polinomio de una variable ahora). Algo similar a esto nos interesaría que ocurra con nuestras superficies

[4] Dos fibraciones elipticas distintas serán dos formas de especializar en la superficie para obtener curvas elipticas, pero que no sean "cambiar T por T+1" sino realmente tener curvas diferentes.

elipticas: que las especializaciones sean curvas elipticas y que preserven sus relaciones algebraicas (es decir, el grupo de Mordell-Weil).

Primero podemos considerar familias con varios parametros independientes. Néron demostro que hay infinitas especializaciones que conservan todos los puntos y sus relaciones, usando una generalizacion del teorema de irreducibilidad de Hilbert.

Teorema 2.3.1 (Néron)**.** *Sea E una curva eliptica sobre $K(T_1, \dots, T_m) = K(\mathbb{P}^m)$, con $m \geq 1$. Hay infinitos $t \in \mathbb{P}^m(K)$ para los cuales la especializacion está definida y el morfismo*

$$\sigma_t : E(K(\mathbb{P}^m)) \longrightarrow E_t(K)$$

es inyectivo.

Esto no nos basta para especializar en cualquier lado, como necesitamos poner condiciones al t vamos a querer tener infinitos con ciertas congruencias (por ejemplo). Esto se puede arreglar aún usando el teorema anterior o simplemente ver el siguiente resultado de Silverman que nos da una condicion que es suficiente: las excepciones son finitas.

Teorema 2.3.2 (Silverman)**.** *Sea $E/K(\mathcal{C})$ una curva eliptica con j-invariante no constante. El mapa*

$$\sigma_t : E(K(\mathcal{C})) \longrightarrow \mathcal{E}_t(K)$$

está definido y es inyectivo para todos salvo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$.

Esta es la version del teorema 20.3 del apendice C. La misma conclusion vale si la superficie es non-split, por [Sil94, cap. III, teorema 11.4]. Esta version mas amplia es la que nos interesa para familias con $j = 0$: que el j-invariante sea constante no implica que la familia sea split.

La forma de ver lo que queremos es que si tenemos r puntos independientes en $E(K(\mathcal{C}))$ entonces sus especializaciones serán independientes por inyectividad, ya que una combinacion que nos de $\mathcal{O}$ podria traerse a la superficie. Similarmente se mantiene la torsion. En particular, el rango de las curvas es al menos el de la superficie fuera de esas excepciones.

La demostracion utiliza la teoria de alturas: al crecer la altura de t, las alturas canonicas de los puntos especializados, normalizadas por esa altura, se aproximan a las de las secciones. Lo mismo ocurre con sus emparejamientos. Entonces la matriz de alturas de puntos independientes conserva determinante no nulo para $h(t)$ suficientemente grande, y se mantiene la independencia.

Cuando el rango de una especializacion es estrictamente mayor que el de la superficie se dice que hay un *salto de rango*, pero sobre cuando ocurre esto no se sabe realmente mucho. Para familias no triviales sobre $\mathbb{Q}$, se espera que las especializaciones de rango igual al generico o uno mayor tengan densidad total 1, respecto a la altura del parametro. Ni siquiera se sabe en general si hay infinitas sin salto de rango. El prmier paper de Zywina da el primer ejemplo no isotrivial donde se demuestra esa infinitud [Zyw25a] con los metodos que estamos contando.

Que podemos llevarnos a las curvas

Chequear la independencia de secciones en la superficie puede ser dificil, o al menos lo es mas que chequear independencia de los puntos en alguna especializacion, y la siguiente observacion nos dice que eso basta para obtener independencia en toda la superficie:

Observación 2.3.3. Sean $P_1, \dots, P_r \in E(K(\mathcal{C}))$. Si en una fibra no singular sus especializaciones son independientes modulo torsion, entonces los puntos originales tambien lo son.

Demostración. Una relacion entre los P_i que diese un punto de torsion produciria la misma relacion modulo torsion al especializar. La independencia en la fibra obliga a que todos sus coeficientes sean cero. □

La torsion se conserva incluso en cada fibra no singular, y este resultado "ya lo vimos". Recordemos que, en el capitulo 1 vimos que al reducir modulo primos, la torsion (de orden no divisible por la caracteristica del cuerpo residual) conserva su orden. Este resultado vale para todo cuerpo, y aca lo usaremos para $K(\mathcal{C})$. La condicion que usamos es que ese orden sea invertible luego de reducir. Al especializar en $t \in \mathcal{C}(K)$ (que para $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$ es como reducir modulo $T - t$), el cuerpo residual es K y todo es invertible:

Observación 2.3.4. Sea $E/K(\mathcal{C})$ una curva eliptica. Para todo $t \in \mathcal{C}(K)$ cuya fibra sea no singular, la especializacion es inyectiva sobre

$$E(K(\mathcal{C}))_{\text{tors}} \longrightarrow \mathcal{E}_t(K)_{\text{tors}}.$$

En particular, un punto de orden n especializa a un punto de orden exactamente n.

Notemos que puede haber más torsion, y para evitar esto vamos a tener que hacer un analisis de las curvas.

Para hacer descenso tambien necesitamos llevarnos la isogenia, no solo sus puntos del nucleo. Sus formulas son funciones racionales cuyos coeficientes pertenecen a $K(\mathcal{C})$; podemos especializarlos, pero debemos excluir los parametros donde las curvas sean singulares o las formulas degeneren. Igualmente vamos a tener el resultado que queremos:

Proposición 2.3.5. *Sean E, E' curvas elipticas sobre $K(\mathcal{C})$ y sea $\phi : E \to E'$ una isogenia de grado $n \geq 1$ definida sobre ese cuerpo. Para todos salvo finitos $t \in \mathcal{C}(K)$, especializa a una isogenia*

$$\phi_t : \mathcal{E}_t \longrightarrow \mathcal{E}'_t$$

definida sobre K y de grado n. Si $\text{nu}(\phi) = \langle T_0 \rangle$ para un punto $T_0 \in E(K(\mathcal{C}))$ de orden n, entonces $\text{nu}(\phi_t) = \langle (T_0)_t \rangle$.

La demostracion no la presentaremos, pero es nuevamente excluir finitos parametros por todo lo que podria reducir mal o bajar el grado, y en los lugares restantes es un mapa racional que manda el neutro al neutro, entonces es morfismo y respeta la ley de grupo.

Ejemplo 2.3.6. En nuestra familia sobre $K = \mathbb{Q}(\omega)$ tenemos

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2-1)^2, \qquad E'_k : y^2 = x^3 - 27(k^2-1)^2.$$

Y la isogenia proveniente de cocientar por el generador de la 3-torsion, tomando $t = k^2 - 1$, queda, fuera del nucleo,

$$\phi_k(x,y) = \left(\frac{x^3 + 4(k^2-1)^2}{x^2}, \frac{y\left(x^3 - 8(k^2-1)^2\right)}{x^3} \right).$$

Lo que probamos es que, para cada $k_0 \in K$ con $k_0 \neq \pm 1$, basta reemplazar k por k_0: obtenemos una isogenia de grado 3 con nucleo $\langle (0, k_0^2 - 1) \rangle$. Los valores $k_0 = \pm 1$ se excluyen porque ambas curvas son singulares. Tambien tendriamos que excluir los denominadores de la isogenia en x, pero no excluyen otros parametros porque los puntos con $x = 0$ forman, junto con $\mathcal{O}$, el nucleo y se envian a $\mathcal{O}$ (Vélu nos da la formula en todos los puntos fuera del nucleo).

2.4. Construir superficies elipticas de rango alto

Lo primero para mencionar en esta seccion es que no hay una teoria para obtener relaciones entre los parametros. Hay diversas maneras de obtenerlos contadas (o no) a lo largo de la bibliografia, y presentaremos algunas como ejemplos.

Recordemos que queremos r puntos independientes sobre $K(\mathcal{C})$. Podemos elegir la forma de los puntos y buscar los coeficientes que hagan que todos pertenezcan a la misma curva.

La que utilizamos para nuestras curvas fue muy simple: primero determinamos la forma necesaria para j-invariante 0 y un punto de 3-torsion: $y^2 = x^3 + t^2$ y luego determinamos t para tener un punto libre. La idea de poner $x = t$ fue arbitraria, pero nos dio una opcion posible: como quedó $y^2 = t^2(t+1)$ solo hizo falta que $t+1$ sea un cuadrado. De esta forma, con $t = k^2 - 1$ conseguimos tener el punto $(t, t\sqrt{t+1})$ en la curva (y definido en el cuerpo).

Veamos construcciones mas complejas.

2.4.1. Construcciones mediante identidades

Otra construccion para $j = 0$ la dan Choudhry y Zargar [CZ16] con la siguiente idea: En nuestra familia $y^2 = x^3 + t^2$ (los autores escriben k en lugar de t) queremos que varias diferencias $v_i^2 - u_i^3$ sean el mismo cuadrado. Reescribamos sus formulas para ver la identidad que las hace funcionar.

Para parametros a, b, c, pongamos

$$s = a^6 + b^6 + c^6 - 2(a^3b^3 + a^3c^3 + b^3c^3),$$
$$r = -8(a^3 + b^3 - c^3)(a^3 + c^3 - b^3)(b^3 + c^3 - a^3),$$

y vamos a dar 3 puntos independientes en la curva

$$E : y^2 = x^3 + (rs)^2.$$

Con $q_a = d - 4a^3(a^3 - b^3 - c^3)$ y q_b, q_c intercambiando ciclicamente a, b, c nos quedan $q_a^2 - d^2 = a^3r$, y entonces multiplicando por r^2 tenemos

$$(q_a r)^2 - (rs)^2 = (ar)^3$$

para cada uno de los a, b, c tenemos un punto independiente (salvo que especialicemos especialmente mal) dandonos rango al menos 3.

Para quedarnos con una superficie sobre $\mathbb{P}^1$, podemos fijar $a = 1$, $b = 2$, $c = T$. Entonces

$$r(T) = -8(9 - T^3)(T^3 - 7)(T^3 + 7),$$
$$s(T) = T^6 - 18T^3 + 49,$$
$$E_T : y^2 = x^3 + (r(T)s(T))^2,$$

y las secciones son

$$P_1 = (r, r(s + 4T^3 + 28)),$$
$$P_2 = (2r, r(s + 32T^3 - 224)),$$
$$P_3 = (Tr, r(s - 4T^3(T^3 - 9))).$$

Despues de esto se prueba independencia de los puntos especializando en una fibra como $T = 3$. Podriamos haber utilizado casi cualquier especializacion para a y b, o tambien una relacion entre ellos y c de forma que quede una curva $\mathcal{C}$ de parametros.

Para haber aplicado el metodo del descenso en esta superficie tendriamos que controlar los primos que dividen al discriminante

$$\Delta(T) = -2^{16}3^3\left[(9 - T^3)(T^3 - 7)(T^3 + 7)(T^6 - 18T^3 + 49)\right]^4,$$

pero con esta especializacion no va a ser posible. Otra opcion es la de considerar $c = a + b$ para que se cancelen los factores de grado 3 y 6, donde los factores irreducibles son a lo sumo cuadraticos y se puede pasar a los siguientes pasos. Queda para otro momento.

2.4.2. Herramientas geometricas y el metodo de Elkies

Las identidades anteriores son faciles de verificar una vez encontradas, pero buscar muchas a la vez produce sistemas grandes. Las superficies K3 permiten organizar esa busqueda con herramientas procedientes de la geometria que no llegamos a presentar. Contaremos el proceso solo para mencionar que existe y los elementos usados. La referencia expositiva principal es [Elk07]; las formulas completas de su ejemplo de rango 17 están en [Elk26].

1. *Elegir la geometria que permita el rango buscado.* Asociado a la superficie existe el grupo de Neron-Severi, que depende de las intersecciones de las curvas por ella, y su rango libre nos da una cota para el de $E(\bar{K}(T))$. Entonces necesitamos un grupo de Néron-Severi grande y pocas componentes de fibras reducibles. Elkies elige las intersecciones que deberian tener los divisores y las secciones usando reticulos. Esto impone restricciones antes de buscar los coeficientes de una ecuacion.

2. *Encontrar una superficie definida sobre el cuerpo deseado.* Ciertas familias de K3 con esos divisores se parametrizan por curvas modulares o de Shimura. Buscar puntos racionales en ellas permite escoger una superficie sobre $\mathbb{Q}$. Todavia hay que comprobar que las secciones que interesan tambien estén definidas sobre $\mathbb{Q}$.

3. *Cambiar la fibracion si conviene.* Una misma K3 puede admitir distintas fibraciones elipticas, y la cota del rango de la superficie depende de ellas. Esto permite partir de una ecuacion facil de construir y buscar otra fibracion que deje mas rango para las secciones. Un metodo utilizado comunmente para esto es el *cambio de base*.

4. *Recuperar las ecuaciones y comprobarlas.* Las intersecciones elegidas se traducen en condiciones polinomiales para los coeficientes de la superficie y de sus puntos. Elkies combina busquedas modulo un primo, levantamientos p-adicos y reconstruccion racional. Al encontrar candidatos se verifican las condiciones y la independencia de los puntos.

En el ejemplo de [Elk26] se dan 17 secciones independientes, que es lo maximo para una superficie K3 sobre $\mathbb{Q}$.

Otra herramienta es el *cambio de base*, que dada una condicion geometrica especifica, se puede realizar para convertir una curva en una seccion nueva, aumentando asi el rango. El ejemplo de hacer $t \mapsto k^2 - 1$ es un caso de esto, donde "agregamos $\sqrt{t+1}$ al cuerpo". Asi Elkies obtiene, a partir de la K3 de rango 17, cambios de base con rango al menos 18 sobre $\mathbb{Q}(T)$. Las nuevas superficies ya no son K3.

Tambien es importante mencionar que, historicamente, a partir de este tipo de resultados es que se empiezan a buscar superficies de rango alto y aquellas especializaciones donde crece lo maximo posible para encontrar curvas de rango alto. Hasta la salida del libro de Silverman [Sil94] se habian encontrado sobre $\mathbb{Q}$ familias de rango 13 por Nagao, y curvas de rango al menos 21 por Nagao y Kouya. Hoy las construcciones a partir de K3 llegan a rango al menos 18 de Elkies y el record conocido para curvas sobre $\mathbb{Q}$ es rango al menos 31, de Alpöge y Howell [Duj26]; esa curva no proviene de la misma superficie y fibracion de Elkies [Elk26], sino que de otra K3 con rango 17. La busqueda de superficies con muchas secciones y de curvas con muchos puntos independientes sigue abierta:

> And the quest continues!
>
> Silverman

2.5. Otras herramientas

Como al seleccionar una familia de curvas con cierta cantidad de puntos independientes aún no tenemos la certeza de que vamos a poder acotar su rango superiormente, podemos orientar la contruccion con conjeturas suponiendo que, de ser cierto lo que afirmen, son mas herramientas para tener en cuenta. Es importante mencionar que, el uso de estas es para orientar la construccion, pero la demostracion posterior de que la familia cumpla es independiente. Tambien presentaremos herramientas relacionadas con el rango para calcularlo o relacionarlo con demas elementos.

El root number y la paridad

El *root number* es un signo $W(E/K) \in \{1, -1\}$ que se relaciona con diversas conjeturas (y teoremas), una de los cuales lo relaciona con la paridad del rango:

Conjetura 2.5.1 (Paridad)**.** Para toda curva eliptica sobre un cuerpo de numeros,

$$(-1)^{\operatorname{rg} E(K)} = W(E/K).$$

El signo se puede calcular como un producto de factores locales

$$W(E/K) = \prod_{v \in M_K} W_v(E).$$

Los lugares de buena reduccion aportan 1, y cada lugar real o complejo aporta -1. En reduccion multiplicativa el factor es -1 si es split y 1 si no lo es. En reduccion aditiva hay formulas locales, con especial cuidado en los primos sobre 2 y 3; veanse [Sil09, apendice C, seccion 16].

Una forma de utilizar esto se ve en [Zyw25b] donde, por tener rango entre 2 y 3, busca una familia de parametros para rango 2 que garantice $W(E/K) = 1$.

Estabilidad en extensiones cuadraticas

Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y su "twist cuadratico por D" que es la curva $E^{(D)} : Dy^2 = x^3 + Ax + B$, llamada asi por ser isomorfa a la original sobre $L = K(\sqrt{D})$, tenemos una relacion entre los rangos:

$$\operatorname{rg} E(L) = \operatorname{rg} E(K) + \operatorname{rg} E^{(D)}(K).$$

Podemos usar esta herramienta para, una vez probado el rango de dos de ellas, obtener el tercero. Zywina usa este hecho junto con su familia de curvas de rango 1 sobre $E(L)$ para dar otro contraejemplo de problema 10 de Hilbert.

Capítulo 3

Metodo de descenso y grupo de Selmer

En este capitulo presentaremos la forma de obtener una cota superior para el rango, conocida como metodo del descenso. La idea es encontrar un morfismo inyectivo que salga de los puntos independientes de la curva y que podamos controlar su imagen en el grupo que caiga. Un ejemplo muy claro de 2-descenso está presentado en el libro de Silverman y Tate [ST15] y el de Silverman [Sil09]. Aca daremos un ejemplo puntual de 3-descenso para motivar y tambien porque es el que será usado despues.

Supongamos que tenemos una curva de la forma $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ con coordenadas en $\mathbb{Z}$ para hacer mas facil. Podemos pasar restando el t^2, factorizar y nos queda

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Escrito de este modo, para encontrar un punto en la curva nos hace falta encontrar dos numeros a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si estos numeros $y - t$ e $y + t$ los escribimos, separando su parte cubica, como au^3 y bv^3 con a, b libres de potencias cubicas[1], entonces solo necesitamos que ab sea un cubo; sin olvidarnos que $au^3 - bv^3 = -2t$. Por esto tiene sentido ver los elementos a y b en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, y que allí su producto sea 1 nos dice que podemos quedarnos con a, y despejar b como su inverso. Para trabajar en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ con coeficientes en $\mathbb{Z}$ podemos homogeneizar la ecuacion y nos queda:

$$C_a : aU^3 - a^{-1}V^3 + 2tW^3 = 0$$

Vamos a tener una relacion entre los puntos en K de la curva y las curvas C_a que tengan una solucion en K. Si tenemos un punto $P = (x_0, y_0)$ con $x_0 \neq 0$ en la curva, escribiendo $y_0 - t = au^3$ e $y_0 + t = a^{-1}v^3$ y poniendo $U = u$ y $V = v$ y $W = 1$ en C_a tendremos una solucion en $C_a(\mathbb{Q})$. Multiplicando las tres coordenadas por un denominador comun obtenemos una solucion entera no nula (donde los denominadores de u y v van a parar al W), porque la ecuacion es homogenea. Lo interesante es que podemos ir para el otro lado tambien: si tenemos un punto $(U : V : W)$ de C_a con $W \neq 0$, entonces eligiendo

$$x_0 = \tfrac{UV}{W^2}, \quad y_0 = \tfrac{aU^3 + a^{-1}V^3}{2W^3}$$

tenemos que (x_0, y_0) pertenece a $E_t(\mathbb{Q})$ y, si $U \neq 0$, cumple $[y_0 - t] = [a]$. Esta relacion entre los puntos de $E_t(\mathbb{Q})$ de una clase especifica en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ y las soluciones racionales a la ecuacion homogenea C_a es la que usaremos para definir el *morfismo de descenso*, cuya imagen nos ayudará a acotar el rango del grupo de Mordell-Weil de la curva.

En todo este razonamiento quedan muchas cosas para analizar que veremos en este capitulo: la asignacion de $E_t(\mathbb{Q}) \to \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ que vale $(x_0, y_0) \mapsto [y_0 - t]$, completada en los puntos excepcionales, es un morfismo cuyo nucleo es la imagen de una isogenia y tiene indice finito. Al cocientar por este obtenemos una inyeccion en un grupo finito, y eso nos da una cota superior para

[1] Aca estamos usando que la factorizacion es unica en $\mathbb{Z}$. Cuando trabajemos con el anillo de enteros de un cuerpo de numeros esto no siempre ocurre, y mas bien es la excepcion.

el rango, que podremos hacerla efectiva con una forma de chequear si C_a tiene una solucion entera no nula.

Este capitulo se basará en los VIII y X del libro de Silverman [Sil09], donde tambien se da un ejemplo de 2-descenso. Tambien se menciona allí que la generalizacion a cuerpos de numeros donde $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorizacion unica es directa.

La aplicacion que nos interesa es controlar estos calculos en una familia de curvas via condiciones de congruencia sobre ciertos primos (impuestas a posteriori) que nos bastaran para calcular el grupo de Selmer de cada curva, para luego obtener infinitas de rango fijo. En esa direccion aparecieron en los ultimos años muchos resultados: Koymans y Pagano [KP25] combinan 2-descenso y combinatoria aditiva para construir curvas sin crecimiento de rango en ciertas extensiones; Zywina tiene una serie de resultados combinando descenso y especializacion de superficies para dar infinitas curvas de cada rango entre 0 y 4 sobre todo cuerpo de numeros; y Savoie [Sav25] obtiene una familia de curvas de rango 2 y j-invariante igual a 1728 sobre $\mathbb{Q}(i)$ usando 2-descenso, cuyo procedimiento adaptaremos a nuestro caso: una familia de rango 2 y j-invariante igual a 0 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ usando 3-descenso.

3.1. Teoria de Selmer y morfismo de descenso

En la introduccion utilizamos una curva especifica que nos permitia encontrar mas facilmente la conexion entre un punto racional y los elementos de $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, pero para que esta asignacion cumpla las propiedades que queriamos, secretamente estabamos usando que teniamos una isogenia de grado 3 a traves del punto de 3-torsion. Vamos a mostrar como se hace esto en general con una isogenia de grado n (y n será el grado de la isogenia en toda la seccion).

3.1.1. Sucesion exacta de Kummer

Supongamos que tenemos una curva E con una isogenia $\phi : E \to E'$. Para que las cuentas se hagan sobre E, aplicaremos el descenso a la dual $\hat{\phi} : E' \to E$: asi el morfismo saldra de $E(K)$ y su nucleo sera $\hat{\phi}(E'(K))$. Toda isogenia tiene una dual del mismo grado, asi que podemos aplicar a ella la misma construccion.

Junto con la sucesion exacta corta

$$0 \longrightarrow E'[\hat{\phi}] \longrightarrow E'(\bar{K}) \xrightarrow{\hat{\phi}} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

vamos a tener una sucesion exacta larga tomando cohomologia de Galois (todos estos grupos son G_K-módulos):

$$0 \longrightarrow E'(K)[\hat{\phi}] \longrightarrow E'(K) \xrightarrow{\hat{\phi}} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \longrightarrow H^1(G_K, E') \xrightarrow{\hat{\phi}} H^1(G_K, E) \cdots$$

y tomando de la mitad obtenemos la *sucesion exacta de Kummer para* $\hat{\phi}$, que usaremos para el descenso:

$$0 \longrightarrow \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \xrightarrow{\gamma} H^1(G_K, E')[\hat{\phi}] \longrightarrow 0$$

Rapidamente queremos identificar el segundo y el tercer grupo con otros que conozcamos mejor y podamos controlar, y tambien entender los morfismos.

Isomorfismo para $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$

Para el segundo grupo vamos a hacerlo en el caso particular donde $E[\phi]$ sea ciclico y K-racional, que podemos obtener simplemente cocientando por el grupo generado por un punto de n-torsion (recordemos que una isogenia queda determinada por su nucleo). Si ϕ es de grado n y $\mu_n \subset K$

entonces quedará $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ y podemos dar un isomorfismo explicito usando el emparejamiento de Weil con un generador $Q_0 \in E(K)[\phi]$. Un teorema de Kummer nos dice que

$$H^1(G_K, \mu_n) \cong K^\times/(K^\times)^n,$$

y esta será la identificacion que usaremos para el descenso.

Grupo de Weil-Châtelet

Para el tercer grupo, la identificacion se consigue asociando espacios homogeneos a la curva, y mirando si es posible encontrar un punto racional en ciertos de ellos, ya que corresponderan a un elemento en el nucleo de γ. El problema de encontrar un punto racional en un espacio homogeneo es casi tan difícil, pero podremos descartar muchos trabajando en las completaciones del cuerpo y sus anillos locales, llegando idealmente a todos los necesarios. Al traducir la sucesion de Kummer a las completaciones de K y estudiar como se comporta esta reduccion tenemos el proceso completo para determinar una cota superior para el rango, conocido como *método del descenso*.

Nuevamente para no introducir demasiada teoria mencionaremos que asociado a cada curva eliptica existe el grupo de Weil-Châtelet $\mathrm{WC}(E/K)$ de clases de equivalencia de espacios homogeneos sobre E. Estos ultimos constan de una curva $\mathcal{C}/K$ junto con una accion de E en $\mathcal{C}$ definida sobre K simplemente transitiva. Lo importante sobre estos es que, dado un punto $P \in \mathcal{C}$, tenemos un isomorfismo con E definido sobre $K(P)$ (adjuntar a K las coordenadas de P); y esto nos dice que, si $\mathcal{C}$ tiene un punto K-racional entonces está en la clase trivial de $\mathrm{WC}(E/K)$, que es lo que nos interesa calcular. Tambien tenemos el teorema que nos dice que existe una biyeccion entre $\mathrm{WC}(E/K)$ y $H^1(G_K, E)$ para poder reemplazar uno de los terminos de la sucesion.

En la sucesion que estamos usando aparece $\mathrm{WC}(E'/K)$: los espacios homogeneos llevan una accion de E', aunque los construimos con funciones sobre E.

Para calcular estos espacios homogeneos vamos a elegir un punto $Q_0 \in E(K)[\phi]$ que genere el nucleo de ϕ (que tambien será ciclico) y tenemos que encontrar una funcion racional $f \in K(E)^\times$ tal que

$$\mathrm{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O}).$$

Con esto, el espacio homogeneo asociado a $a \in K^\times/(K^\times)^n$ será (el modelo proyectivo suave de) la curva

$$f(Q) = az^n.$$

Notemos que está evaluada en $Q \in E$, entonces esto puede traducirse a variables x e y con la ecuacion de la curva E (cuidado, no es la de E'). No olvidemos que $f = g/h$ era una funcion racional, por lo que si nos interesan ecuaciones polinomicas terminariamos obteniendo

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + Ax + B \\ g(x,y) = az^n h(x,y). \end{cases}$$

3.1.2. Como calcular los espacios homogeneos

Lo primero que nos falta del procedimiento anterior es calcular la funcion f. Esto se puede hacer con las mismas rectas que usamos para sumar puntos. Escribamos $Q_0 = (r,s)$ y calculemos $Q_0, 2Q_0, \ldots, nQ_0 = \mathcal{O}$. Para cada punto intermedio $R = jQ_0$, llamemos $\ell_R(x,y) = 0$ a la recta que pasa por R y Q_0, o a la tangente si son iguales. Tomamos la funcion

$$h_R(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\ell_R(x,y)}{x - x(R+Q_0)} & R + Q_0 \neq \mathcal{O}, \\ x - r & R + Q_0 = \mathcal{O}. \end{cases}$$

En el primer caso, la recta del numerador corta a la curva en $R, Q_0, -R-Q_0$, y la vertical del denominador en $R+Q_0, -R-Q_0$. En el segundo, $R = -Q_0$ y usamos directamente la vertical por estos dos puntos. En ambos casos nos queda

$$\mathrm{div}(h_R) = (R) + (Q_0) - (R+Q_0) - (\mathcal{O}).$$

Ahora multiplicamos estas funciones:

$$f = \prod_{j=1}^{n-1} h_{jQ_0}.$$

Al sumar sus divisores se cancelan los puntos intermedios y, como $nQ_0 = \mathcal{O}$, queda exactamente $n(Q_0) - n(\mathcal{O})$. Asi obtenemos f con cuentas de la ley del grupo. Estas son las cuentas en las que se basa el algoritmo de Miller; una version optimizada está en [Sil09, cap. XI, teorema 8.1].

Con f calculada, elegimos un representante $a \in K^\times$ de la clase que queremos estudiar y ponemos $f(x, y) = az^n$ junto con la ecuacion de la curva E. Luego manipulando algebraicamente se puede simplificar y, en los casos mas simples, se puede llegar a una sola formula donde solo cambiando el parametro a tenemos todos los espacios homogeneos. Esto es lo que sucede tanto en los casos de 2-descenso como 3-descenso.

En nuestra familia la tangente en $(0, t)$ es $y = t$, asi que usamos $f = y - t$. Recordemos que esta funcion vive sobre E_t, por lo que corresponde al descenso para $\hat{\phi} : E'_t \to E_t$ (segun la convencion de trabajar con funciones sobre E_t). La simplificacion de $f = az^3$ es justamente la que hicimos al principio del capitulo para obtener la cubica C_a.

3.1.3. Morfismo de descenso

Ahora nos falta analizar el morfismo δ, haciendo la identificacion de su codominio con $K^\times/(K^\times)^n$. Para lo que lo estamos usando unicamente necesitariamos saber que existe un morfismo inyectivo que sale del cociente de los puntos y que su imagen coincide con el nucleo de γ y asi podremos acotarla, es decir, no necesitamos calcularlo explicitamente. Igualmente vamos a presentarlo ya que saber la imagen de los elementos que tenemos (como los puntos de torsion y libres con que hayamos partido) nos ayuda a saber que espacios descartar. Antes de comenzar con la teoria general notemos que, en el caso de la introduccion, encontramos un morfismo que cumplia lo que necesitabamos, con el que incluso nos pudimos armar el espacio homogeneo, y fue simplemente de la estructura de la curva. "Encontrar un morfismo a ojo" puede ser la solucion en muchos casos para evitar esta parte, pero presentaremos el caso general.

Lema 3.1.1. *Dada una isogenia $\hat{\phi} : E' \to E$ ciclica de grado n y un punto $Q_0 \in E(K)[\phi]$ generador del nucleo de ϕ, existe una funcion $f \in K(E)^\times$ tal que $\operatorname{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ que puede normalizarse para que $f \circ \hat{\phi} = g^n$ para alguna $g \in K(E')^\times$.*

Demostración. Como Q_0 tiene orden n, el divisor $n(Q_0) - n(\mathcal{O})$ (que seria n veces el asociado al punto Q_0) es trivial en $\mathrm{Pic}^0(E)$ y por lo tanto es principal: existe f con ese divisor en $K(E)^\times$ ($Q_0 \in E(K)$ asi que f puede tomarse definida sobre K). La funcion asociada a un divisor estará definida salvo constantes. Veamos que, con la constante adecuada, podemos conseguir que $f \circ \hat{\phi} = g^n$.

Como $\hat{\phi}$ es sobreyectiva, existe $P_0 \in E'(\bar{K})$ con $\hat{\phi}(P_0) = Q_0$ y las preimagenes de Q_0 serán $P_0 + R$ para los $R \in \mathrm{nu}(\hat{\phi})$. Entonces, el divisor

$$D = \sum_{R \in E'[\hat{\phi}]} (P_0 + R) - \sum_{R \in E'[\hat{\phi}]} (R)$$

es tal que $D = \hat{\phi}^*((Q_0) - (\mathcal{O}))$. Viendo D en $\mathrm{Pic}^0(E')$ (como puntos por ser $\cong E'$) se cancelan los R y queda nP_0, pero $[n]P_0 = \phi(Q_0) = \mathcal{O}$ en E' y entonces existe $g \in K(E')^\times$ con $\operatorname{div}(g) = D$ (g está definida sobre K porque D lo está). Ahora como $\operatorname{div}(f) = n((Q_0) - (\mathcal{O}))$ tenemos

$$\operatorname{div}(f \circ \hat{\phi}) = \hat{\phi}^*(n((Q_0) - (\mathcal{O}))) = nD = n \ \operatorname{div}(g) = \operatorname{div}(g^n).$$

Como tienen los mismos divisores, $f \circ \hat{\phi} = \lambda g^n$ para algun $\lambda \in K^\times$, y tomando $\lambda^{-1} f$ nos queda

$$f \circ \hat{\phi} = g^n.$$

□

La f del lema nos permitirá dar una descripcion explicita de δ, donde para puntos $P \in E(K)$ distintos a $\mathcal{O}$ y Q_0 valdrá $\delta(P) = f(P) \mod (K^\times)^n$. Para $\mathcal{O}$, por ser morfismo, debe caer en la clase trivial (f tendría un polo en $\mathcal{O}$, por eso no está definida); y en Q_0 la definimos como el valor de su coeficiente principal c (f tiene un cero en Q_0). Juntemos esto en un resultado y demostremoslo abajo:

Teorema 3.1.2 (Morfismo de descenso)**.** *Sea f la funcion del Lema 3.1.1. El mapa*

$$\begin{array}{rccl} \alpha: & E(K) & \longrightarrow & K^\times/(K^\times)^n \\ & P & \longmapsto & \begin{cases} [1] & si\ P = \mathcal{O}, \\ [c] & si\ P = Q_0, \\ [f(P)] & si\ no. \end{cases} \end{array}$$

está bien definido, es un morfismo, su nucleo es $\hat{\phi}(E'(K))$ y, cocientando por él, corresponde al morfismo δ de la sucesion de Kummer luego de hacer la identificacion $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ con $K^\times/(K^\times)^n$ usando el emparejamiento de Weil con Q_0.

Demostración. Veamos la evaluacion $f(Q)$ para un $Q \neq Q_0, \mathcal{O}$. Podemos tomar una de sus preimagenes $P \in E'(\bar{K})$ y $g(P)$ será una raiz n-esima. Para ver la clase de $f(Q)$ via el isomorfismo en $K^\times/(K^\times)^n$ nos basta ver como actua un $\sigma \in G_K$ en $g(P)$, es decir,

$$\sigma \mapsto \frac{\sigma(g(P))}{g(P)}.$$

Veremos que este cociclo, luego de las identificaciones, es igual a $\delta(Q)$. Su definicion es $\delta(Q) = (\sigma \mapsto \sigma(P) - P)$ para un $P \in E'(\bar{K})$ tal que $\hat{\phi}(P) = Q$. Es facil ver que toma valores en $E'[\hat{\phi}]$ pues $\sigma(Q) = Q$ y σ conmuta con $\hat{\phi}$. Cuando identificamos $E'[\hat{\phi}] \cong \mu_n$ a traves del emparejamiento de Weil con el Q_0, nos queda

$$\delta(Q) = (\sigma \mapsto e_{\hat{\phi}}(\sigma(P) - P, Q_0)).$$

Ahora, si llamamos $R = \sigma(P) - P \in E'[\hat{\phi}]$, por la identificacion del emparejamiento de Weil con funciones racionales nos queda que

$$e_{\hat{\phi}}(\sigma(P) - P, Q_0) = \frac{g(P+R)}{g(P)} = \frac{g(\sigma(P))}{g(P)} = \frac{\sigma(g(P))}{g(P)},$$

que es exactamente lo que queriamos.

Para definir $\alpha(Q_0)$ en $K^\times/(K^\times)^n$, como tenemos un cero de orden n, necesitaremos un parametro local $t \in K(E)$ en Q_0, con el cual $f = c_n t^n + c_{n+1} t^{n+1} + \cdots$ y definimos $\alpha(Q_0) = [c_n] \in K^\times/(K^\times)^n$ ya que, si cambiamos de parametro local, el valor de c_n cambiará solo por una potencia n-esima. Para ver que coincide con $\delta(Q_0)$, tomemos una preimagen P_0 de Q_0 y pongamos $h = g/(t \circ \hat{\phi}) \in K(E')$. Como $h^n = (f/t^n) \circ \hat{\phi}$, el cociente h no tiene polos ni raices en las preimagenes de Q_0, y $h(P_0)^n = c_n$. Ademas, $t \circ \hat{\phi}$ no cambia al trasladar por un punto de $E'[\hat{\phi}]$, asi que la identidad anterior se puede evaluar usando h y nos da

$$e_{\hat{\phi}}(\sigma(P_0) - P_0, Q_0) = \frac{h(\sigma(P_0))}{h(P_0)} = \frac{\sigma(h(P_0))}{h(P_0)}.$$

Este es exactamente el cociclo de Kummer de la raiz $h(P_0)$ de c_n, por lo que $\delta(Q_0)$ corresponde a $[c_n] = \alpha(Q_0)$.

Para $\mathcal{O}$ podriamos hacer lo mismo, pero como δ es un morfismo, lo asignará a la clase trivial en la cohomologia, que corresponde en nuestra identificacion con la clase del 1 en $K^\times/(K^\times)^n$.

Finalmente, como probamos que α coincide, via f y luego de identificaciones, con δ, entonces será un morfismo; y por exactitud de la sucesion de Kummer su nucleo será $\mathrm{nu}(\delta) = \hat{\phi}(E'(K))$. Al cocientar obtenemos la inyeccion

$$\alpha: \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \hookrightarrow K^\times/(K^\times)^n.$$

□

3.1.4. Grupos de Selmer y Sha

El siguiente paso es reemplazar el termino $K^\times/(K^\times)^n$ por un subgrupo finito y el $\mathrm{WC}(E'/K)$ para que siga siendo una sucesion exacta, y esto se logra con consideraciones locales. Volviendo a la secuencia de Kummer, uno puede considerar un lugar $v \in M_K$ y todos los objetos correspondientes: extender v a $\bar{K}$ para fijar una inclusion de $\bar{K} \subseteq \bar{K}_v$ y un grupo de descomposicion $G_v \subseteq G_K$ para fijar su accion en $E'(\bar{K}_v)$ y $E(\bar{K}_v)$; y asi armar la siguiente sucesion:

$$0 \longrightarrow \frac{E(K_v)}{\hat{\phi}(E'(K_v))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \longrightarrow \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}] \longrightarrow 0$$

Y considerando los mapas de restricción simultaneamente a todos los lugares tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & E(K)/\hat{\phi}(E'(K)) & \xrightarrow{\delta} & H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) & \xrightarrow{\gamma} & \mathrm{WC}(E'/K)[\hat{\phi}] & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} E(K_v)/\hat{\phi}(E'(K_v)) & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) & \longrightarrow & \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}] & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

Nuestro objetivo era conocer la imagen de δ, o equivalentemente el nucleo de γ, y ya mencionamos que esto es equivalente a encontrar puntos racionales en espacios homogeneos, que es igualmente una pregunta dificil. Por otro lado, con el mismo razonamiento nos sirve calcular

$$\mathrm{nu}\left(H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \to \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}]\right)$$

y eso se consigue calculando puntos racionales en espacios homogeneos sobre cuerpos locales, que, gracias al lema de Hensel, se puede hacer en finitos pasos. Esto motiva las siguientes definiciones.

Definición 3.1.3. Dada una isogenia $\hat{\phi} : E' \to E$ sobre K, el *grupo de Selmer* asociado a $\hat{\phi}$ (o $\hat{\phi}$-Selmer) es el subgrupo de $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ definido por

$$S^{(\hat{\phi})}(E'/K) = \mathrm{nu}\left\{H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \to \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E'/K_v)\right\},$$

El *grupo de Shafarévich-Tate* (o Sha por el caracter Ш) es el subgrupo de $\mathrm{WC}(E/K)$ dado por

$$Ш(E/K) = \mathrm{nu}\left\{\mathrm{WC}(E/K) \to \prod_{v\in M_K} \mathrm{WC}(E/K_v)\right\}.$$

En la notacion $S^{(\hat{\phi})}(E'/K)$ aparece E' porque es el dominio de $\hat{\phi}$; el cociente de puntos que buscamos y las funciones que evaluamos estan sobre E. Aplicando la misma definicion a ϕ obtenemos $S^{(\phi)}(E/K)$ [Sil09, cap. X, seccion 4].

Y se sigue del diagrama que tenemos la sucesion exacta

$$0 \longrightarrow \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \longrightarrow S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \longrightarrow Ш(E'/K)[\hat{\phi}] \longrightarrow 0 \tag{3.1}$$

Esta sucesion era el objetivo principal de este capitulo. Como el primer grupo es un $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$-módulo, solo precisamos ver la imagen de los generadores en el grupo de Selmer, y si tenemos la suerte de que la componente del Sha es trivial vamos a obtener nuestra cota. Tambien explica la informacion que podriamos perder en este proceso: si el Sha no es trivial no vamos a obtener la cota (y no hay forma efectiva de calcular el orden del Sha), y esto explica la falla del principio local-global en curvas elipticas. Los elementos no nulos de $Ш(E'/K)$ son precisamente las clases de espacios homogéneos para E' que tienen puntos en todos los lugares, pero ninguno global.

Ahora lo que nos motiva todas estas definiciones es que vale lo siguiente:

Teorema 3.1.4. *El grupo de Selmer es finito.*

Este teorema lo vamos a demostrar usando primero las identificaciones que hicimos antes, para verlo como subgrupo de $K^\times/(K^\times)^n$. Para esto veamos:

Proposición 3.1.5. *Al identificar $H^1(G_K, E'[\hat{\phi}]) \cong K^\times/(K^\times)^n$ el grupo de Selmer es*

$$S^{(\hat{\phi})}(E'/K) = \left\{[a] \in K^\times/(K^\times)^n : [a]_v \in \mathrm{Im}(\alpha_v), \forall v \in M_K\right\}$$

donde α_v es el mismo morfismo de descenso pero sobre K_v y $[a]_v$ es la clase de a en $K_v^\times/(K_v^\times)^n$, usando la inclusion $K \hookrightarrow K_v$.

Por definicion una clase $\xi \in H^1(G_K, E'[\hat{\phi}])$ esta en el Selmer si y solo si todas sus restricciones locales ξ_v estan en el nucleo de $H^1(G_v, E'[\hat{\phi}]) \to \mathrm{WC}(E'/K_v)[\hat{\phi}]$, eso corresponde por exactitud a la imagen de δ_v, que luego de las identificaciones son los mapas α_v.

Definamos tambien ahora el subconjunto de lugares donde podemos tener problemas de reduccion:

$$S := M_K^\infty \cup \{v : v(n) > 0\} \cup \{v : \text{E tiene mala reduccion en } v\}.$$

Las curvas isogenas tienen buena reduccion en los mismos lugares, asi que podemos definir S usando E [Sil09, cap. VII, corolario 7.2]. Este conjunto es finito, y veremos que fuera de S la valuacion de los elementos del grupo de Selmer es divisible por n, incluyendolo de esta forma en el conjunto finito

$$K(S,n) := \left\{[a] \in K^\times/(K^\times)^n : v(a) \equiv 0 \mod n \text{ para todo lugar } v \notin S\right\}.$$

Ahora probemos estos dos lemas para concluir el teorema:

Lema 3.1.6. *Sea $v \in M_K$ tal que $v \notin S$ y $a \in K_v^\times$ representa una clase de $\mathrm{Im}(\alpha_v)$. Entonces $v(a) \equiv 0 \mod n$.*

Demostración. Recordemos que $\alpha_v(Q) \equiv f(Q) \mod (K_v^\times)^n$ para todo punto $Q \in E(K_v)$ distinto de Q_0 y $\mathcal{O}$.

Como vimos en el primer capitulo, si $v \nmid n$ entonces la n-torsion se preserva al reducir modulo v, lo que nos asegura que $\bar{Q}_0 \neq \bar{\mathcal{O}}$ y que f sigue teniendo cero y polo en Q_0 y $\mathcal{O}$. Si Q reduce a $\bar{Q} \neq Q_0, \mathcal{O}$ entonces $f(Q)$ es una unidad y $v(f(Q)) = 0$; si Q reduce a $\bar{Q}_0$ entonces tomando un parametro local t (es decir $f = c_n t^n + c_{n+1}t^{n+1}\cdots$ alrededor de Q_0) nos queda $v(f(Q_0)) = v(c_n) + nv(t(Q_0))$, y que el coeficiente principal sea una potencia n-esima en la reduccion nos lo podemos asegurar por la normalizacion $f \circ \hat{\phi} = g^n$; y si reduce a $\bar{\mathcal{O}}$ es el mismo argumento pero con $f = c_{-n}t^{-n} + c_{-n+1}t^{-n+1}\cdots$. □

Lema 3.1.7. *$K(S,n)$ es finito (si S es finito).*

Demostración. Definamos algunos elementos de teoria de numeros algebraica: El anillo de S-enteros de un cuerpo son los elementos del cuerpo K que tienen valuacion mayor o igual a 0 ("son enteros") en todos los lugares fuera de S. Es decir que nos permitimos tener denominadores pero solo con factores en el conjunto S. Se denota $\mathcal{O}_{K,S}$ y $\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es su grupo de unidades. Su grupo de clases, denotado $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})$, es el grupo de ideales fraccionarios del anillo cocientado por los principales.

Ahora, si $[a] \in K(S,n)$, como $v(a) \equiv 0 \mod n$ para todo $v \notin S$ entonces el ideal generado por a como ideal fraccionario de $\mathcal{O}_{K,S}$ será una potencia n-esima: $(a) = \mathfrak{a}^n$. Luego, el mapa

$$K(S,n) \to \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n],\ [a] \mapsto [\mathfrak{a}]$$

esta bien definido. Miremos su nucleo: si $1 = [\mathfrak{a}]$ entonces $\mathfrak{a} = (b)$ y $(b^n) = (a)$. Como generan el mismo ideal tenemos que $a/b^n \in \mathcal{O}_{K,S}^\times$, y con eso el nucleo del morfismo será $\mathcal{O}_{K,S}^\times/(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n$. Juntando todo tenemos la sucesion exacta

$$1 \to \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n} \to K(S,n) \to \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \to 1,$$

donde los dos de los costados son finitos ($\mathcal{O}_{K,S}^\times$ es finitamente generado por el teorema de Dirichlet), y entonces el del medio tambien lo es. □

La elección concreta de representantes para $K(S,n)$, especialmente simple cuando $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, la desarrollaremos mas adelante.

Juntando estos dos resultados tenemos la demostracion del teorema porque vimos que $S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \subseteq K(S,n)$ y este ultimo es finito.

3.1.5. Calculo del grupo de Mordell-Weil

Para calcular el grupo de Mordell-Weil de una curva E nos interesa calcular $E(K)/nE(K)$, pero lo que hicimos solo nos da $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$, que no basta. La solucion es trabajar tambien con la isogenia dual (en este caso ϕ), que vimos que era calculable a partir de la original: una vez que se tienen generadores para ambos $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ y $E'(K)/\phi(E(K))$ se obtiene lo deseado utilizando la siguiente sucesion exacta:

$$1 \to \frac{E'(K)[\hat{\phi}]}{\phi(E(K)[n])} \to \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \xrightarrow{\hat{\phi}} \frac{E(K)}{nE(K)} \to \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \to 1. \tag{3.2}$$

De la sucesion se puede ver que, si conseguimos encontrar generadores o simplemente acotar el orden, tanto de $E'(K)/\phi(E(K))$ como de $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$, entonces, como el nucleo de la isogenia es conocido (o computable), tendremos una forma efectiva de encontrar los generadores (o acotar el orden) de $E(K)/nE(K)$, que tendra uno por cada punto de n-torsion y uno por cada punto libre independiente. Observemos que para esto es necesario hacer el analisis desarrollado tanto para la curva como para su dual.

Todos los grupos de esta sucesión son anulados por n, porque $\hat{\phi}\phi = [n]$ y $\phi\hat{\phi} = [n]$. Cuando $n = \ell$ es primo, son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$ y podemos trabajar con dimensiones. Para n compuesto, en general solamente son módulos sobre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Entonces el resumen del procedimiento sería el siguiente: encontrar (o armar la curva a partir de) una isogenia con un nucleo ciclico, que comunmente se obtiene a partir de un punto de torsion; identificar el espacio homogeneo asociado a la isogenia, armando la f del lema 3.1.1; calcular la lista de lugares de mala reduccion y encontrar representantes para el conjunto $K(S,n)$; en él, identificar qué valores serán imagen de los puntos que tenemos e intentar descartar los demas con argumentos locales o aprovechandonos de la estructura de grupo. Nos queda contar como se hacen efectivos ciertos pasos.

Caso particular: descenso primo

Como nos interesa construir infinitas curvas de rango fijo, usaremos el descenso para buscar condiciones sobre los parámetros de una familia que hagan coincidir la cota del rango con la cantidad de puntos independientes que conocemos. Para eso, fijar un primo y trabajar con el descenso correspondiente será nuestro punto de partida.

Si nos interesa una curva en particular, también podemos intentar mejorar la cota combinando descensos de distintos grados o haciendo descensos de orden potencia de un primo. Como comentamos previamente, esto puede ser necesario cuando $Ш(E/K)[m]$ no es trivial y el grupo de Selmer da una cota que no es óptima para el orden de $E(K)/mE(K)$.

Hay una descomposición que permite separar los factores coprimos y concentrar las cuentas en un primo por vez [Sto06]:

Proposición 3.1.8. *Si m y r son enteros positivos coprimos, entonces*

$$S^{(mr)}(E/K) \cong S^{(m)}(E/K) \times S^{(r)}(E/K).$$

En consecuencia, calcular un Selmer de multiplicación se reduce a calcular los correspondientes a potencias de primos. Puede ser necesario tambien calcular un ℓ^2-descenso en ciertos casos, Silverman explica estos descensos sucesivos en [Sil09, cap. X, observación 4.11 y proposición 4.12].

Las ventajas específicas de un grado primo ℓ son que el núcleo de la isogenia es cíclico, y que sus cocientes y el Selmer son espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_\ell$. Esto permite contar dimensiones, escribir condiciones lineales en los exponentes y comparar subespacios.

En particular, de la sucesión tenemos:

$$\operatorname{rg} E(K) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\ell)}(E/K) - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} Ш(E/K)[\ell].$$

Para aplicar esto a una familia en el caso de tener el Selmer de cada isogenia, usaremos lo siguiente:

Proposición 3.1.9. *Sea $\phi : E \to E'$ una isogenia de grado primo ℓ, definida sobre el cuerpo de números K, y sea $\hat{\phi}$ su dual. Entonces*

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} E(K) \leq\ & \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\phi)}(E/K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \\ & - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}].\end{aligned}$$

En particular, si los dos núcleos están formados por puntos definidos sobre K, los dos últimos términos son un -2.

Demostración. El núcleo de ϕ sobre $E(K)[\ell]$ es $E(K)[\phi]$, así que

$$\dim_{\mathbb{F}_\ell} \phi(E(K)[\ell]) = \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi].$$

Tomamos dimensiones en (3.2) y usamos que $\dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)/\ell E(K) = \operatorname{rg} E(K) + \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\ell]$. Al cancelar los términos de ℓ-torsión obtenemos

$$\begin{aligned}\operatorname{rg} E(K) =\ & \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} + \dim_{\mathbb{F}_\ell} \frac{E(K)}{\hat{\phi}(E'(K))} \\ & - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E(K)[\phi] - \dim_{\mathbb{F}_\ell} E'(K)[\hat{\phi}].\end{aligned}$$

Cada uno de los cocientes se inyecta en su grupo de Selmer, lo que da la desigualdad. □

Por ejemplo, si ambos núcleos son racionales y conocemos r puntos independientes en cada curva de una familia, alcanza con imponer condiciones que hagan que la suma de las dimensiones de los dos Selmer sea a lo sumo $r+2$. La proposición da rango a lo sumo r, y los puntos conocidos dan la desigualdad contraria. Este es un objetivo concreto para las cuentas locales: no hace falta resolver todas las ecuaciones de los espacios homogéneos, sino obtener suficientes restricciones independientes.

3.2. Espacios homogéneos asociados y obstrucciones locales

Lo que nos quedó de la sección anterior es "descartar espacios homogéneos". Por la condición de

$$[a] \in S^{(\hat{\phi})}(E'/K) \iff C_a(K_v) \neq \varnothing \text{ para todo } v \in M_K,$$

si encontramos un lugar donde el espacio homogeneo no tiene puntos, ya podemos descartarlo del grupo de selmer.

Cuando $n = \ell$ es primo, el Selmer es un $\mathbb{F}_\ell$-subespacio de $K(S, \ell)$. Si una clase queda descartada, también queda descartado su subespacio generado, es decir todas sus potencias con exponentes $1, \dots, \ell - 1$. La clase trivial sí permanece.

3.2.1. Elegir los representantes

El primer paso es determinar una forma de representar $K(S, n)$. Si el numero de clases de K es 1 entonces es simple:

Proposición 3.2.1. *Supongamos que $\mathcal{O}_K$ tiene número de clases 1. Sean $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s$ los lugares finitos de S, elijamos generadores $\mathfrak{p}_i = (\pi_i)$ y un conjunto U de representantes de $\mathcal{O}_K^\times/(\mathcal{O}_K^\times)^n$. Entonces un conjunto de representantes de $K(S, n)$ es*

$$\left\{\varepsilon \pi_1^{e_1} \cdots \pi_s^{e_s} : \varepsilon \in U, \quad 0 \leq e_i < n\right\}.$$

Demostración. Como $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única, podemos factorizar cualquier $a \in K^\times$ como una unidad por un producto de elementos primos, permitiendo exponentes negativos. Si $[a] \in K(S,n)$, los exponentes de los primos fuera de S son múltiplos de n, así que podemos eliminarlos dividiendo por una potencia n-ésima. Podemos hacer lo mismo con los múltiplos de n en los exponentes de los π_i, y reducir la unidad módulo potencias n-ésimas. Esto da la expresión del enunciado. Dos expresiones de esa forma representan la misma clase solamente si sus exponentes coinciden y sus unidades representan la misma clase. □

Recordemos la sucesión exacta de la sección anterior:

$$1 \longrightarrow \frac{\mathcal{O}_{K,S}^\times}{(\mathcal{O}_{K,S}^\times)^n} \longrightarrow K(S,n) \longrightarrow \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \longrightarrow 1.$$

Cuando $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$ no es trivial, basta agrandar S para que esas clases se vuelvan principales. Esto funciona porque si añadimos los primos $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_h$ a S y llamamos S' al nuevo conjunto, tenemos

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S'}) \cong \frac{\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})}{\langle [\mathfrak{q}_1], \ldots, [\mathfrak{q}_h] \rangle}.$$

En efecto, los ideales de $\mathcal{O}_{K,S'}$ se representan por ideales de $\mathcal{O}_{K,S}$, y una clase se vuelve principal al localizar si y solo si se puede representar por un producto de potencias de los primos añadidos. Por eso, si los elegimos de modo que

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n] \subseteq \langle [\mathfrak{q}_1], \ldots, [\mathfrak{q}_h] \rangle,$$

toda clase de $K(S,n)$ tiene un representante que es una S'-unidad (aca no afirmamos nada sobre $K(S',n)$). Para verlo, si $[b] \in K(S,n)$, escribimos $(b) = \mathfrak{a}^n$ en $\mathcal{O}_{K,S}$. La clase de $\mathfrak{a}$ pertenece a $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$, así que al pasar a $\mathcal{O}_{K,S'}$ tenemos $\mathfrak{a}\mathcal{O}_{K,S'} = (c)$ para algún $c \in K^\times$. Entonces b/c^n es una S'-unidad y representa la misma clase que b.

Si preferimos no ampliar S, la sucesión exacta da otra opción: para cada clase de $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_{K,S})[n]$ elegimos un ideal $\mathfrak{a}$, encontramos a con $\mathfrak{a}^n = (a)$ en $\mathcal{O}_{K,S}$ y multiplicamos esos a por representantes de las S-unidades módulo potencias n-ésimas.

Ejemplo 3.2.2. En nuestro caso $K = \mathbb{Q}(\omega)$, con $\omega^2+\omega+1 = 0$, el anillo $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$ es un dominio de factorizacion unica. Las unidades son $\{\pm 1, \pm\omega, \pm\omega^2\}$ y, módulo cubos, podemos representarlas por $1, \omega, \omega^2$. Como el unico lugar arquimedeano de K es complejo y $\mathbb{C}^\times/(\mathbb{C}^\times)^3$ es trivial, no aporta clases a $K(S,n)$.

Tomemos en nuestra curva $t = (b-a)b(b+a)$ y supongamos que sus tres factores son primos, no asociados entre sí y que no dividen a 6. El discriminante es $-432t^4$, asi que podemos tomar como lugares finitos de S los primos

$$(1-\omega), \quad (2), \quad (b-a), \quad (b), \quad (b+a),$$

donde $(1-\omega)$ es el primo sobre 3.

Los representantes de nuestro $K(S,3)$ son entonces

$$u = \omega^{e_\omega}(1-\omega)^{e_\lambda} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}, \qquad e_i \in \{0,1,2\}.$$

Son 3^6 clases, es decir, un espacio vectorial de dimensión 6. Como los puntos conocidos nos darán dos clases independientes, buscamos cuatro restricciones lineales independientes para reducir los candidatos a dimensión 2.

3.2.2. De la clase a una ecuación

Para descartar una clase necesitamos una ecuación donde podamos hacer las cuentas. Lo importante es encontrar una forma de escribir los espacios homogéneos en la que la clase aparezca como un parámetro: así hacemos la construcción una sola vez y después cambiamos ese parámetro para recorrer los candidatos.

Con la función de descenso f de la sección anterior esto ya se puede hacer. Si $f = g/h$ sobre $E : y^2 = x^3 + Ax + B$, imponer que $f(x, y)$ tenga clase $[u]$ nos lleva al sistema

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + Ax + B, \\ g(x, y) = uz^n h(x, y). \end{cases}$$

Son dos ecuaciones en tres variables: su intersección describe una curva en el espacio afín. Fijados E y f, el único dato que cambiamos es u. Además, si reemplazamos u por us^n, el cambio $z \mapsto z/s$ identifica las dos ecuaciones, como corresponde a representantes de una misma clase.

En nuestro ejemplo, la forma de simplificar la ecuación sale directamente de

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Como explicamos al principio del capítulo, buscamos dos números a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si separamos sus partes cúbicas y escribimos $y - t = uU^3$, el otro factor tiene que ser $y + t = u^{-1}V^3$: las dos clases son inversas porque su producto es un cubo. Restamos estas igualdades, homogeneizamos y cambiamos el signo de la segunda coordenada. Así obtenemos

$$C_u : \quad uX^3 + u^{-1}Y^3 + 2tZ^3 = 0. \tag{3.3}$$

Para una curva fija, t queda fijo y u recorre los representantes de las clases; cambiar t sería cambiar la curva elíptica. En las cuentas de esta familia seguiremos con $K = \mathbb{Q}(\omega)$ y $t \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$.

Según el grado del descenso, convienen distintos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, para los elementos del Selmer del descenso por multiplicación por 2, 3 y 4 se usan, respectivamente, modelos $y^2 = g(x)$ con g de grado 4, cúbicas en $\mathbb{P}^2$ e intersecciones de dos cuádricas en $\mathbb{P}^3$ [Sto06].

3.2.3. Las herramientas locales

Cuando reduzcamos localmente, la primera forma de descartar soluciones es comparar las valuaciones de los términos. Tendremos ecuaciones de la forma $AX^n + BY^n + CZ^n = 0$ o mas generales (mas sumandos o variables con distinto grado), y el siguiente lema o su adaptacion al caso que se tenga, será nuestra principal herramienta para descartar candidatos. Es la idea del descenso infinito formalizado por Fermat.

Lema 3.2.3. *Sean $A, B, C \in K$, no todos cero, tales que $A + B + C = 0$. Para cualquier primo $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$, el mínimo de $v_\mathfrak{p}(A), v_\mathfrak{p}(B), v_\mathfrak{p}(C)$ se alcanza al menos dos veces, con la convención $v_\mathfrak{p}(0) = +\infty$.*

Demostración. Supongamos que A es el único término de valuación mínima. Dividiendo por A tenemos $1 + B/A + C/A = 0$. Las otras dos fracciones tienen valuación positiva en $\mathfrak{p}$, así que reducen a cero. Al reducir la igualdad queda $1 = 0$, una contradicción. □

El argumento es el mismo en $K_\mathfrak{p}$. Entonces, si las valuaciones hacen imposible la ecuación, descartamos también la posibilidad de soluciones locales en ese primo, que es lo que necesitamos para el Selmer. No hace falta que $\mathfrak{p}$ sea principal: estamos usando la valuación asociada al ideal primo.

Mas generalmente, si tenemos una ecuacion en $K_\mathfrak{p}$ podemos cancelar denominadores llevando sus coeficientes a $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ con uno de ellos siendo una unidad, ahi reducir modulo $\mathfrak{p}$ (o alguna potencia), y sabemos que si no hay soluciones módulo $\mathfrak{p}^m$, no puede haber en $K_\mathfrak{p}$.

Para ir en sentido contrario usaremos Hensel: una solución módulo $\mathfrak{p}$ se levanta al anillo de enteros local $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ si alguna derivada parcial no se anula. En nuestras ecuaciones, fijamos dos coordenadas y corregimos la tercera.

Lema (Hensel en este caso)**.** *Sean $A, B, C \in \mathcal{O}_K$, $n \geq 2$ y $\mathfrak{p}$ un ideal primo no nulo de $\mathcal{O}_K$. Si $x_0, y_0, z_0 \in \mathcal{O}_K$ cumplen*

$$Ax_0^n + By_0^n + Cz_0^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{p} \nmid nAx_0,$$

entonces existe $x \in \mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$, con $x \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, tal que

$$Ax^n + By_0^n + Cz_0^n = 0.$$

Así obtenemos un punto $(x : y_0 : z_0)$ sobre $K_\mathfrak{p}$. Lo mismo vale intercambiando las variables.

Demostración. Fijamos y_0, z_0 y definimos el polinomio $h(T) = AT^n + By_0^n + Cz_0^n$. Tenemos $h(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y $h'(x_0) = nAx_0^{n-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Con esto nos armaremos x_j en cada potencia $\mathfrak{p}^j$ de modo que, como $\mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$ es completo y cada coordenada que agregamos tiene menor modulo ($\mathfrak{p}$-adico), la sucesion converge a un x que cumple $h(x) = 0$.

Definimos $x_1 = x_0 + c_1$ tal que $c_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ y queda

$$h(x_1) = h(x_0 + c_1) \equiv h(x_0) + c_1 h'(x_0) \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

porque todos los terminos intermedios serán divisibles por $\mathfrak{p}^2$. Para tener $h(x_1) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ elegimos

$$c_1 = -\frac{h(x_0)}{h'(x_0)}.$$

Como $h'(x_0)$ es una unidad y $h(x_0) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, el c_1 cumple lo que queriamos.

Luego buscamos $x_2 = x_1 + c_2$, con $c_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ tal que la congruencia valga módulo $\mathfrak{p}^3$. La misma cuenta nos deja

$$h(x_1 + c_2) \equiv h(x_1) + c_2 h'(x_1) \pmod{\mathfrak{p}^3}.$$

Como $x_1 \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, la derivada sigue siendo una unidad. Por eso elegimos $c_2 = -h(x_1)/h'(x_1)$, que es divisible por $\mathfrak{p}^2$, y ponemos $x_2 = x_1 + c_2$. Asi obtenemos $h(x_2) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^3}$. Siguiendo con esta lógica tenemos el valor de $x \pmod{\mathfrak{p}^j}$ para todo j, que nos determina univocamente $x \in \mathcal{O}_{K_\mathfrak{p}}$. Por continuidad de h, tenemos $h(x) = 0$. Ademas, $x \equiv x_0 \pmod{\mathfrak{p}}$, asi que $(x : y_0 : z_0)$ es el punto no nulo que buscabamos. □

3.2.4. Símbolos de residuos y relaciones lineales

En las ecuaciones de descenso aparece una y otra vez la misma pregunta: si cierta unidad es un cuadrado, un cubo o, en general, una potencia módulo un primo. Los símbolos de residuos permiten guardar esa información de forma multiplicativa. Así, cuando el candidato es un producto de generadores, podemos calcular el símbolo de cada generador una sola vez y después trabajar solamente con sus exponentes. Para todo lo relacionado al tema se puede buscar en libro de Lemmermeyer [Lem00].

Supongamos que $\mu_n \subset K$ y que $\mathfrak{p} \nmid n$. Como las raíces n-ésimas de la unidad siguen siendo distintas al reducir, n divide a $N(\mathfrak{p}) - 1$. Si $\beta \in \mathcal{O}_K$ es coprimo con $\mathfrak{p}$, definimos el símbolo de residuo n-ésimo por

$$\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \in \mu_n, \qquad \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n \equiv \beta^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}.$$

La misma definición sirve para cualquier $\beta \in K$ con $v_\mathfrak{p}(\beta) = 0$, reduciendo numerador y denominador.

Las reglas que permiten ahorrar cuentas son las siguientes:

Proposición 3.2.4. *Para α, β de valuación cero en $\mathfrak{p}$ y $j \in \mathbb{Z}$, tenemos*

$$\left(\frac{\alpha\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_n, \qquad \left(\frac{\alpha^j}{\mathfrak{p}}\right)_n = \left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n^j.$$

El símbolo depende solamente del residuo módulo $\mathfrak{p}$, y

$$\left(\frac{\alpha}{\mathfrak{p}}\right)_n = 1 \iff \overline{\alpha} \in \left((\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times\right)^n \iff \alpha \in (K_\mathfrak{p}^\times)^n.$$

Demostración. La multiplicatividad y la invariancia por congruencias salen de la definición. Si escribimos $\overline{\alpha} = g^j$ para un generador del grupo cíclico $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, entonces $\overline{\alpha}^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} = 1$ equivale a $n \mid j$, que es justamente ser una potencia n-ésima. La ultima equivalencia es directa de usar Hensel con $T^n - \alpha$. □

La otra herramienta principal de estos simbolos es una ley de reciprocidad, de las que existen especificas para cada n. La famosa "reciprocidad cuadratica" de Euler nos permite dar vuelta el simbolo cuadratico de dos primos cambiando de signo solo si ambos son congruentes a 3 módulo 4. En nuestro caso usaremos bastante la reciprocidad cubica de $\mathbb{Z}[\omega]$ que se puede encontrar (como todas) en [Lem00].

Teorema 3.2.5 (Reciprocidad cúbica)**.** *Sean $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\omega]$ coprimos entre sí y congruentes a 1 o -1 módulo 3. Entonces*

$$\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_3 = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)_3.$$

Cada símbolo cúbico vale $1, \omega$ u ω^2, que podemos resumir en un valor en $\mathbb{F}_3$ correspondiente a la potencia de ω, y organizar la informacion de cada clase del Selmer en una matriz sobre ese cuerpo, como hacen Kling y Savoie en [KS25] para 2-descenso en $\mathbb{Q}(i)$. Esto es perfectamente replicable en nuestro caso pero nos quedaremos con el analisis de una sola familia para llegar al resultado.

3.3. Nuestro caso particular

3.3.1. El morfismo para el 3-descenso

Vamos a presentar el morfismo que usaremos para E_t para el 3-descenso. Trabajaremos por ahora con $t \in \mathcal{O}_K$ y las curvas

$$E_t : y^2 = x^3 + t^2, \qquad E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2.$$

Supondremos $t \neq 0$ y haremos el descenso en la direccion $\hat{\phi} : E'_t \to E_t$ porque el morfismo se evalua sobre E_t, que conocemos mejor, y la escritura como $(y-t)(y+t) = x^3$ nos permite ver directamente la cuenta necesitamos. Tambien porque en nuestro cuerpo las dos curvas son isomorfas ($-27 = (1+2\omega)^6$ es una potencia sexta), y entonces sus grupos de Selmer tambien lo serán:

$$S^{(\phi)}(E_t/K) \cong S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K),$$

y bastará calcular uno solo. Esto es especifico del caso que elegimos, tomada la idea del otro caso puntual donde ocurre esto, que es el que hace Savoie [Sav25].

Proposición 3.3.1. *El mapa $\alpha : E_t(K) \to K^\times/(K^\times)^3$ dado por*

$$\alpha(x,y) = [y-t], \qquad \alpha(\mathcal{O}) = [1], \qquad \alpha(T_0) = [(2t)^{-1}]$$

es el morfismo de descenso de $\hat{\phi}$. Su núcleo es $\hat{\phi}(E'_t(K))$ y su imagen está contenida en $K(S,3)$, tomando S formado por el lugar complejo y los primos de $6t$. Para los parametros de nuestra familia este es el grupo de (3.4).

Demostración. Una posible demostracion es la que dimos por encima en el inicio del capitulo, que se basa en que aislamos un x^3 en la ecuacion. Le faltarían detalles pero es completamente valida, aunque aca vamos a dar otra demostracion "menos sacada de la galera".

La función $f = y - t$ tiene divisor $3(T_0) - 3(\mathcal{O})$. En $E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2$, obtenemos

$$f \circ \hat{\phi} = \left(\frac{y-9t}{3x}\right)^3.$$

Por el teorema 3.1.2, da el morfismo y el núcleo indicados.

Para el valor en el punto T_0 podemos tomar x como parámetro local, escribir $y - t = x^3/(y+t)$ y reemplazando $y = t$ nos queda una serie cuyo coeficiente principal es $(2t)^{-1}$. Finalmente, por lo que vimos, el conjunto S tiene a los primos de mala reduccion (los que dividen al discriminante $-432t^4$), el orden de la isogenia y los lugares infinitos; que es lo que dice la proposicion. □

Usar los puntos conocidos

Para facilitar el descarte de clases en el grupo de Selmer, algo importante es ver que clases ya tenemos representadas por los puntos que conocemos.

Ejemplo 3.3.2. En nuestro caso, las clases de los puntos T_0 y P son

$$\alpha(T_0) = [(2t)^{-1}] = [(2t)^2], \qquad \alpha(P) = [(b-a)(b+a)^2],$$

pues $y(P) - t = -a(b-a)(b+a) - b(b-a)(b+a) = -(b-a)(b+a)^2$ y -1 es un cubo. El punto $[\omega]P$ da la misma clase que P, porque tiene la misma coordenada y, y esto no es un problema: los puntos asociados por el morfismo $[\omega]$ estan relacionados en el cociente $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ de donde sale α.

En las coordenadas de los exponentes $(e_\omega, e_2, e_-, e_0, e_+)$, que son base del espacio vectorial sobre $\mathbb{F}_3$, tenemos

$$\alpha(T_0) \longleftrightarrow (0,2,2,2,2), \quad \text{y} \quad \alpha(P) \longleftrightarrow (0,0,1,0,2),$$

cuyas clases son visiblemente independientes. Este isomorfirmo para el descenso es el que aparece en [KS25], permite su enfoque matricial y simplifica la presentacion.

3.3.2. Condiciones para descartar

En toda esta seccion haremos las cuentas que precisamos para descartar las clases en el grupo de Selmer. Recordemos que $t = (b-a)b(b+a)$, con los tres factores primos, no asociados y coprimos con 6. El grupo que tenemos es

$$K(S,3) = \{u = \omega^{e_\omega}(1-\omega)^{e_\lambda} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}, e_i \in \{0,1,2\}\}, \tag{3.4}$$

y nuestra ecuacion de descenso será

$$u^2X^3 + Y^3 + 2tuZ^3 = 0, \tag{3.5}$$

donde multiplicamos por u la que teniamos por conveniencia.

Recordemos que ahora nuestro objetivo es probar que, para ciertas clases u, existe algun primo $\mathfrak{p}$ para el cual la ecuacion de descenso no tiene soluciones en $K_\mathfrak{p}$. Con esto descartamos a u del Selmer. En cada primo podemos elegir un $u \in \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ con $v_\mathfrak{p}(u) \in \{0,1,2\}$, de modo que los coeficientes sean enteros localmente.

Eliminar el primo sobre 3

Primero eliminamos de u el $1-\omega$, porque no divide a $2t$. Nuestro $\mathfrak{p}$ será $(1-\omega)$, con lo que tenemos $v_\mathfrak{p}(2t) = 0$ y $v_\mathfrak{p}(u) = e_\lambda$. Vamos a usar el lema 3.2.3, ya que las valuaciones de cada termino de (3.5) son

$$2e_\lambda + 3v_\mathfrak{p}(X), \qquad 3v_\mathfrak{p}(Y), \qquad e_\lambda + 3v_\mathfrak{p}(Z).$$

Si $e_\lambda = 1$ o 2 los residuos serán distintos y el minimo se alcanza una sola vez, por lo que solo nos queda $e_\lambda = 0$.

Criterio para los primos de 2t

Los primos que quedan son $2, b-a, b$ y $b+a$, y cada uno aparece una sola vez en $2t$. Con ese criterio vamos a dar una forma de escribir u al reducir modulo $\mathfrak{p}$: si π es un generador del ideal $\mathfrak{p}$ entonces escribimos

$$2t = \pi\eta, \quad u = \pi^r\varepsilon \text{ para } r \in \{0,1,2\},$$

donde η y ε son la parte que no contiene $\mathfrak{p}$. Por esto ultimo podemos reducir $\overline{\eta}$ y $\overline{\varepsilon}$ modulo $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$ y ver el valor que toman en el simbolo cubico. Si asumimos que tenemos una solucion con coordenadas enteras y primitivas tendriamos entonces que

$$\pi^{2r}\varepsilon^2 X^3 + Y^3 + \pi^{r+1}\eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

Veamos primero el caso $r = 0$. La reduccion da $\overline{\varepsilon}^2 X^3 + Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. No pueden ser ambos X e Y divisibles por $\mathfrak{p}$ porque en ese caso Z tendria que ser la unidad, y volviendo a la ecuacion original las valuaciones de los terminos quedarian 3, 3 y 1, haciendo imposible que sumen 0. Entonces, como ambos X e Y son unidades (para que valga la ecuacion reducida) entonces el $\overline{\varepsilon}^2$ debe ser un cubo en $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$, o lo mismo $\overline{\varepsilon}$.

Con esta misma logica para los otros dos casos obtenemos:

Proposición 3.3.3. *Con la notacion de arriba vale que $C_u(K_\mathfrak{p}) \neq \varnothing$ si y solo si se cumple la condición de la fila correspondiente:*

r	*Condición en* $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^\times$
0	$\overline{\varepsilon}$ *es un cubo*
1	$\overline{\eta\varepsilon^{-1}}$ *es un cubo*
2	$\overline{\eta\varepsilon}$ *es un cubo*

Demostración. El caso $r = 0$ lo vimos arriba. Si $r = 1$, como queda $Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, podemos escribir $Y = \pi Y_1$ y eliminar de toda la ecuacion un π^2 para obtener

$$\varepsilon^2 X^3 + \pi Y_1^3 + \eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

Como la terna original era primitiva, ahora reduciendo vemos que tanto X como Z son unidades, y de $(X/Z)^3 \equiv -\overline{\eta\varepsilon^{-1}} \pmod{\mathfrak{p}}$ obtenemos la condicion de la tabla.

Si $r = 2$, también $Y = \pi Y_1$, y al dividir por π^3 obtenemos

$$\pi\varepsilon^2 X^3 + Y_1^3 + \eta\varepsilon Z^3 = 0.$$

Si Z fuera divisible por π, también lo sería Y_1; X sería una unidad y el primer término tendría valuación 1, frente a valuaciones al menos 3 de los otros dos. Por lo tanto Z es una unidad y $(Y_1/Z)^3 \equiv -\overline{\eta\varepsilon} \pmod{\mathfrak{p}}$.

Para ver que es suficiente basta seguir el desarrollo en el otro sentido. Por ejemplo para $r = 0$ y un $y^3 = -\varepsilon^2$ (como tiene solucion al reducir, por Hensel tiene solucion en $K_\mathfrak{p}$) ponemos $X = 1$, $Y = y$, $Z = 0$ y cumple la ecuacion. □

Observación 3.3.4. Podemos incorporar r en la cuenta y escribir las tres condiciones de la tabla con una sola ecuacion:

$$C_u(K_\mathfrak{p}) \neq \varnothing \iff \left(\frac{\varepsilon}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{\eta}{\mathfrak{p}}\right)_3^r.$$

Para $r = 0$ el simbolo de ε debe ser 1; para $r = 1$ debe ser igual al de η; y para $r = 2$ debe ser su inverso, que coincide con su cuadrado porque los valores del simbolo son raices cubicas de la unidad.

Imponer la condición en 2

Supongamos además que los tres factores de t son congruentes a un mismo $\delta \neq 0$ módulo 2. Condiciones como esta se ven seguido en los trabajos previos, y veremos a continuacion que nos facilitan el razonamiento rapidamente.

Como $\mathcal{O}_K/(2) \cong \mathbb{F}_4$, para todo $\delta \neq 0$ tenemos $\delta^3 = 1$ y entonces

$$t = (b-a)b(b+a) \equiv \delta^3 = 1 \pmod{2}.$$

En la notacion de la proposicion esto nos dice que $\eta = 1$, con lo que para cualquier r (que es e_2) queremos que $\overline{\varepsilon}$ sea un cubo, y el unico posible es el 1. Recordemos que en este caso $\varepsilon = \omega^{e_\omega}(b-a)^{e_-} b^{e_0}(b+a)^{e_+}$ (ya eliminamos $1-\omega$ de las clases) y reduciendo modulo 2 queda

$$1 = \omega^{e_\omega}\delta^{e_- + e_0 + e_+}.$$

Con esto vamos a probar que e_ω queda determinado por los exponentes del resto de los primos, con lo que vamos a reducir la dimension una vez mas.

3.3.3. Símbolos para los primos de t

Para poder aplicar la reciprocidad cubica a los tres primos vamos a imponer que sean congruentes a ± 1 módulo 3, y que tengan todos la misma clase. Esto fuerza a que $a \equiv 0 \pmod 6$, ya que recordemos que habiamos fijado la misma clase δ módulo 2.

Símbolos entre los factores

Para cada $\pi \in \{b-a, b, b+a\}$, la reciprocidad cubica da

$$\left(\frac{2}{\pi}\right)_3 = \left(\frac{\pi}{2}\right)_3 \equiv \pi^{(4-1)/3} \equiv \delta \pmod 2.$$

Los simbolos entre nuestros primos van a estar relacionados. Para ver esto fijemos uno de ellos y llamemoslo

$$\rho := \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3.$$

La congruencia $b+a \equiv 2b \pmod{b-a}$ da

$$\left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{2}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \delta\rho.$$

Por otro lado, $b+a \equiv -(b-a) \pmod b$ y -1 es un cubo, asi que

$$\left(\frac{b+a}{b}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3 = \rho.$$

Y dar vuelta los simbolos es lo mismo por reciprocidad.

Los símbolos de la unidad

Para los simbolos que faltan escribimos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 = \omega^{k_-}, \qquad \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 = \omega^{k_0}, \qquad \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+}.$$

Estos exponentes se definen como $\left(\frac{\omega}{\pi}\right)_3 = \omega^{(N(\pi)-1)/3}$; entonces, por la ley del paralelogramo, tenemos

$$k_- + k_0 + k_+ \equiv \frac{N(b-a)+N(b)+N(b+a)-3}{3} = \frac{3N(b)+2N(a)-3}{3} \equiv 0 \pmod 3.$$

Donde la ultima congruencia sale de que $N(b) \equiv 1 \pmod 3$ por ser $b \equiv \pm 1 \pmod 3$ y $N(a) \equiv 0 \pmod 9$ porque $a \equiv 0 \pmod 3$.

3.3.4. Relaciones entre los simbolos

Vamos a juntar los simbolos que definimos y el criterio de la proposicion.
Para $b-a$ tenemos

$$r = e_-, \qquad \eta = 2b(b+a), \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} b^{e_0} (b+a)^{e_+}.$$

Entonces, la condicion $\left(\frac{\eta}{b-a}\right)_3^{e_-} = \left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)_3$ queda

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_-} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_-} = \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_0} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_+}$$

$$\delta^{e_-} \rho^{e_-} (\delta\rho)^{e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}.$$

Para b tenemos

$$r = e_0, \qquad \eta = 2(b-a)(b+a), \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} (b+a)^{e_+},$$

y el criterio nos da

$$(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}.$$

Y para $b+a$ nos queda

$$r = e_+, \qquad \eta = 2(b-a)b, \qquad \varepsilon = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0},$$

y la condicion es

$$(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}.$$

3.3.5. Restricciones sobre los exponentes

Vamos a combinar las tres condiciones anteriores con la que obtuvimos en 2 para reducir los candidatos. Ya sabemos que $e_\lambda = 0$; reunamos las ecuaciones que tenemos hasta ahora:

(a) $(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2 + e_+} \rho^{e_0 + e_+}$.

(b) $(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}$.

(c) $(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}$.

(d) $\omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$.

(e) $k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod 3$.

Eliminar la unidad y elegir δ

Multiplicando (a), (b) y (c), desaparece el factor de ω por (e) y usamos $\delta^3 = 1$ para obtener

$$\delta^{2e_- + e_0 + 2e_+} \rho^{2(e_- + e_0 + e_+)} = \delta^{e_- + e_+} \rho^{2(e_- + e_0 + e_+)}.$$

Cancelando los factores comunes queda $\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$. Si juntamos esto con la condicion (d) obtenemos $\omega^{e_\omega} = 1$, es decir, $e_\omega = 0$, como habiamos prometido mas arriba.

Si $\delta = 1$, la igualdad que nos quedo no impone ninguna restriccion sobre la suma de los exponentes. Por eso elegiremos $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$: como tiene orden 3, nos da $e_- + e_0 + e_+ = 0$ en $\mathbb{F}_3$.

La relación entre e_2 y e_0

Volviendo a (a) con $e_\omega = 0$, tenemos

$$\delta^{2e_- - e_+ - e_2} = \rho^{e_0 + e_+ - 2e_-} = 1.$$

El ultimo exponente es congruente a $-3e_-$ modulo 3, porque $e_- + e_0 + e_+ = 0$. Por lo mismo tenemos $2e_- - e_+ - e_2 \equiv e_0 - e_2 \pmod 3$, asi que $\delta^{e_0 - e_2} = 1$ y, por nuestra eleccion de $\delta \neq 1$, resulta $e_2 = e_0$.

3.3.6. Recapitulacion

Entonces obtuvimos, ademas de $e_\lambda = 0$, los siguientes:

$$e_\omega = 0, \qquad e_- + e_0 + e_+ = 0, \qquad e_2 = e_0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

Por ejemplo, podemos determinar e_- y e_+ y el resto de los exponentes quedan determinados. Con esto probamos que el grupo de Selmer es de dimension (a lo sumo) 2 sobre $\mathbb{F}_3$. Juntemos todo en el resultado de lo que nos interesaba probar en esta seccion:

Teorema 3.3.5. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$ tales que $b-a, b$ y $b+a$ sean primos no asociados entre sí y congruentes con ± 1 módulo 3 y δ módulo 2 para un $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$, y pongamos $t = (b-a)b(b+a)$. Entonces*

$$S^{(\hat{\phi})}(E'_t/K) = \mathrm{Im}(\alpha) = \left\langle [(2t)^{-1}],\, [(b-a)(b+a)^2] \right\rangle \cong \mathbb{F}_3^2.$$

En consecuencia, Ш$(E'_t/K)[\hat{\phi}] = 0$ y $\mathrm{rg}\, E_t(K) = 2$.

Demostración. Las restricciones que encontramos dejan un espacio de dimension 2 y la imagen de los puntos que tenemos nos lo realiza. La afirmacion sobre Ш se sigue de la sucesion exacta corta. Por el isomorfismo entre los grupos de Selmer y por el hecho de que los nucleos de las isogenias estan definidos sobre K, la cota que probamos del rango de la curva en 3.1.9 nos queda:

$$\mathrm{rg}\, E_t(K) \leq 2 + 2 - 1 - 1 = 2,$$

que junto con los dos puntos independientes tenemos la igualdad.

Por otro lado, t tiene valuacion 1 en cada uno de sus tres primos, asi que la proposicion 1.3.5 da torsion $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. El punto $P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$ tiene coordenada $x \neq 0$, de modo que no es de torsion. Por la proposicion 1.3.3, P y $[\omega]P$ son independientes y dan rango al menos 2. Por lo tanto el rango es exactamente 2. □

Para completar la presentacion de la curva comentemos que la torsion es necesariamente $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ por la proposicion 1.3.5 y que t visto módulo cubos no es ni 1 ni 4, si se quiere por su valuacion 1 en el primo b. Tambien que podemos fijar $\delta = \omega$ y $b \equiv 1$ (mód 3) para elegir algun caso de los posibles, y entonces los primos $b-a, b$ y $b+a$ quedan congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6.

Ahora, una vez que nos aseguramos que estas curvas tienen rango exactamente 2, vamos a querer probar que hay infinitas de ellas. Para esto vamos a ver que existen infinitos primos en $\mathcal{O}_K$ con las condiciones que impusimos.

Capítulo 4

Teoremas de distribucion de primos

Esta será una seccion corta donde contaremos algunos resultados de combinatoria aditiva que nos permiten asegurar la existencia de primos del modo que nos interesa para asegurar que tendremos infinitos ejemplos de la curva que construimos. Estos tipos de resultados son los que se usan en los papers de Zywina, Savoie y demas, pero principalmente como una "caja negra" ya que provienen de otras areas de la teoria de números.

4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir

LINEAR EQUATIONS IN PRIMES

Conjetura generalizada de Hardy-Littlewood: para ψ_i varias formas lineales afines (ie mas una cte)

$$\{n \in B_r \cap \mathbb{Z}^d : \psi_1(n), \cdots, \psi_t(n) \text{ son primos}\} = (1 + o_{asd}(1))(\text{cosas feas})$$

Que me dice algo sobre cantidad de valores de n donde consigo que la imagen de mis formas lineales sean todos primos. Ver examples en el primero de tao pags 7 y 8. Despues tiene muuuchas cosas buenas y consecuencias, pero no se si las conjeturas estan probadas o no.

THE MOBIUS FUNCTION IS STRONGLY ORTHOGONAL TO NILSEQUENCES

Aca prueba un par de conjeturas, pero no se bien que consecuencias tiene, no menciona nada de eso.

THE PRIMES CONTAIN ARBITRARILY LONG POLYNOMIAL PROGRESSIONS

Prueban: given any integer-valued polynomials $P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{Z}[m]$ in one unknown m with $P_1(0) = \cdots = P_k(0) = 0$ and any $\varepsilon > 0$, we show that there are infinitely many integers x, n with $1 \leq n \leq x^{\varepsilon}$ such that $x + P_1(n), \ldots, x + P_k(n)$ are simultaneously prime.

Viene de: Theorem 1,1 (Polynomial Szemerédi theorem).[6] Let $A \subset \mathbb{Z}$ be a set of positive upper density, i.e. limsup $|A \cap [N]|/N > 0$. Then given any integer-valued polynomials $P_1, \ldots, P_k \in \mathbb{Z}[m]$ in one unknown m with $P_1(0) = \cdots = P_k(0) = 0$, A contains infinitely many progressions of the form $x + P_1(n), ..., x + P_k(n)$ with $n > 0$.

Y lo hacen poniendo P en vez de $\mathbb{Z}$ en el de Szemeredi.

THE QUANTITATIVE BEHAVIOUR OF POLYNOMIAL ORBITS ON NILMANIFOLDS

4.2. Sobre cuerpos de numeros

Para nuestro resultado necesitamos tres elementos primos en progresion aritmetica, con congruencias prefijadas. La herramienta es el teorema de Kai [Kai26, teoremas 1.1 y 12.1, observacion 12.3]. Enunciemos solo el caso que vamos a aplicar.

Teorema 4.2.1 (Kai, caso de tres formas sobre $\mathbb{Q}(\omega)$)**.** *Sean*

$$\psi_i(U, V) = A_i U + B_i V + C_i \in \mathbb{Z}[\omega][U, V], \qquad i = 1, 2, 3.$$

Supongamos que las partes lineales son independientes dos a dos, es decir,

$$A_i B_j - A_j B_i \neq 0 \qquad (i \neq j),$$

y que para cada ideal primo $\mathfrak{p}$ *existe un par* (U, V) *modulo* $\mathfrak{p}$ *con*

$$\psi_1(U,V)\psi_2(U,V)\psi_3(U,V) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

Entonces hay infinitos pares $(U, V) \in \mathbb{Z}[\omega]^2$ *para los que los tres valores son elementos primos. Podemos excluir ademas cualquier union finita de rectas afines sobre* K*.*

La segunda hipotesis dice que no hay un primo que impida de antemano los valores simultaneamente primos. El teorema da, mas precisamente, al menos un multiplo positivo de $N^4/(\log N)^3$ pares cuando los cuatro coeficientes de U, V en la base $1, \omega$ están acotados por N. Una recta aporta a lo sumo un multiplo de N^2 pares, de modo que podemos excluir finitas rectas. Esto justifica la ultima afirmacion y permite quitar parametros degenerados. No necesitaremos las herramientas analiticas de su demostracion.

Proposición 4.2.2. *Dado un conjunto finito* $\mathcal{F}$ *de ideales primos de* $\mathbb{Z}[\omega]$*, existen* $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$*, con* $a \neq 0$*, tales que*

$$b - a, \quad b, \quad b + a$$

son primos congruentes a $4 + 3\omega$ *modulo* 6 *y ninguno genera un ideal de* $\mathcal{F}$*.*

Demostración. Primero veamos la construccion sin la restriccion sobre $\mathcal{F}$. Ponemos $c = 4 + 3\omega$ y

$$a = 6U, \qquad b = c + 6V.$$

Los tres factores son

$$\psi_- = c + 6(V - U), \qquad \psi_0 = c + 6V, \qquad \psi_+ = c + 6(V + U).$$

Los determinantes de sus partes lineales son $-36, -72, -36$, todos no nulos. Si $\mathfrak{p} \mid 6$, las tres formas valen c modulo $\mathfrak{p}$, que es una unidad: $c \equiv \omega \pmod 2$ y $c \equiv 1 \pmod 3$. Si $\mathfrak{p} \nmid 6$, tomamos $U = 0$ y $V = (1 - c)/6$ modulo $\mathfrak{p}$; los tres valores son 1. Aplicamos el teorema y excluimos la recta $U = 0$ para tener $a \neq 0$.

Para evitar $\mathcal{F}$, quitamos de la lista los primos sobre 6, que ya están excluidos. Elegimos un generador $\pi_{\mathfrak{q}}$ para cada $\mathfrak{q} \in \mathcal{F}$ y ponemos

$$M = 6 \prod_{\mathfrak{q} \in \mathcal{F}} \pi_{\mathfrak{q}}.$$

Por el teorema chino del resto podemos elegir $c_{\mathcal{F}}$ con

$$c_{\mathcal{F}} \equiv c \pmod 6, \qquad c_{\mathcal{F}} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{q}} \quad (\mathfrak{q} \in \mathcal{F}).$$

Repetimos con $a = MU$ y $b = c_{\mathcal{F}} + MV$. Los determinantes siguen siendo no nulos. En los primos de M, las tres formas son unidades; en los demas volvemos a hacerlas iguales a 1 modulo $\mathfrak{p}$. Sus valores primos no pueden pertenecer a $\mathcal{F}$, porque son congruentes a 1 en esos ideales. □

Esta es la forma de usar Kai como caja negra: escribir los factores como formas lineales en dos variables, comprobar los tres determinantes y resolver las condiciones modulo cada primo. Para empezar una busqueda concreta podemos recorrer $a = 6U$, $b = 4 + 3\omega + 6V$ y probar si los tres factores son primos. Por el lema 1.3.7, con $U \neq 0$ serán no asociados. La proposicion permite repetir la busqueda imponiendo que aparezcan primos nuevos.

4.3. Recopilación final: patrones de primos para especializar

Reunimos las herramientas que permiten especializar los factores de los coeficientes de una familia elíptica en primos con las condiciones necesarias para el descenso. No hay un único teorema que contenga todas estas aplicaciones: las restricciones sobre los parámetros, las congruencias y el tipo de primo forman parte de cada conclusión. El control del soporte es el vínculo con el descenso; véanse Stoll [Sto06, §1.1, teoremas 1.1–1.2] y Schaefer–Stoll [SS04, §4, lema 4.5 y proposición 4.6]. Producir los primos es un paso previo al cálculo local, no una afirmación de rango.

Sobre $\mathbb{Q}$, primo significa entero positivo primo. Sobre un cuerpo de números K, un elemento primo $\pi \in \mathcal{O}_K$ genera un ideal primo no nulo; dos elementos son asociados si difieren por una unidad. Un ideal primo puede no ser principal, y $|N_{K/\mathbb{Q}}(\pi)|$ puede ser una potencia de un primo racional. Las congruencias de los parámetros se incorporan antes de comprobar las hipótesis de los resultados siguientes.

1. Sobre cualquier cuerpo: Kai, incluyendo la aproximación local. Cuando los factores relevantes son afines, escribimos

$$L_i(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{x} + c_i \in \mathcal{O}_K[X_1, \dots, X_d], \qquad 1 \le i \le r.$$

Suponemos que las partes lineales son no nulas e independientes dos a dos sobre K, y que

$$\text{para todo ideal primo } \mathfrak{p}, \quad \exists \boldsymbol{x}_{\mathfrak{p}} \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{p})^d : \quad \prod_i L_i(\boldsymbol{x}_{\mathfrak{p}}) \neq 0. \tag{4.1}$$

Entonces hay infinitos parámetros con todos los valores elementos primos. Si $n = [K : \mathbb{Q}]$, en cajas de tamaño N de una base integral se obtienen $\gg N^{nd}/(\log N)^r$ soluciones. Para imponer signos en los lugares reales se necesita una región de volumen positivo compatible con ellos; sobre $\mathbb{Q}$ basta una dirección $\boldsymbol{v}$ con $\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{v} > 0$ para todo i.

Son los teoremas 1.1 y 12.1 y la observación 12.3 de Kai [Kai26], que extienden a K el resultado de Green–Tao–Ziegler. Incluyen la producción de primos en clases residuales reducidas y de patrones afines sobre $\mathbb{Q}$. También se pueden exigir normas racionales primas: los ideales de grado residual mayor que 1 aportan una cantidad despreciable. Esto no permite fijar arbitrariamente coordenadas de los parámetros.

Para aplicarlo, se introducen las congruencias mediante $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + M\boldsymbol{y}$, con $M \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$, y se repite (4.1). La comprobación es finita: fuera de los ideales donde alguna parte lineal se anula al reducir, cada factor elimina un hiperplano; si $N(\mathfrak{p}) > r$, esos hiperplanos no cubren todo el espacio residual. El conteo permite excluir ceros de polinomios no nulos en las coordenadas enteras, pues tienen $O(N^{nd-1})$ puntos.

Si S es un conjunto finito de ideales primos y $e_1, \dots, e_r \in \mathcal{O}_K[S^{-1}]$ son distintos, el teorema 13.1 y la proposición 13.2 de Kai permiten aproximar pares locales $(\lambda_{\mathfrak{p}}, \mu_{\mathfrak{p}}) \in K_{\mathfrak{p}}^2$ para $\mathfrak{p} \in S$, controlar λ/μ en los lugares arquimedianos y conseguir que todos los $\lambda - e_i\mu$ sean primos no asociados en $\mathcal{O}_K[S^{-1}]$. Fuera de S, cada uno tiene exactamente un factor primo, con exponente 1; en S puede tener otros factores.

La proposición 13.3 da una variante directamente en el parámetro: para datos $T_{\mathfrak{p}} \in K_{\mathfrak{p}} \setminus \{e_1, \dots, e_r\}$, se obtiene $T \in K$ tan próximo a ellos como se quiera, totalmente positivo y arbitrariamente grande en todos los valores absolutos arquimedianos, con ideales distintos $\mathfrak{p}_i \notin S$ tales que

$$v_{\mathfrak{p}_i}(T - e_i) = 1, \qquad v_{\mathfrak{q}}(T - e_i) \le 0 \quad (\mathfrak{q} \notin S \cup \{\mathfrak{p}_i\}).$$

Además, si L/K es cíclica y no ramifica fuera de S,

$$\operatorname{inv}_{\mathfrak{p}_i}(L/K, T - e_i) = -\sum_{\mathfrak{p} \in S} \operatorname{inv}_{\mathfrak{p}}(L/K, T_{\mathfrak{p}} - e_i).$$

Aquí $\operatorname{inv}_v(L/K, z)$ es el invariante local del álgebra cíclica definida por z y un carácter fiel fijo de $\operatorname{Gal}(L/K)$. Si la suma es cero, $\mathfrak{p}_i$ se descompone completamente en L. Las valuaciones negativas siguen permitiendo denominadores, que deben incluirse en el análisis del modelo elíptico.

2. Sobre cualquier cuerpo: constelaciones relativas con dilatación entera. Sea A un conjunto de elementos primos de $\mathcal{O}_K$ de densidad relativa superior positiva: la proporción de elementos de A entre los primos de cajas crecientes de una base integral tiene límite superior positivo. Para cualquier conjunto finito $\mathcal{V} \subset \mathcal{O}_K$, existen

$$\beta + k\mathcal{V} \subset A, \qquad \beta \in \mathcal{O}_K, \quad k \in \mathbb{Z}_{>0},$$

sin pares de asociados. Es el teorema 1.4 de Kai, Mimura, Munemasa, Seki y Yoshino, *Constellations in prime elements of number fields*. Contiene las progresiones de Green–Tao y las constelaciones

gaussianas de Tao. Una clase reducida módulo un ideal no nulo tiene la densidad requerida, por el teorema de Mitsui en la formulación de Kai [Kai26, §6].

No es un caso particular del bloque anterior: admite un subconjunto denso arbitrario y exige una dilatación en $\mathbb{Z}$. Si $[K:\mathbb{Q}]>1$, para elementos distintos v_i las aplicaciones

$$\psi_i(\beta,k)=\beta+kv_i,\qquad (\beta,k)\in\mathcal{O}_K\oplus\mathbb{Z}$$

satisfacen $\psi_i(\mathrm{nu}(\psi_j))=\mathbb{Z}(v_i-v_j)$ para $i\neq j$. Este subgrupo tiene rango 1 e índice infinito en $\mathcal{O}_K$, y falla la condición de conúcleo finito de la versión $\mathbb{Z}$-lineal del teorema 12.1 de Kai; véase su observación 12.4.

El teorema 1.6 del mismo artículo sobre constelaciones trata los casos cuadráticos: si

$$F(X,Y)=AX^2+BXY+CY^2,\quad \mathrm{mcd}(A,B,C)=1,$$

su discriminante B^2-4AC no es cuadrado y F no es definida negativa, entonces, para cualquier $\mathcal{V}\subset\mathbb{Z}^2$ finito, existen $\boldsymbol{u}\in\mathbb{Z}^2$ y $k\in\mathbb{Z}_{>0}$ tales que todos los $F(\boldsymbol{u}+k\boldsymbol{v})$, con $\boldsymbol{v}\in\mathcal{V}$, son primos racionales distintos. Incluye formas de cuerpos cuadráticos reales e imaginarios; las congruencias adicionales no forman parte automática de este último enunciado.

3. Descomposición de primos: Chebotarev sobre K y Frei–Tinková sobre $\mathbb{Q}$. Para una extensión de Galois finita L/K y una clase de conjugación C, Chebotarev produce infinitos ideales primos no ramificados con $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(L/K)=C$. Para obtener generadores $\pi\equiv c\pmod{\mathfrak{m}}$, con $c\in\mathcal{O}_K\setminus\{0\}$ coprimo con $\mathfrak{m}$, se pide además la clase de rayos del ideal (c). Las dos condiciones deben coincidir en la intersección de L con el cuerpo de clases de rayos; los signos se incorporan a la parte infinita del módulo. Fuente: Milne, *Class Field Theory*, versión 4.03, teoremas V.2.5 y V.3.23, pp. 156 y 164.

Sobre $\mathbb{Q}$ se pueden relacionar aditivamente los primos y prescribir por separado sus Frobenius. Sean $L_i(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{x}+c_i\in\mathbb{Z}[\boldsymbol{x}]$ con partes lineales no nulas, no proporcionales dos a dos, sin divisor primo fijo para $\prod_i L_i$ y con una dirección $\boldsymbol{v}$ en la que todas las $\boldsymbol{a}_i\cdot\boldsymbol{v}$ sean positivas. Sean $F_i/\mathbb{Q}$ extensiones de Galois finitas y C_i clases de conjugación. Tomamos D múltiplo de los conductores de las subextensiones abelianas máximas F_i^{ab}. Si existe $\boldsymbol{x}_0\pmod D$ tal que todos los $L_i(\boldsymbol{x}_0)$ son unidades módulo D y

$$\left(\zeta_D\longmapsto\zeta_D^{L_i(\boldsymbol{x}_0)}\right)\big|_{F_i^{\mathrm{ab}}}=C_i\big|_{F_i^{\mathrm{ab}}},$$

hay infinitos parámetros con valores $p_i=L_i(\boldsymbol{x})$ primos distintos, no ramificados en F_i, y $\mathrm{Frob}_{p_i}(F_i/\mathbb{Q})=C_i$. Es el corolario 1.6 de Frei–Tinková, *Linear constellations in primes with arithmetic restrictions*, incondicional.

Esta última herramienta amplía el resultado afín sobre $\mathbb{Q}$, pero no tiene por cuerpo base un K arbitrario. Para símbolos de residuos de elementos fijos se aplica Chebotarev a la extensión de Kummer correspondiente: si ℓ es primo, $\mu_\ell\subset K$ y $d_j\in K^\times$ son fijos, usamos $K(\sqrt[\ell]{d_1},\dots,\sqrt[\ell]{d_s})$, excluyendo los lugares sobre ℓ y los soportes de los d_j. Los símbolos prescritos deben respetar las relaciones entre sus clases en $K^\times/K^{\times\ell}$. Los símbolos entre dos primos que varían no quedan prescritos automáticamente.

4. Sobre $\mathbb{Q}$: patrones polinomiales de Tao–Ziegler. Para producir $x+P_i(\boldsymbol{m})$ primos hay dos versiones complementarias.

1. Si $P_i\in\mathbb{Z}[m]$ son distintos y $P_i(0)=0$, existen infinitos patrones $x+P_i(m)$, con $m>0$, dentro de cualquier subconjunto de primos de densidad relativa superior positiva. Es el teorema 1.3 de *The primes contain arbitrarily long polynomial progressions*. Se puede tomar la clase $c\pmod M$ si $\mathrm{mcd}(c,M)=1$, y exigir $D\mid m$ sustituyendo $P_i(m)$ por $P_i(Dm)$. La demostración transfiere a los primos el teorema polinomial de Szemerédi.

2. Si $P_i\in\mathbb{Z}[m_1,\dots,m_s]$ tienen grado a lo sumo $d\geq 1$, sus partes homogéneas de grado d son distintas dos a dos y, para cada primo p, existe $(x,\boldsymbol{m})$ módulo p con $\prod_i(x+P_i(\boldsymbol{m}))\neq 0$, existen infinitos patrones simultáneamente primos. No se exige $P_i(0)=0$. Es el corolario 1.5, procedente del conteo del teorema 1.4, de *Polynomial patterns in the primes*.

La primera versión admite $P_i = 0, m^2, m^2+m$, cuyas partes principales no son todas distintas. La segunda admite $0, m^2+1, 2m^2$: para el test local sirven $(x,m) = (1,1)$ módulo 2 y $(1,0)$ módulo cualquier primo impar. Estos ejemplos muestran por qué conservamos ambas. Sustituir en Kai una diferencia libre por m^2 impone una condición que su conteo afín no controla.

En una variable, con $d = \max_i \operatorname{gr} P_i = \operatorname{gr}(P_i - P_j)$ para $i \neq j$, Matthiesen, Teräväinen y Wang, *Quantitative asymptotics for polynomial patterns in the primes*, teorema 1.1, mejoran el conteo: el promedio normalizado ponderado por von Mangoldt en $1 \leq x \leq N^d$, $1 \leq m \leq N$ tiene como término principal el producto de factores locales, positivo bajo la admisibilidad, y error $O_A((\log N)^{-A})$ para cualquier $A > 0$. En ese artículo se usa $\Lambda(z) = \log p$ si $|z| = p^j$, $j \geq 1$, y 0 en otro caso; por tanto, para obtener primos positivos también se controla el signo de los valores. Su conclusión para casi todas las traslaciones, corolario 1.4, es en promedio y no fija una traslación elegida previamente.

Como aplicación a coeficientes elípticos, Zywina [Zyw25b, teorema 1.2 y §4] utiliza los primos $m, m+16n^2, m+25n^2$, todos $11 \pmod{24}$, en

$$y^2 = x^3 - 5(m+16n^2)x^2 + 4(m+16n^2)(m+25n^2)x.$$

La primera versión produce el patrón; el descenso es el argumento adicional que determina el rango.

5. Resultados especiales que tampoco quedan absorbidos. Las formas de coeficientes de la tabla producen infinitos primos bajo las condiciones indicadas. Que una expresión sea una norma no basta para aplicar Kai: las restricciones de sus coordenadas pueden dejar un conjunto de densidad cero en el espacio de parámetros.

Fuente	Aplicación e hipótesis
Friedlander e Iwaniec, teorema 1	Infinitos primos u^2+v^4 con $u,v>0$: la norma gaussiana $N(u+iv^2)$ tiene una coordenada cuadrada. Las restricciones a progresiones fijas requieren positividad del factor local, como se explica en la p. 947.
Heath-Brown y Moroz, teorema 1	Para una forma cúbica binaria entera e irreducible F, se obtienen valores primos de $f(U,V) = \gamma_0^{-1}F(u_0+MU, v_0+MV)$ si f tiene coeficientes enteros, es primitivo y no tiene divisor primo fijo. Se toman $M>0$, $u_0, v_0 \in \mathbb{Z}$ y $\gamma_0 > 0$ igual al contenido. Para que F mismo sea primo se necesita $\gamma_0 = 1$.
Fuchs, Hsu, Rickards, Schindler y Stange, teorema 1.1	Aplicación a $\mathbb{Q}(\omega)$: hay infinitos primos $p = x^2-xy+y^2+2$ con $\operatorname{mcd}(x,y) = 1$ y $p \equiv c \pmod M$, si $\operatorname{mcd}(M,6) = \operatorname{mcd}(c, M) = \operatorname{mcd}(c-2, M) = 1$. Por ejemplo, se puede pedir $p \equiv 1 \pmod 5$.
Maynard, teoremas 1.1–1.2	Si θ es un entero algebraico de grado n, $K = \mathbb{Q}(\theta)$, $1 \leq k < n$ y $n \geq 4k$, la forma $N_{K/\mathbb{Q}}(x_1 + x_2\theta + \cdots + x_{n-k}\theta^{n-k-1})$ toma infinitos valores primos. Basta $n \geq 22k/7$ si $\theta = \sqrt[n]{a}$, $a \in \mathbb{Z}$ y $X^n - a$ es irreducible.

Para mezclar factores primos y condiciones de norma se conserva el teorema 1.2 de Bienvenu, *Asymptotics for some polynomial patterns in the primes*.

Sean $\psi_1, \ldots, \psi_{r+s}$ formas afines enteras con partes lineales no nulas, no proporcionales dos a dos, y $f_{r+1}, \ldots, f_{r+s}$ formas cuadráticas binarias positivas. Se piden $\psi_1, \ldots, \psi_r$ primos y $\psi_j = f_j(u_j, v_j)$ para $j > r$, en una región donde todos los valores crezcan positivamente. La condición local es que sean positivos los factores

$$\beta_p = \lim_{a\to\infty} \frac{1}{p^{ad}} \sum_{\boldsymbol{x} \bmod p^a} \prod_{i=1}^{r} \Lambda_p(\psi_i(\boldsymbol{x})) \prod_{j=r+1}^{r+s} \frac{\rho_{f_j,\psi_j(\boldsymbol{x})}(p^a)}{p^a},$$

donde d es el número de parámetros, $\Lambda_p(z) = p/(p-1)$ si $p \nmid z$ y 0 en caso contrario, y $\rho_{f,b}(p^a)$ cuenta las soluciones de $f(u,v) \equiv b \pmod{p^a}$. El producto de esos factores converge y, si todos son positivos, el conteo ponderado tiene término principal positivo. Así se obtienen infinitos parámetros; no se exige que los valores representados por las formas cuadráticas también sean primos.

Para imponer una ecuación entre muchos coeficientes primos, una versión con cota explícita es el teorema 1.1 de Yamagishi, *Diophantine equations in primes: density of prime points on affine*

hypersurfaces. Si $F \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$ es homogéneo de grado $d \geq 2$, $F = 0$ tiene un punto no singular en $(0,1)^n$ y uno en $(\mathbb{Z}_p^\times)^n$ para cada primo p, y

$$n - \dim V_F^* \geq 2^8 3^4 5^2 d^3 (2d-1)^2 4^d, \qquad V_F^* = \{\boldsymbol{z} \in \mathbb{C}^n : \nabla F(\boldsymbol{z}) = 0\},$$

entonces hay infinitas soluciones con todas las coordenadas primas. La cota muestra que se necesitan muchas variables. Para sistemas con distintos grados, la referencia complementaria es su *Prime solutions to polynomial equations in many variables and differing degrees*, teorema 1.2; ese resultado requiere comprobar las condiciones de rango de cada grupo de grados y no se deduce de la cota escrita para una sola ecuación.

Hay dos alternativas si el descenso tolera conclusiones más débiles. Maynard, *Small gaps between primes*, proposiciones 4.2–4.3, demuestra que para cada m existe $k_0(m)$ tal que toda tupla de enteros distintos $h_1, \dots, h_k$, con $k \geq k_0(m)$ y sin divisor primo fijo de $\prod_i (n + h_i)$, tiene infinitos n con al menos m valores primos. Algún subconjunto de m índices se repite infinitamente, pero no se elige de antemano. Iwaniec, *Almost-primes represented by quadratic polynomials*, teorema de la p. 172, produce infinitos $n^2 + 1$ con a lo sumo dos factores primos, contados con multiplicidad.

Finalmente, Skorobogatov–Sofos, *Schinzel Hypothesis on average and rational points*, teorema 1.2, permite variar los coeficientes. Fijados grados $d_i > 0$, $M \geq 1$, n_0 y polinomios Q_i de grado a lo sumo d_i con $\operatorname{mcd}(M, \prod_i Q_i(n_0)) = 1$, para el 100 % de las tuplas P_i de grados d_i, coeficientes principales positivos, $P_i \equiv Q_i \pmod M$ y sin divisor primo fijo del producto, ordenadas por altura de coeficientes, existe un $n \equiv n_0 \pmod M$ con todos los $P_i(n)$ primos distintos. Esto produce nuevas elecciones de coeficientes; no afirma infinitas especializaciones para una tupla fija.

Cómo pasar de los resultados a infinitos ejemplos. Primero se escriben las condiciones concretas del descenso y se incorporan al patrón. Después se certifican la primalidad y los datos locales de cada candidato. La garantía de continuar la búsqueda depende de la herramienta:

1. En los conteos afines se excluyen los primos anteriores y las degeneraciones, comprobando que los conjuntos descartados tengan orden menor que el término principal. Otra opción es imponer que todos los factores sean unidades en los ideales ya usados, mediante nuevas congruencias compatibles, y aplicar el teorema con ese módulo fijo.

2. En las versiones relativas se quitan del conjunto denso los primos anteriores; sobre K, también sus asociados, que tienen densidad cero en las cajas. Para hacer crecer el parámetro polinomial de Tao–Ziegler se sustituye $P_i(m)$ por $P_i(Dm)$ con D creciente.

3. Para la constelación cuadrática, se aplica el resultado a más de $|\mathcal{F}|$ copias trasladadas disjuntas del patrón, donde $\mathcal{F}$ es el conjunto de valores primos ya usados. Como todos los valores obtenidos son distintos, alguna copia evita $\mathcal{F}$.

Los resultados especiales con conteo de valores primos permiten superar cualquier cota de valores anteriores. Al enumerar parámetros se deben recorrer cajas crecientes, sin fijar coordenadas que el teorema necesita libres. La infinitud garantiza que la búsqueda exhaustiva encuentra otro ejemplo; no da necesariamente una cota práctica pequeña para encontrarlo.

Para nuestra familia sobre $K = \mathbb{Q}(\omega)$, con $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, se toman

$$c = 4 + 3\omega, \qquad a = 6U, \qquad b = c + 6V, \qquad t = (b-a)b(b+a).$$

Las formas $c+6(V-U), c+6V, c+6(V+U)$ tienen determinantes $-36, -72, -36$. En los ideales sobre 6, c es una unidad porque $N(c) = 13$; en los demás, $U = 0$, $V = (1-c)/6$ da valores 1. Kai permite luego excluir $U = 0$ y las coincidencias por unidades, que aquí son finitas. Alternativamente, el teorema relativo aplicado a los primos $\pi \equiv c \pmod 6$ y al patrón $\{-6, 0, 6\}$ produce $b-6k, b, b+6k$ primos no asociados con $k > 0$ entero, conservando $a = 6k \in \mathbb{Z}$.

Para repetir sin reutilizar ideales, registramos los usados en $\mathcal{F}$, tomamos $M = 6 \prod_{\mathfrak{q} \in \mathcal{F}} \pi_{\mathfrak{q}}$, con $(\pi_{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{q}$, y elegimos $c_{\mathcal{F}} \equiv c \pmod 6$, $c_{\mathcal{F}} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{q}}$ para $\mathfrak{q} \in \mathcal{F}$. Esto es posible porque $\mathbb{Z}[\omega]$ es principal y los ideales usados no dividen 6. Se buscan $a = MU$, $b = c_{\mathcal{F}} + MV$; el mismo test local permite repetir el proceso. Cada etapa usa un módulo fijo, sin afirmar uniformidad mientras ese módulo crece.

Infinitos parámetros todavía no significan infinitas curvas. Para $E_t : y^2 = x^3+t^2$, un isomorfismo sobre K obliga a que $(t'/t)^2$ sea una sexta potencia y, por tanto, a que t'/t sea un cubo. Sus valuaciones deben ser múltiplos de 3. Si los nuevos productos t tienen tres ideales primos distintos, todos de exponente 1 y con soporte disjunto de los anteriores, una valuación de t'/t es -1, lo que impide el isomorfismo. En otras familias hay que comprobar su propio criterio de isomorfismo, además del descenso.

Alcance conjetural. La hipótesis H de Schinzel predice infinitos valores simultáneamente primos de polinomios no constantes, irreducibles en $\mathbb{Z}[T]$, con coeficientes principales positivos y sin divisor primo fijo del producto. Dickson es el caso de varios factores lineales en una variable; Bateman–Horn añade una predicción de conteo. Son conjeturas, como distingue la introducción de Skorobogatov–Sofos. En particular, los teoremas anteriores no permiten fijar una diferencia arbitraria entre todos los primos del patrón.

Capítulo 5

Familia de curvas elipticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2

5.1. Los parametros y el grupo de Mordell-Weil

Reunamos los resultados anteriores para $K = \mathbb{Q}(\omega)$. La eleccion $t = k^2 - 1$ nos dio un punto conocido; al escribir $k = a/b$ obtuvimos el modelo entero $E_{a,b}$ de la introduccion. Ahora las condiciones sobre $b-a, b, b+a$ permiten fijar tambien la torsion, el rango y el cuerpo de definicion.

Proposición 5.1.1. *Sean $a, b \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $a \neq 0$, tales que $b-a, b, b+a$ sean elementos primos congruentes a $4+3\omega$ modulo 6. Entonces la curva*

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + ((b-a)b(b+a))^2$$

está genuinamente definida sobre K y

$$E_{a,b}(K) \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Su torsion está generada por $T_0 = (0, t)$, con $t = (b-a)b(b+a)$, y los puntos

$$P = (a^2 - b^2, a(a^2 - b^2)), \qquad [\omega]P$$

son independientes.

Demostración. El lema 1.3.7 garantiza que los tres primos son no asociados. Sus congruencias dan $a \equiv 0$ (mód 6), $b \equiv 1$ (mód 3) y $b \equiv \omega$ (mód 2). Por lo tanto se cumplen las hipotesis del teorema 3.3.5, que da rango 2. La torsion, la independencia y la definicion genuina sobre K se obtienen del corolario 1.3.7. □

Los casos de torsion mayor están caracterizados en las proposiciones 1.3.4 y 1.3.5; el nucleo del descenso, en la proposicion 3.3.1; y la comparacion con la isogenia dual, en el teorema 3.3.5. Los puntos $P, [\omega]P$ generan un subgrupo de indice finito en la parte libre; no estamos afirmando que formen una base.

5.2. Infinitas clases de isomorfismo

Teorema 5.2.1. *Existen infinitas clases de isomorfismo sobre $K = \mathbb{Q}(\omega)$ de curvas elipticas genuinamente definidas sobre K, con j-invariante 0 y grupo de Mordell-Weil isomorfo a*

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Todas pueden obtenerse de los parametros de la proposicion 5.1.1.

Demostración. Aplicamos la proposicion 4.2.2, primero con $\mathcal{F}$ vacio y luego agregando a $\mathcal{F}$ los ideales primos usados en cada paso. Asi obtenemos sucesivamente ternas de primos con soportes disjuntos. La proposicion 5.1.1 da las propiedades de cada curva, y el corolario 1.3.7 garantiza que son no isomorfas sobre K. □

5.3. Un ejemplo y el procedimiento para producir otros

El par $a = 6$, $b = 4 + 3\omega$ ya estudiado en la seccion 3.2 tiene factores de normas 19, 13 y 79. En este caso

$$t = -161 - 72\omega, \qquad P = (29 - 15\omega, 174 - 90\omega),$$

y la ecuacion es

$$y^2 = x^3 + 20737 + 18000\omega.$$

Por la proposicion 5.1.1, esta curva tiene torsion $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, rango 2 y está genuinamente definida sobre $\mathbb{Q}(\omega)$.

Para obtener otros ejemplos basta seguir estos pasos:

1. Elegir $U, V \in \mathbb{Z}[\omega]$, con $U \neq 0$, y poner $a = 6U$, $b = 4 + 3\omega + 6V$.
2. Comprobar que $b - a, b, b + a$ sean primos. En esta clase de congruencia basta comprobar que sus normas sean numeros primos: no pueden generar un primo inerte, pues el lema 1.3.7 excluye los ideales fijos por conjugacion.
3. Escribir $t = (b - a)b(b + a)$ y la curva $E_{a,b}$. El punto $T_0 = (0, t)$ genera la torsion, y $P, [\omega]P$ dan los dos puntos independientes indicados.
4. Para evitar repeticiones, registrar el conjunto $\{(b - a), (b), (b + a)\}$ y pedir que la nueva terna tenga algun ideal primo nuevo. Si queremos evitar todos los anteriores, usar las congruencias de la proposicion 4.2.2.

El descenso certifica el rango de cada ejemplo y Kai garantiza que la construccion puede continuar indefinidamente. No necesitamos ninguna de las conjeturas de la seccion **??**.

Bibliografía

[CZ16] Ajai Choudhry and Arman Shamsi Zargar, *A parametrised family of Mordell curves*, 2016.

[Duj26] Andrej Dujella, *History of elliptic curves rank records*, Tabla de récords de rango, 2026, Consultado el 22 de septiembre de 2026.

[EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.

[Elk07] Noam D. Elkies, *Three lectures on elliptic surfaces and curves of high rank*, 2007.

[Elk26] ———, *An elliptic K3 surface $X/\mathbb{Q}(t)$ with Mordell–Weil rank 17, I: Formulas for X and base changes of ranks 18 and 19*, 2026.

[Kai26] Wataru Kai, *Linear patterns of prime elements in number fields*, 2026, Se consulta la versión 5 de arXiv, de marzo de 2026.

[Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q-coefficients of modular forms*, Inventiones mathematicae **109** (1992), no. 2, 221–229.

[KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, Nagoya Mathematical Journal **109** (1988), 125–149.

[KP25] Peter Koymans and Carlo Pagano, *Hilbert's tenth problem via additive combinatorics*, 2025, Se consulta la versión 3 de arXiv, de noviembre de 2025.

[KS25] Anthony Kling and Ben Savoie, *A graph-theoretic approach to computing selmer groups of elliptic curves $y^2 = x^3 + bx$ over $\mathbb{Q}(i)$*, 2025, Versión 2, del 21 de junio de 2025.

[Lem00] Franz Lemmermeyer, *Reciprocity laws: From euler to eisenstein*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, Berlin, Heidelberg, 2000.

[Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, Publications Mathématiques de l'IHÉS **47** (1977), 33–186.

[MCB25] Leena Mondal, Amrutha Chalil, and Kalyan Banerjee, *Nagell–lutz theorem for imaginary quadratic fields and class groups of quadratic fields*, 2025.

[Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, Inventiones mathematicae **124** (1996), no. 1–3, 437–449.

[Naj10] Filip Najman, *Complete classification of torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Journal of Number Theory **130** (2010), no. 9, 1964–1968.

[Naj11] ———, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, Mathematical Journal of Okayama University **53** (2011), 75–82.

[PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, Journal of the European Mathematical Society **21** (2019), no. 9, 2859–2903.

[Rab10] F. Patrick Rabarison, *Structure de torsion des courbes elliptiques sur les corps quadratiques*, Acta Arithmetica **144** (2010), no. 1, 17–52.

[Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j-invariant 1728*, 2025.

[Shi90] Tetsuji Shioda, *On the Mordell–Weil lattices*, Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli **39** (1990), no. 2, 211–240.

[Sil94] Joseph H. Silverman, *Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 151, Springer, New York, 1994.

[Sil09] ———, *The arithmetic of elliptic curves*, 2 ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, Springer, New York, 2009.

[SS04] Edward F. Schaefer and Michael Stoll, *How to do a p-descent on an elliptic curve*, Transactions of the American Mathematical Society **356** (2004), no. 3, 1209–1231, Se consulta también la versión larga del 13 de junio de 2001.

[SS10] Matthias Schütt and Tetsuji Shioda, *Elliptic surfaces*, Advanced Studies in Pure Mathematics **60** (2010), 51–160.

[ST15] Joseph H. Silverman and John T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2 ed., Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, Cham, 2015.

[Sto06] Michael Stoll, *Descent on elliptic curves*, 2006.

[Sut23] Andrew V. Sutherland, *Isogeny kernels and division polynomials*, Notas del curso 18.783, MIT, lección 5, 2023, Sección 5.2: construcción de isogenias y fórmulas de Vélu.

[Zyw25a] David Zywina, *An elliptic surface with infinitely many fibers for which the rank does not jump.*

[Zyw25b] ———, *There are infinitely many elliptic curves over the rationals of rank 2*, 2025.

[Zyw26] ———, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.