

TÍTULO

PEDRO NICOLÁS PEÑA

SECCIÓN

Vamos a trabajar mucho con la curva $E_{t^2} : y^2 = x^3 + t^2$ porque tiene un punto de 3 torsión, permitiéndonos 3-descenso. Tiene grupo de torsión isomorfo a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sobre $\mathbb{Q}$ (porque no te queda otra) **ver sobre** $\mathbb{Q}(\omega)$. Si $t = \frac{r}{s}$ entonces queda isomorfa a $E_{rs} : y^2 = x^3 + r^2s^4$. Las curvas de la forma $y^2 = x^3 + d$ se llaman curvas de Mordell y hay mucha bibliografía sobre ellas.

Para un ejemplo de rango 3 ver <https://arxiv.org/pdf/1604.02693>.

La curva isógena:

La isogenia con kernel generado por $(0, t)$ nos da la curva $E' : y^2 = x^3 - 27t^2$

Los puntos de torsión:

El punto $P = (0, t)$ es de orden 3, y es el único sobre $\mathbb{Q}$. Sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ puede haber otro si el parametro t es cuatro veces un cubo.

Discriminante:

$$\Delta_{E_{t^2}} = -432t^4 = -2^4 3^3 t^4$$

j-invariante:

0

Notas para seguir el texto de Cohen y Pazuki:

Antes que nada no olvidar que las curvas que estamos viendo son isomorfas a su dual sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$

Su b es nuestro t^2 y $b = b_1 b_3^3$ con b_1 libre de cubos

α va a ser nuestro mapa que toma puntos de la curva y nos da elementos de $K^*/(K^*)^3$ con $\alpha(\mathcal{O}) = 1$, $\alpha((0, t)) = 1/(2t^2)$ y $\alpha((x, y)) = y - t^2$.

$\hat{\alpha}$ va a ser lo mismo desde la isógena, y nos queda $\hat{\alpha}(\mathcal{O}) = 1$, $\hat{\alpha}((0, -t)) = 1/(54t^2)$ y $\hat{\alpha}((x, y)) = y + 27t^2$.

La joda teórica es $\text{Ker}(\alpha) = \text{im}(\hat{\phi})$. También $|\text{Im}(\alpha)| |\text{Im}(\hat{\alpha})| = 3^{r+1}$. El corolario es

$$\frac{E(\mathbb{Q})}{\hat{\phi}(E'(\mathbb{Q}))} \simeq \text{Im}(\alpha)$$

Para $\mathbb{Q}$ vale lo siguiente: $\bar{u} \in \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ esta en la imagen de α si y solo si tiene un repr en $u \in \mathbb{Q}$ tal que la siguiente tiene solución no trivial en $\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Q}$, es lo mismo):

$$uX^3 + (1/u)Y^3 + 2bZ^3 - 2aXYZ = 0$$

Y eso se puede simplificar: para una solución tomá $u = u_1^2 u_2$ (troll) todo libre de cuadrados y $u_1 \perp u_2$, y entonces $u_1 u_2 | 2b$ y la solubilidad es equiv a la de:

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 + (2b/(u_1 u_2)) Z^3 - 2aXYZ = 0$$

Osea para las que tenemos (esto es en $\mathbb{Q}$ no olvidar):

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 + (2t^2/(u_1 u_2)) Z^3 = 0$$

$$u_1 X^3 + u_2 Y^3 - (54t^2/(u_1 u_2)) Z^3 = 0$$

Obvio para los casos de $\mathcal{O}$ y los puntos de torsión tenemos soluciones y son:

$$\alpha(\mathcal{O}) = 1 = u \implies (X, Y, Z) = (1, -1, 0)$$

$$\alpha((0, t)) = 1/2t = u \implies (X, Y, Z) = (0, 1, -1)$$

Y el caso $y - t^2 = uz^3$ tiene solución $(X, Y, Z) = (z^2, -x, z)$

Dada una solución podemos buscar el punto del que venía.

Selmer:

Como ver $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})^\times / (\mathbb{Q}(\sqrt{-3})^\times)^3$:

Note that since we are working over $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$, $p = 3$ is the only ramified prime. If $p \equiv 2 \pmod{3}$, then p is an inert prime. And if $p \equiv 1 \pmod{3}$, then p is a split prime

Puntos libres:

<https://personal.math.ubc.ca/~bennett/BeGa-data.html>

Proposición 1. *Para una curva elíptica definida sobre K , una extensión cuadrática $L = K(\sqrt{D})$ y el twist E_D vale*

$$rg(E(L)) = rg(E(K)) + rg(E_D(K))$$

Que se sabe:

Hay infinitas curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ sobre todo cuerpo de números. Las da Zywinia en [?] que todas tienen full 2-torsion (generada por $(0, 0)$) (obvio puedes matarla y tenes de torsion trivial) con $\text{III}[2] = 0$ (falta leer un poco mas de ese). Todo vino de una secuencia de papers: [?], [?] y [?]. Usa numeros de Tamagawa para calcular los simbolos de Kodaira y el global root number porque (la conjetura de paridad dice que) te da la paridad del rango, y estas cosas te dan restricciones sobre las especializaciones.

De Elkies hay curvas con rango alto, todas sobre $\mathbb{Q}$, y ordenadas por grupo de torsion: Para el trivial el record es 29 y está en un post random, y para varios grupos $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ para $n \in \{2, 3, 4, 6, 7\}$ hay un paper: [?]. Lo hace con superficies K3.