

HW3

方科晨

2024 年 3 月 22 日

Problem1.

(a) 要最小化 $\|Ax - b\|_\infty = \max_i (Ax - b)_i$, 则有线性规划如下:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c \\ & \text{subject to} && Ax - b \leq c \cdot e \end{aligned}$$

其中 e 为全 1 向量。由于要最小化 c , 则限制条件中必有一维取等号, 此时 $c = \|Ax - b\|_\infty$, 故两者等价。

(b) 要最小化 $\|Ax - b\|_1 = \sum_i |Ax - b|_i$ 。我们有如下的线性规划:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_i (y_i + z_i) \\ & \text{subject to} && Ax - b = y - z \\ & && y \geq 0 \\ & && z \geq 0 \end{aligned}$$

不难发现这对于每一维来说 y_i, z_i 都是独立的。对于每一维 i 来说, 有 $(Ax - b)_i = y_i - z_i$, 假设 $y_i > 0, z_i > 0$, 则存在一个 $0 < a \leq \min(y_i, z_i)$ 使得 $y_i - a \geq 0, z_i - a \geq 0, (Ax - b)_i = (y_i - a) - (z_i - a)$ 满足限制条件, 而且同时有 $(y_i - a) + (z_i - a) < y_i + z_i$, 这样肯定不是最优解。故对于每一维 i , 都有 $y_i = 0, z_i = 0$ 中的一个成立, 则只有两种情况 $y_i = 0, z_i = -(Ax - b)_i = |Ax - b|_i \geq 0$ 或者 $y_i = (Ax - b)_i = |Ax - b|_i \geq 0, z_i = 0$, 则

$y_i + z_i = |Ax - b|_i$ 。那么 $\sum_i (y_i + z_i)$ 正是我们要求的 $\|Ax - b\|_1$ ，故两问题等价。

(c) 我们有以下线性规划问题：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_i (y_i + z_i) \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x = y - z \\ & && y \geq 0 \\ & && z \geq 0 \end{aligned}$$

等价性的证明同理于 (b)。

Problem2.

(a) 令 $|x| = x_1 - x_2, |y| = x_3 - x_4$ ，转化后有如下标准型：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_6 \end{pmatrix}, c = (1, 1, 1, 1, 0, 0), A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

$$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(b) 令 $x = x_1, y = x_2 - x_3, z = x_4$ ，转化后有如下标准型：

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_8 \end{pmatrix}$, $c = (3, -2, 2, 1, 0, 0, 0, 0)$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$b = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$

Problem3.

(a) 如下图




图 1:

(b) 转化为如下标准型:

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{其中, } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_6 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 9 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(c) 由 (a) 中的图可以看出 extreme point 有

$$(x_1, x_2) = (0, 0), (4, 0), (4, 2.5), (3, 3), (0.5, 3), (0, 2.5)$$

(d) 最优解为 $(x_1, x_2) = (4, 2.5)$, 取到的最优值为 24.5

Problem4.

(a) 由于 $e^T x = 1 \Leftrightarrow \sum_i x_i = 1$, 因此 $c^T x = \sum_i c_i x_i \geq \sum_i (\min_i c_i) x_i = \min_i c_i \sum_i x_i = \min_i c_i$ 。令 $k = \arg \min_i c_i$ (有多个则任取一), 则 $x_k = 1, x_i = 0, \forall i \neq k$ 时可以取到极值。

若限制改为 $e^T x \leq 1$, 则有 $c^T x \geq \sum_i (\min_i c_i) x_i = \min_i c_i \sum_i x_i$ 。又由于有 $0 \leq \sum_i x_i \leq 1$, 故当 $\min_i c_i \geq 0$ 时, 有 $c^T x \geq \min_i c_i \sum_i x_i \geq 0$, 当 $x_i = 0, \forall i$ 时取到等号。当 $\min_i c_i < 0$ 时, 则有 $c^T x \geq \min_i c_i \sum_i x_i \geq \min_i c_i$, 令 $k = \arg \min_i c_i$ (有多个则任取一), 当 $x_k = 1, x_i = 0, \forall i \neq k$ 时可以取到极值。

(b) 当 β 是 0 到 n 之间的整数时, 不妨令 $c^T = (c_1, \dots, c_n)$ 且 $c_{(1)}, \dots, c_{(n)}$ 为 c_i 从小到大排序后的值。那么有 $c^T x \leq \sum_{i=1}^{\beta} c_{(i)}$ 。当排序后 c_i 的下标小于等于 β 时 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$

若限制改为 β 不是整数。则有 $c^T x \leq \sum_{i=1}^{[\beta]} c_{(i)} + \{\beta\} c_{[\beta]+1}$ 。当排序后 c_i 的下标小于等于 $[\beta]$ 时 $x_i = 1$, 当 c_i 排序后下标为 $[\beta] + 1$ 时 $x_i = \{\beta\}$, 否则 $x_i = 0$

若限制改为 $e^T x \leq \beta$, 那么有 $c^T x \leq \sum_{i=1}^{\beta} \min(c_{(i)}, 0)$ 。当 $c_i < 0$ 且排序后 c_i 的下标小于等于 β 时 $x_i = 1$, 否则 $x_i = 0$

Problem5.

由 $Ax \leq b$ 可转化成 $Ax + s = b$, 则原来的条件 $Ax \leq b, Cx = d$ 可转化为如下形式:

$$\begin{pmatrix} A & I_4 \\ C & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

其中 $\begin{pmatrix} A & I_4 \\ C & 0 \end{pmatrix}$ 为 5×8 的矩阵, 秩为 5 。选取 $s_2 = s_3 = s_4 = 0$, 可解得 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = s_1 = 1$ 为一个 feasible solution。故 $x^* = (1; 1; 1; 1)$ 为一个 extreme point。

Problem6.

线性规划为标准型, 其中有 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & -1 & 0 & \beta \\ 0 & 0 & 2 & 1 & \gamma \end{pmatrix}$, 不难发现该矩阵

行满秩。故存在最优的基解。

Problem7.

(a) 其中 (1) 等价于 $Ax > 0$, 可以转化成 $-Ax + \alpha e \leq 0, \alpha > 0$, 由 Farkas's Lemma, 有如下的 alternative system: $(A \ e)^T y = (0 \ 1)^T, y \geq 0$, 等价于 $A^T y = 0, y > 0$ 。故得证。

(b) 考虑如下两个线性规划:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

以及：

$$\begin{aligned} & \text{maximize} \quad b^T y \\ & \text{subject to} \quad A^T y \leq x \end{aligned}$$

这两个线性规划互为对偶，并且如果两者都有最优解 x^*, y^* ，则存在 $c^T x^* = b^T y^*$ ，符合条件 $c^T x - b^T y \leq 0$ 。故该条件即等价于上面两个线性规划都有最优解。对于这两个线性规划的 alternative system: $A^T w \leq 0, b^T w > 0, A^T z = 0, z \geq 0, c^T w < 0$ ，如果题设条件成立，则两个规划均有解，则此条件不成立；如果此条件成立，则两个规划均无解，题设条件不成立，故为 alternative system。

Problem8.

使用 cvx 求得三个函数为 $f_{ls}(x) = 0.5755x + 4.1841, f_{l_1} = 0.9716x + 4.9459, f_{l_\infty} = -0.5249x + 3.9335$ 对应的三个图像依次如下：可以发现对于整体的趋势来说， l_1 -norm 拟合得最好； l_2 -norm 倾向于体现整体的趋势，但由于离群值带来的偏差是平方级别的，所以也会显示出部分离群值带来的影响；而 l_∞ -norm 由于是取 max，显著得受到离群值的影响。




图 2: $f_{ls}(x)$




图 3: f_{l_1}




图 4: f_{l_∞}