




BỆNH PHẤN TRẮNG – NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ

Ngày 22 tháng 10 năm 2024

Bệnh Phấn Trắng – Nguyên Nhân, Triệu Chứng và Cách Phòng Trừ

1. Giới thiệu về bệnh phấn trắng



Bệnh phấn trắng là một trong những bệnh hại phổ biến trên cây trồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và năng suất của nhiều loại cây trồng khác nhau, bao gồm rau màu, hoa màu, cây ăn trái, và cây công nghiệp. Bệnh do một nhóm nấm thuộc chi *Erysiphe* và *Oidium* gây ra, với đặc điểm dễ nhận biết là lớp phấn trắng xuất hiện trên bề mặt lá, thân hoặc quả của cây trồng.

Bệnh phấn trắng không chỉ gây giảm năng suất mà còn làm giảm chất lượng nông sản, gây tổn thất kinh tế lớn cho nông dân và nhà sản xuất. Việc hiểu rõ nguyên nhân và cách phòng trừ bệnh phấn trắng là rất quan trọng để bảo vệ cây trồng khỏi tác động của bệnh.

2. Triệu chứng bệnh phấn trắng




Tìm

Thể Loại

Bệnh Hại

Bài viết cùng chủ đề



BMC – Tiên Phong Sản Xuất Thuốc BVTV Dạng CS (Capsule Suspension) Tại Việt Nam

Xem Thêm





Triệu chứng đặc trưng của bệnh phấn trắng dễ nhận biết thông qua các dấu hiệu sau:

Trên lá: Ban đầu, các đốm phấn trắng nhỏ li ti xuất hiện trên bề mặt lá, thường ở mặt dưới lá, sau đó lan rộng dần ra toàn bộ lá. Các đốm phấn trắng này tạo thành một lớp bột mỏng, trông giống như bụi phấn. Khi bệnh nặng, lá cây sẽ bị vàng, héo và rụng sớm, làm giảm khả năng quang hợp của cây.

Trên thân và cành: Nấm bệnh cũng có thể tấn công thân và cành cây, tạo ra các vết phấn trắng, làm cho cây phát triển yếu ớt, dễ bị gãy đổ và suy yếu tổng thể.

Trên quả: Bệnh phấn trắng có thể xuất hiện trên bề mặt quả non, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của quả. Quả bị bệnh thường không phát triển bình thường, bị méo mó, nứt nẻ, giảm chất lượng thương phẩm.

Các triệu chứng bệnh phấn trắng thường xuất hiện rõ nhất vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khi thời tiết ẩm áp và ẩm ướt. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của nấm gây bệnh.

3. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh phấn trắng



Bệnh phấn trắng do nhiều loài nấm gây ra, phổ biến nhất là nấm *Erysiphe*, *Oidium*, và *Sphaerotheca*. Các loài nấm này phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ẩm áp, ẩm ướt và ít gió. Một số yếu tố chính làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh phấn trắng bao gồm:

Điều kiện thời tiết: Bệnh phấn trắng phát triển mạnh trong điều kiện nhiệt độ từ 15-25°C, độ ẩm không khí cao và có sương mù hoặc mưa phùn. Thời tiết mát mẻ vào ban đêm và khô ráo vào ban ngày cũng tạo điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển.

Mật độ cây trồng dày: Khi cây trồng được trồng với mật độ quá dày, không khí không lưu thông tốt, tạo điều kiện cho nấm phát triển và lây lan. Các cây trồng gần nhau dễ bị bệnh tấn công hơn so với cây trồng ở nơi thông thoáng.

Giống cây nhạy cảm: Một số giống cây trồng có khả năng kháng bệnh yếu, dễ bị tấn công bởi bệnh phấn trắng, nhất là các giống cây trồng có lá dày, mỏng nước.

Chăm sóc cây trồng không đúng cách: Thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là kali và canxi, cũng làm cho cây yếu ớt và dễ bị nhiễm bệnh hơn. Việc bón phân không cân đối, sử dụng quá nhiều phân đạm cũng góp phần làm tăng nguy cơ bệnh.

4. Tác hại của bệnh phấn trắng



Bệnh phấn trắng có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho cây trồng và nông nghiệp, bao gồm:

Giảm năng suất: Khi cây bị bệnh phấn trắng, khả năng quang hợp của lá bị giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến sự suy yếu toàn bộ cây trồng. Cây không thể phát triển mạnh mẽ và cho ra năng suất thấp hơn so với bình thường.

Giảm chất lượng nông sản: Quả bị bệnh phấn trắng thường nhỏ, méo mó, không đạt chất lượng thương phẩm, giảm giá trị kinh tế khi bán ra thị trường.

Tăng chi phí sản xuất: Để kiểm soát bệnh phấn trắng, nông dân phải tốn nhiều chi phí cho thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp chăm sóc cây trồng, làm tăng chi phí sản xuất.

Thiệt hại kinh tế: Bệnh phấn trắng nếu không được kiểm soát kịp thời có thể gây mất mùa, thiệt hại lớn cho nông dân và các nhà sản xuất, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập và an ninh lương thực.

5. Biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng

Phòng trừ bệnh phấn trắng đòi hỏi sự kết hợp của các biện pháp canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và quản lý dinh dưỡng hợp lý. Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ hiệu quả:





5.1. Sử dụng giống kháng bệnh

Sử dụng giống cây trồng có khả năng kháng bệnh tốt là một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa bệnh phấn trắng. Các viện nghiên cứu nông nghiệp đã và đang phát triển nhiều giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt với bệnh này, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh.

5.2. Quản lý điều kiện trồng trọt

Mật độ trồng hợp lý: Nên trồng cây với khoảng cách hợp lý để tạo điều kiện thông thoáng, giúp không khí lưu thông tốt hơn và hạn chế sự phát triển của nấm gây bệnh.

Tưới nước đúng cách: Hạn chế tưới nước quá nhiều vào chiều tối để tránh việc cây trồng bị ẩm ướt quá mức, tạo môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Tưới nước vào buổi sáng sớm sẽ giúp cây khô nhanh hơn.

5.3. Quản lý dinh dưỡng

Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho cây trồng là biện pháp quan trọng giúp cây phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với bệnh tật. Đặc biệt, cần bón đầy đủ kali và canxi, hai yếu tố quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng của cây.

5.4. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Trong trường hợp bệnh phấn trắng đã xuất hiện trên cây trồng, cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát sự phát triển của nấm. Các loại thuốc gốc lưu huỳnh, đồng hoặc các thuốc trừ nấm sinh học thường được sử dụng hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh phấn trắng. Tuy nhiên, cần tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, và đúng cách) để đạt hiệu quả cao và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Một số loại có chứa thành phần **Sulfur, Tebuconazole** như: **BACCA 80WG, Gone Super 350EC** có thể trị hiệu quả bệnh phấn trắng trên cây trồng, và thân thiện với môi trường

5.5. Biện pháp canh tác



Luân canh cây trồng: Thực hiện luân canh cây trồng giữa các mùa vụ giúp hạn chế sự tích lũy của nấm gây bệnh trên đất và cây trồng.

Vệ sinh đồng ruộng: Cần thường xuyên vệ sinh, thu gom và tiêu hủy các bộ phận cây bị bệnh để ngăn chặn nguồn bệnh lây lan. Sau khi thu hoạch, nên cây xới và phơi đất để tiêu diệt mầm bệnh còn sót lại.

6. Kết luận

Bệnh phấn trắng là một trong những bệnh hại phổ biến và nguy hiểm đối với nhiều loại cây trồng. Sự xuất hiện của bệnh gây thiệt hại lớn đến năng suất và chất lượng nông sản, đồng thời làm tăng chi phí sản xuất cho nông dân. Tuy nhiên, với các biện pháp phòng ngừa và quản lý hợp lý, nông dân hoàn toàn có thể kiểm soát được bệnh phấn trắng, bảo vệ cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Việc kết hợp sử dụng giống kháng bệnh, quản lý tốt dinh dưỡng và môi trường trồng trọt, cùng với áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật đúng cách, sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do bệnh phấn trắng gây ra và bảo vệ nguồn lợi kinh tế cho người trồng trọt.

Đăng

Bình luận

Những bình luận mới nhất

Liên Hệ

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM. Lô MB1-2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

☎ (HR) 0272 3777 861

☎ (Kinh Doanh) 02723 778 061

☎ (Vật Tư) 0272 3779 162

✉ nv.hcns@bmcgroup.com.vn

✉ bmchcm@gmail.com

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VINH PHÚC. Cụm KTXH xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

☎ 0211 3779 985



Công Ty

> Giới Thiệu

> Thông Báo

> Sản Phẩm

> Cơ Hội Việc Làm

Bản Đồ