


[Danh mục cây trồng](#)

[Côn trùng hại cây trồng](#)

[Bệnh hại cây trồng](#)
[Trang chủ](#) > [Côn trùng hại cây trồng](#) > [Sâu, sâu bướm](#) >

Sâu vẽ bùa

57,157

[Liên hệ QC: ☎ 0336.180068](#)

Cây trồng bị hại: [Cây bưởi](#) , [Cây cam](#) , [Cây quất cảnh \(tắc\)](#) , [Cây Phật thủ](#) , [Cây măng cụt](#) , [Cây chanh](#)

Xem chủ đề liên quan: [Sâu vẽ bùa](#) , [Phyllocnistic citrella](#)

[Biệt thự FLC Sầm Sơn](#)



Tên khoa học: Phyllocnistic citrella

Họ: Gracillariidae

Bộ: Lepidoptera

Đặc điểm hình thái sâu vẽ bùa Phyllocnistic citrella:

Trưởng thành sâu vẽ bùa là một loại ngài nhỏ, cơ thể dài 2-3 mm, sải cánh rộng 4-5 mm. Toàn thân có màu vàng nhạt phát ánh bạc. Cánh sau rất hẹp so với cánh trước, cả hai cánh đều có rìa lông dài.

Trứng có dạng hình bầu dục, nhỏ, kích thước 0,2-0,3 mm. Lúc đầu trong suốt sắp nở có màu trắng vàng.

Sâu non đầy sức dài 4 mm, mình đẹp, không chân, đốt cuối bụng có hình ống dài.

Nhộng dài khoảng 2-3 mm, màu nâu vàng, cạnh bên mỗi đốt thân có 1 u lồi, trên có 1 sợi lông.



Cây trồng được quan tâm



Cây đào
(Peach tree)



Cây mai chiếu thủy
(Water Jasmine/Wrightia religiosa Hook.f)



Cây thường sơn
(Dichroa febrifuga Lour.)



Cây hoa hồng
(Rosa sp)



Cây nhãn
(Dimocarpus longan)


Tiêu điểm



**[Ad.] COMBO COMBI
05: Biến vàng thành
xanh**

COMBO COMBI 05 – Bộ vi lượng giúp biến vàng thành xanh, phục hồi nhanh lá vàng,

* Đặc điểm sinh học và sinh thái



* Vòng đời: 19-38 ngày

- Trứng: 1-6 ngày
- Sâu non: 4-10 ngày
- Nhộng: 7-12 ngày
- Trưởng thành: 7-10 ngày

Tập tính và khả năng gây hại của sâu vẽ bùa *Phyllocnistis citrella*:

Bướm hoạt động về ban đêm, thường đẻ trứng ở mặt dưới lá gần gân chính của các đọt non mới mọc. Một trưởng thành sâu vẽ bùa thường đẻ được 70-80 quả trứng, thời gian đẻ trứng từ 2-10 ngày. Sâu non mới nở thường đục chui qua lớp biểu bì của lá để ăn phần nhu mô của lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo dưới lớp biểu bì, phía sau là đường phân thải ra của sâu như sợi chỉ, lớp biểu bì có thể bị bong ra hoặc trông giống như nhầy ốc sên. Đường đục của sâu vẽ bùa dài và lớn dần theo sức lớn của sâu. Khi đầy sức, sâu non đục ra mép lá, hoá nhộng tại mép lá gần gân lá, chỗ lá bị quấn bằng cách dùng tơ gấp lại che tổ kén.



tăng diệp lục, quang hợp và sức sống cho cây trồng.



[Adl.] COMBO T-ROOT kích rễ toàn diện - phục hồi cây yếu, thúc rễ cực mạnh



[Adl.] Sử dụng kết hợp đạm Ure và Atonik đậm đặc - 'Công thức vàng' trong sử dụng phân bón



[Adl.] Những tác dụng và tính năng nổi bật khi sử dụng Cytokinin DA6 trên cây trồng



[Adl.] Làm cách nào để ngăn chặn lộc, đọt non trên cây trồng?



[Adl.] Hướng dẫn kích thích hoa ly nở và kìm hãm hoa cúc nở vào đúng

dịp Tết



[Adl.] Làm cách nào để cây hoa cúc phát triển nhanh và nở hoa đúng thời điểm?

Được xem nhiều



Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrosis medinalis)



Sâu đục thân bướm 2 chấm (Scirpophaga incertulas Walker)



Nhện đỏ (Tetranychus sp.)



Triệu chứng gây hại của sâu vẽ bùa trên lá quýt (tắc) cảnh



Triệu chứng gây hại trên cành lá và trái



Sâu vẽ bùa hại măng cụt

Khi sâu gây hại, lá nhỏ, dị dạng ảnh hưởng đến sự phát triển của chồi non. Hoa và trái có thể bị rụng khi cây bị gây hại nặng. Ở giai đoạn cây con nếu bị gây hại thường xuyên cây sẽ kém phát triển và có tán nhỏ hơn bình thường. Sâu vẽ bùa là môi giới truyền bệnh loét trên cam quýt. Sâu vẽ bùa gây hại quanh năm, tập trung nhiều vào các đợt ra đợt non trong mùa khô. Sâu gây hại trên các loại cây thuộc họ cam quýt.

Điều kiện gây hại của sâu vẽ bùa *Phyllocnistic citrella*:

Sâu vẽ bùa *Phyllocnistic citrella* gây hại quanh



Rầy mềm, rầy nhót, rầy mật, rệp bông
(*Gossypii glover*)



Sâu vẽ bùa
(*Phyllocnistic citrella*)

Thích trang để theo dõi trên
Facebook

năm, mức độ gây hại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và thức ăn của sâu. Nhiệt độ thích hợp cho sâu vẽ bùa phát sinh gây hại là 23 - 29⁰C, ẩm độ 85-90%.

Biện pháp quản lý sâu vẽ bùa *Phyllocnistis citrella*:

- Biện pháp canh tác:

+ Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa cành, tạo tán, bón thúc cho lộc non ra tập trung, hạn chế sự phá hại của sâu. Thu dọn lá rụng trong vườn đốt bỏ cũng hạn chế nguồn sâu.

+ Thường xuyên theo dõi quan sát, để bảo vệ các đọt non vào các giai đoạn cao điểm phát triển của sâu. Trường hợp bị hại nặng thì có thể cắt bỏ các chồi lá bị sâu đem tập trung một chỗ để tiêu diệt.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng một số thiên địch như:

+ Thiên địch ký sinh: Có nhiều loài ong trong các họ Chalcidoidea và Ichneumonidea ký sinh trên sâu non và nhộng, đôi khi tỉ lệ ký sinh có thể lên đến 70-80%.

+ Thiên địch bắt mồi: Nhân nuôi thiên địch kiến vàng *Oecophylla smaragdina* là biện pháp có hiệu quả phòng trị sâu vẽ bùa cao

- Biện pháp hoá học: Khi mật số sâu quá cao, có thể dùng các loại thuốc nội hấp để phun hay các hỗn hợp sử dụng thuốc BVTV hợp lý để bảo vệ nguồn thiên địch của sâu vẽ bùa trong tự nhiên, khi mật độ gây hại cao, sử dụng luân phiên một số thuốc gốc như: (Chlorantraniliprole + Abamectin), Imidacloprid (Confidor 100SL; ...), Cypermethrin (Viserin 4.5EC;...) Abamectin (Vibamec 1.8EC, 3.6EC;...), Polytrin, Selecron, dầu khoáng SK99, DC-Tron Plus, Confidor,... có thể phối hợp dầu khoáng với thuốc sâu để tăng hiệu quả phòng trừ để phòng trị.

[Villa FLC Sầm Sơn](#)



Bài viết liên quan



Kỹ thuật trồng bưởi đỏ Phúc Kiến hiệu quả kinh tế cao



Quy trình kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam



Kỹ thuật trồng cây chanh theo tiêu chuẩn VietGAP



Kỹ thuật trồng mướp sai trĩu giàn



Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cam sành cho quả sai trĩu, năng suất cao



Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây có múi

Xem thêm



Bọ vòi voi hại chuối (*Cosmopolites sordidus*)



Đặc điểm gây hại của sâu đục thân trên cây mít (*Batocera rufomaculata*)



Sâu đục thân phi lao (*Zeuzera casuarina*)



Sâu ăn lá quế (Phalera flavesceus)



Sâu lông gây hại trên cây roi



Sâu ăn lá mận (roi) (Grapholita molesta)



Trang chủ



Cây trồng phong
thủy



Cây CN dài ngày



Cây CN ngắn ngày



Cây lương thực



Cây rau màu



Cây ăn quả (trái)



Cây cảnh, hoa cảnh



Cây thuốc (dược liệu)



Cây lâm nghiệp



Côn trùng hại cây
trồng



Bệnh hại cây trồng



Dinh dưỡng cây
trồng



Cẩm nang phân bón



Trồng trọt, chăm sóc



Khoa học nông
nghiệp



Sức khỏe và làm đẹp



Ad by CNCT



Trang chủ . Facebook . Liên hệ quảng cáo:

☎ 0336.180068 .

Copyright © 2016

www.camnangcaytrong.com

