



TIN TỨC, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG, CÔN TRÙNG HẠI CÂY TRỒNG, TIN TỨC - BÀI VIẾT

## Cách phòng trừ sâu vẽ bùa hại cây hiệu quả

### Kích thước chữ

MẶC ĐỊNH

VỪA

LỚN

**Sâu vẽ bùa hại cây** đang trở thành mối đe dọa lớn cho các vườn cây ăn quả, đặc biệt là họ cam quýt. Loài côn trùng này tạo ra những đường hầm kỳ lạ trên lá, dẫn đến cây suy kiệt và dễ mắc bệnh. Nông nghiệp SOFa mang đến hướng dẫn toàn diện để bà con nhận diện và kiểm soát hiệu quả.

### NỘI DUNG CHÍNH



1. Sâu vẽ bùa hại cây là gì?
2. Đặc điểm hình thái và vòng đời sâu vẽ bùa
3. Dấu hiệu nhận biết và tác hại
4. Điều kiện phát sinh sâu vẽ bùa
5. Biện pháp phòng trừ sâu vẽ bùa hiệu quả
  - 5.1. Biện pháp canh tác
  - 5.2. Biện pháp sinh học
  - 5.3. Biện pháp hóa học (khi mật độ cao)
6. Kết luận



## Sâu vẽ bùa hại cây là gì?

Sâu vẽ bùa, hay còn gọi là **Phyllocnistis citrella** theo tên khoa học, là một loài côn trùng thuộc họ Gracillariidae. Chúng được đặt tên dân gian như vậy vì sâu non đào những đường hầm uốn éo, trông giống như nét vẽ bùa chú trên mặt lá. Loài này thường tấn công các cây họ cam như cam, quýt, chanh, bưởi, và đôi khi lan sang cây họ đậu như đậu xanh hoặc đậu nành, gây thiệt hại kinh tế đáng kể ở các vùng trồng trọt nhiệt đới.





Hình ảnh sâu vẽ bùa

## Đặc điểm hình thái và vòng đời sâu vẽ bùa

Đặc điểm của sâu vẽ bùa có vòng đời ngắn, khoảng 2-3 tuần, với bốn giai đoạn chính: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.

- **Trứng:** Rất nhỏ, hình bầu dục, màu trắng đục, thường được đẻ riêng lẻ trên mặt dưới lá non hoặc chồi mới.
- **Ấu trùng (sâu non):** Giai đoạn gây hại chính, ấu trùng trong suốt, dài khoảng 3mm, đào hầm vào lớp biểu bì lá, tạo đường ngoằn ngoèo chứa đầy phân.
- **Nhộng:** Hóa nhộng trong kén mỏng, cuộn mép lá hoặc ở rìa đường hầm.
- **Trưởng thành:** Là ngài nhỏ, cánh rộng 4-5mm, màu trắng bạc với viền nâu, hoạt động chủ yếu vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn để tránh kẻ thù.

Theo các nghiên cứu từ Đại học Florida và CABI, vòng đời này có thể lặp lại nhiều thế hệ trong năm, tùy thuộc vào khí hậu.

Các giai đoạn phát triển của sâu vẽ bùa (*Phyllocnistis citrella*)

## Dấu hiệu nhận biết và tác hại

Dấu hiệu dễ thấy nhất là **hình ảnh sâu vẽ bùa** với các đường hầm bạc trắng, uốn lượn trên lá non. Lá bị tấn công thường cuộn lại, biến dạng, làm giảm diện tích quang hợp lên đến 50%. Hơn nữa, các vết thương này mở cửa cho vi khuẩn gây bệnh loét vỏ như *Xanthomonas citri* xâm nhập, dẫn đến lá rụng sớm và cây yếu ớt.

Tác hại lâu dài bao gồm cây chậm lớn, giảm năng suất quả 20-30%, và chất lượng trái kém hơn, đặc biệt ở các vườn cây trẻ. Ở Việt Nam, loài này gây thiệt hại nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung, theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp.

*Tác hại lâu dài của sâu vẽ bùa: lá rụng, cây yếu, năng suất giảm*

## Điều kiện phát sinh sâu vẽ bùa

Sâu vẽ bùa phát triển mạnh ở nhiệt độ 23–29 °C, kết hợp với độ ẩm cao và mưa kéo dài, tạo môi trường lý tưởng cho trứng nở. Chúng sinh sản quanh năm ở khí hậu nhiệt đới, nhưng bùng phát mạnh vào mùa xuân và thu, khi cây ra đợt lộc mới. Mật độ sâu thường tăng cao ở những vườn cây dày đặc, thiếu thông gió.

## Biện pháp phòng trừ sâu vẽ bùa hiệu quả

### Biện pháp canh tác

- **Tỉa cành định kỳ:** Tạo tán cây thoáng đãng, giảm ẩm ướt và hạn chế nơi trú ngụ của sâu.
- **Thu gom lá bệnh:** Thu nhặt và đốt bỏ lá bị hại để cắt đứt vòng đời sâu.
- **Chăm sóc dinh dưỡng:** Bón phân cân đối, tăng kali để cây tăng sức đề kháng tự nhiên.

## Biện pháp sinh học

- **Khuyến khích thiên địch:** Bảo vệ ong ký sinh như *Ageniaspis citricola* và kiến vàng, có thể tiêu diệt đến 70% ấu trùng theo nghiên cứu từ Nhật Bản.
- **Sử dụng vi sinh vật:** Áp dụng *Bacillus thuringiensis* (Bt), nấm *Metarhizium anisopliae* (nấm xanh) hoặc *Beauveria bassiana* (nấm trắng) để kiểm soát an toàn.
- **Chế phẩm tự nhiên:** Tinh dầu neem hoặc abamectin từ nguồn sinh học, hiệu quả cao mà không hại môi trường.

“ **Bà con tham khảo một số dòng thuốc sâu sinh học hãy *BẤM VÀO ĐÂY*.** ”

Thuốc trừ sâu sinh học Bamebe phòng trị hiệu quả sâu vẽ bùa trên cây

## Biện pháp hóa học (khi mật độ cao)

Chỉ dùng khi sâu bùng phát mạnh, ưu tiên **thuốc sâu vẽ bùa** chọn lọc như imidacloprid, cyromazine, spinetoram hoặc radiant. Phun vào giai đoạn ấu trùng mới nở để đạt hiệu quả tối đa, tránh phun lúc ong hoạt động. Luôn tuân thủ “4 đúng”: đúng loại thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng kỹ thuật để giảm kháng thuốc và ô nhiễm.

## Kết luận

Để đối phó với **sâu vẽ bùa hại cây**, bà con cần kết hợp đa dạng biện pháp, ưu tiên sinh học và canh tác bền vững. Bên cạnh đó, việc theo dõi thường xuyên sẽ giúp bảo vệ vườn cây hiệu quả, nâng cao năng suất. Nông nghiệp SOFa luôn đồng hành cùng bà con trong hành trình nông nghiệp xanh.



### TIN NỔI BẬT

11  
Th6

Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh thối trái sầu riêng



Giá thuốc trừ sâu sinh học Bamebe hiệu quả Top 1



Trị Rệp Sáp Trên Cây Cà Phê An Toàn Và Tiết Kiệm



Thuốc trừ sâu sinh học tốt nhất hiện nay trên thị trường



Dấu Hiệu Nhận Biết Nấm Phytophthora Trên Cây Sầu Riêng

## CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC SOFa

Nông nghiệp SOFa là đơn vị chuyên cung cấp chế phẩm sinh học hỗ trợ canh tác nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền vững. Với tiêu chí “xanh – sạch – hiệu quả”, SOFa giúp nông dân tăng năng suất, phòng trừ sâu bệnh tự nhiên và bảo vệ môi trường, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại và thân thiện.

- Tên quốc tế: SOFA BIOLOGY JOINT STOCK COMPANY
- Mã số thuế: **0317519147**

### ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH

- > Hướng dẫn đặt hàng
- > Chính sách đại lý
- > Chính sách bảo hành
- > Chính sách bảo mật

### THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn Phòng: 58 Thích Bửu Đăng, phường Hạnh Thông, TP.HCM

Hotline: 0984 340 493

Email: [cskh.nongnghiepsofa@gmail.com](mailto:cskh.nongnghiepsofa@gmail.com)

Website: [nongnghiepsofa.com](http://nongnghiepsofa.com)



Copyright 2026 © Bản quyền thuộc về SOFa