



Danh mục cây trồng



Côn trùng hại cây trồng



Bệnh hại cây trồng

[Trang chủ](#) > [Côn trùng hại cây trồng](#) > [Sâu, bọ, bọ cánh cứng](#) >

Sâu gai, bọ gai

👁 11,533

Liên hệ QC: ☎ 0336.180068

Cây trồng bị hại: [Cây lúa](#)

Xem chủ đề liên quan: [Sâu gai](#), [bọ gai](#), [Dicladispa armigera](#)

[Biệt thự FLC Sầm Sơn](#)



Tên khoa học: Dicladispa armigera

Họ: Chrysomelidae

Bộ: Coleoptera

Triệu chứng gây hại:



Sâu gai trưởng thành

Sâu non sâu gai



Cây trồng được quan tâm



Cây đào
(Peach tree)



Cây mai chiếu thủy
(Water Jasmine/Wrightia religiosa Hook.f)



Cây thường sơn
(Dichroa febrifuga Lour.)



Cây hoa hồng
(Rosa sp)



Cây nhãn
(Dimocarpus longan)

Tiêu điểm



**[Ad.] COMBO COMBI
05: Biến vàng thành
xanh**

COMBO COMBI 05 – Bộ vi lượng giúp biến vàng thành xanh, phục hồi nhanh lá vàng, tăng diệp lục, quang hợp và sức sống cho

Ruộng lúa bị sâu gai

Vết hại của sâu gai trên lá lúa

Sâu gai ăn phần diệp lục giữa hai lớp biểu bì tạo thành những đường hầm không đều nhau. Con trưởng thành ăn mặt trên phiến lá, để lại lớp biểu bì phía dưới. Khi bọ gai xuất hiện với mật số cao, lá lúa bị vàng khô, cây héo và chết. Sự thiệt hại bắt đầu từ chỗ đẻ trứng, gần chóp lá và lan dần xuống dưới phiến lá.

Đặc điểm hình thái:

- Trứng sâu gai thường được đẻ ở ngọn lá lúa.
- Sâu non mới nở màu vàng xám, cơ thể dẹt. Một đời sâu non có thể phá hại 123,4mm².
- Nhộng: là loại nhộng trần, có cơ thể dẹt, màu nâu. Giai đoạn nhộng thường hoàn thành trong đường đục của sâu non.
- Con trưởng thành: có cơ thể nhỏ, màu đen bóng, có nhiều gai

Đặc điểm sinh học, sinh thái và gây hại:

* **Vòng đời:** từ 18-26 ngày có:

- + Thời gian trứng: 4- 5 ngày.
- + Thời gian sâu non: 7-12 ngày.
- + Thời gian nhộng: 4-5 ngày.
- + Thời gian ngài vũ hóa đến đẻ trứng: con cái có thể sống 20 ngày, con đực sống khoảng 14 ngày.

* Đặc điểm sinh thái và gây hại:

Con trưởng thành thường xuất hiện vào sáng sớm và ẩn nấp ở phần thấp của cây lúa suốt ngày và phá hại mạnh vào buổi sáng. Con trưởng thành của sâu gai cũng ăn lá lúa, chúng ăn từ ngọn lá xuống phía dưới và thích ăn phần mô non hơn. Một con cái đẻ khoảng 55 quả trứng, trứng thường đẻ ở ngọn lá.

Số lúa sâu gai phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và

cây trồng.



mạnh

[Adl.] COMBO T-ROOT
kích rễ toàn diện - phục
hồi cây yếu, thúc rễ cực



trong sử dụng phân bón

[Adl.] Sử dụng kết hợp
đạm Ure và Atonik đậm
đặc - 'Công thức vàng'



cây trồng

[Adl.] Những tác dụng và
tính năng nổi bật khi sử
dụng Cytokinin DA6 trên



[Adl.] Làm cách nào để
ngăn chặn lộc, đợt non
trên cây trồng?



dịp Tết

[Adl.] Hướng dẫn kích
thích hoa ly nở và kìm
hãm hoa cúc nở vào đúng



thời điểm?

[Adl.] Làm cách nào để
cây hoa cúc phát triển
nhanh và nở hoa đúng

Được xem nhiều



Sâu cuốn lá nhỏ
(Cnaphalocrosis
medinalis)



Walker)

Sâu đục thân bướm 2
chấm
(Scirpophaga incertulas



Nhện đỏ
(Tetranychus sp.)

số lượng vụ lúa canh tác: 1 lúa vào tháng 2 trong vụ lúa xuân, 1 lúa vào tháng 4-5 trên cỏ, 1 lúa trên lúa cạn và 3 lúa còn lại phát sinh trên lúa mùa từ tháng 7-10. Con trưởng thành xuất hiện từ tháng 2 và tăng dần quần thể cho đến tháng 6-7 cùng với lúc sâu non gây hại nặng trên lúa non. Mật độ sâu non và trưởng thành bắt đầu giảm sau tháng 8.

Sâu non đục lá, ăn phần diệp lục giữa hai lớp biểu bì tạo thành những đường hầm không đều nhau. Con trưởng thành ăn mặt trên phiến lá, để lại lớp biểu bì phía dưới. Sâu gai phân bố ở khắp các vùng trồng lúa trong nước, đặc biệt những vùng trồng lúa năng suất cao.

Biện pháp phòng trừ:

- Vệ sinh đồng ruộng, diệt cỏ dại trong và xung quanh ruộng.
- Không cấy dày.
- Quan sát đồng ruộng và nhặt bỏ thành trùng, ấu trùng và trứng trên lá lúa khi mật số bọ gai còn ít.
- Dùng dây thừng nhúng vào dầu lửa và nước, mỗi thứ 1 phần bằng nhau, 2 người kéo trên tán lá lúa dọc theo ruộng.
- Sử dụng các loại thuốc hóa học thông thường: Regent 800WG, Padan 95SP hoặc Actara 25WG khi sâu phát sinh rộ.

Nguồn: Tổng hợp

[Villa FLC Sầm Sơn](#)



[Xem thêm](#)



Bọ cánh cứng hại dừa (Oryctes rhinoceros)



Rầy mềm, rầy nhót, rầy mật, rệp bông
(Gossypii glover)



Sâu vẽ bùa
(Phyllocnistis citrella)

Thích trang để theo dõi trên
Facebook



Bọ Cánh Cứng Nhật Bản (*Popillia japonica*)



Bọ cánh cứng khoai tây (Colorado)



Bọ xít đen (*Scotinophora lurida*)



Bọ nhảy (*Phyllotetra striolata*)



Sâu gặm vỏ (*Dihamus cervinus*)



Trang chủ



Cây trồng phong thủy



Cây CN dài ngày



Cây CN ngắn ngày



Cây lương thực



Cây rau màu



Cây ăn quả (trái)



Cây cảnh, hoa cảnh



Cây thuốc (dược liệu)



Cây lâm nghiệp



Côn trùng hại cây trồng



Bệnh hại cây trồng



Dinh dưỡng cây trồng



Cẩm nang phân bón



Trồng trọt, chăm sóc



Khoa học nông nghiệp



Sức khỏe và làm đẹp



Trang chủ . Facebook . Liên hệ quảng cáo:
☎ 0336.180068 .

Copyright © 2016
www.camnangcaytrong.com

