




Bệnh Tungro virus trên lúa

Đây là một trong 3 loại virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, do loại rầy xanh và rầy bông truyền bệnh. **Triệu chứng** Cây bị bệnh lá lúa sẽ biến đổi màu và hạt không dày. Sự biến đổi màu lá bắt đầu từ chóp và lan rộng ra phía mép, xuống phần thấp hơn của lá lúa. Các lá bị bệnh có các đốm hoặc các vạch và cây bị lùn. Cây giảm sự đẻ nhánh, làm chậm việc trổ bông và dẫn đến chậm trễ sự chín. Gié lúa nhỏ và không thoát hoàn toàn. Hầu hết các gié bị lép (khô) và có màu nâu tối.

Yếu tố phát triển bệnh Có sự hiện diện của nguồn virus và sự hiện diện của vec-to truyền bệnh. Tùy thuộc vào tuổi cây và cây lúa nhiễm bệnh (không kháng), bệnh có thể xuất hiện ở tất cả các giai đoạn của cây lúa, đặc biệt là giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng. Yếu tố chỉ thị rõ nhất là có sự hiện diện của quần thể rầy xanh (*Nephotettix* spp.) là biểu hiện của bệnh. Sự chuyển vàng của cây lá rất dễ nhầm với các triệu chứng: rối loạn sinh lý như là sự thiếu đạm hoặc kẽm và rối loạn do thiếu nước; côn trùng gây hại như là sâu đục thân, các loại rầy, chuột phá hoại và các bệnh như vàng lùn lúa cỏ, bệnh vàng cam. **Tác nhân gây hại** Bệnh Tungro được truyền bởi rầy xanh và rầy bông. Bệnh này là sự phối hợp giữa Tungro bacilli-form virus (RTBV) và Tungro spherical virus (RTSV). RTBV không thể truyền bởi rầy trừ khi có sự hiện diện của RTSV. Rầy xanh và rầy bông có thể tiếp nhận virus từ tất cả các bộ phận của cây lúa bị bệnh. Sau khi nhận được virus, vec-to (rầy) có thể lập tức truyền ngay bệnh Tungro này đến cây lúa. **Cơ chế gây bệnh** Rầy hút virus do chích hút nhựa cây lúa trong thời gian 8 giờ, và có thể truyền bệnh ngay sau khi chích hút sang cây khỏe. Virus không thể duy trì trong cơ thể rầy. Sau khi ăn trên cây bệnh, côn trùng có thể truyền virus trong vòng 5 ngày và lâu nhất là một tuần. Rầy chỉ có thể tái gây nhiễm sau khi tiếp nhận virus do ăn trên cây lúa bị bệnh. Đây là những điểm khác với bệnh lùn lúa cỏ và lùn xoắn lá.

pháp kiểm soát bệnh Có 3 yếu tố hạn chế việc quản lý bệnh Tungro: sự không xuất hiện triệu chứng bệnh giai đoạn phát triển sớm của bệnh; thiếu giống kháng bệnh Tungro virus và sự kháng của vec-to trên giống kháng rầy xanh. Trồng giống kháng đối với bệnh Tungro virus là phương pháp kinh tế nhất trong quản lý bệnh. Giữa các phương pháp canh tác, việc điều chỉnh thời gian cấy sạ được khuyến cáo cùng với việc bỏ hóa ít nhất một tháng hoặc luân canh với hoa màu khác nhằm loại trừ cây ký chủ, virus và rầy xanh. Cày bừa đồng ruộng kỹ để loại trừ gốc rạ ngay sau khi thu hoạch để loại bỏ ký chủ của bệnh Tungro cũng được áp dụng. **Quản lý rầy xanh**

Có nhiều phương pháp phòng trừ sinh học: dùng ong bắp cày ký sinh trên trứng, bọ mired cũng ăn trứng rầy, các loài ruồi pipunculid và tuyến trùng ký sinh trên cả ấu trùng và thành trùng, loài bọ veliid sống dưới nước, ruồi damselfly, chuồn chuồn, nhện... tấn công rầy xanh; loại Pandora delphacis tấn công ấu trùng và thành trùng của rầy xanh. Trong những vùng chưa nhiễm bệnh Tungro, không cần sử dụng thuốc trừ sâu đối với rầy xanh. Việc phun thuốc nên tránh vì thường không ngăn chặn hay làm giảm được sự nhiễm bệnh Tungro. Luân canh cây lúa với cây họ đậu hoặc hoa màu khác hay nuôi cá, tôm để giảm nguồn phát triển của rầy xanh. Hoặc dùng các giống lúa có tính kháng với rầy xanh, rầy bông.

◀ Trở về

★ |  |  |  Bản in |  Gửi bạn bè

CÁC TIN KHÁC

- Cách cho măng cụt ra hoa sớm, không sượng trái
- Hiện tượng bưởi Năm roi bị đắng
- Trồng bơ để có năng suất cao, phẩm chất tốt (24/08/2006)
- Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa kiểng trước và sau Tết (05/01/2007)
- Cây xoài 15 tuổi bị chết nhánh - lá bị cháy (27/10/2006)
- Kinh nghiệm cho cam ra hoa trái vụ
- Nông nghiệp Việt Nam cần làm gì để hội nhập
- Cây chanh dây: Nguồn gốc, tiềm năng và năng suất và quy trình bón phân Đầu Trâu cho cây chanh dây
- Cơ cấu giống lúa vụ Đông Xuân 06/07 ở Nam Bộ
- Bón phân cho cây ngô lai



Hotline tư vấn
1900.6613

Tìm nhanh...



Thông tin nhà nông

Canh tác thông minh

Chương trình "Đồng hành và chia sẻ"

Hỏi đáp chương trình "Đồng Hành và Chia sẻ"

Chuyên mục "Phân bón với nhà nông"

Thế giới hoa kiểng

CLB Đồng Quê

Farmer's News

BẢNG GIÁ NÔNG SẢN

Hạt mắc ca	70.000
Ca cao	180.000
Cao su	148.000
Gạo IR 504	12.500
Cà phê	125.600
Bơ sáp	25.000
Sầu riêng Ri đẹp	65.000
Điều	40.000
Hồ tiêu	119.000
[Xem tiếp]	

HỎI ĐÁP



Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

[Đặt câu hỏi](#)

[Xem câu hỏi](#)

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

© 2019, Bản quyền của Công ty Cổ Phần Phân Bón Bình Điền.

Địa chỉ: C12/21 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Email: fertilizer@binhdien.com - Điện thoại: (028) 3756 1191

Số ĐKKD: 0302975517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 01 năm 2011. Người đại diện: ông NGÔ VĂN ĐÔNG.

[Quy định chung] [Chính sách bảo mật] [Quyết định lưu hành]



Website hiển thị tốt trên trình duyệt IE7+, Firefox 3.6+, Chrome 7.0+ hoặc Safari 5.0+ (phiên bản trên MAC).

Thiết kế web bởi Vipcom

TẢI ỨNG DỤNG **CANH TÁC THÔNG MINH** TẠI ĐÂY



Android



IOS

Top

