



[Home](#) > [Cây lúa](#) > [Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa](#)

Posted 8 Tháng năm, 2024 by aaaaa

Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa

Cụm từ “**Vàng lùn – lùn xoắn lá**” đã quá quen thuộc đối với bà con nông dân. Đây là những bệnh hại phổ biến trên cây lúa được gây ra bởi tác nhân là thuộc nhóm siêu vi trùng (virus), lây truyền thông qua sự chích hút của rầy nâu. Bệnh là mối quan tâm nhứt nhối của bà con trồng lúa. Trong bài viết này, Sinh Học Châu Á kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu các thông tin khoa học cũng như cách thức xử lý bệnh.

1. Bệnh vàng lùn (bệnh lúa cỏ) trên lúa

- **Tên thường gọi:** Bệnh vàng lùn, bệnh lúa cỏ
- **Tác nhân gây bệnh:** Rice Grassy Stunt Virus (RGSV)



Zalo



Bệnh vàng lùn (bệnh lúa cỏ) trên lúa


Bệnh vàng lùn gây ra do virus có tên là Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) gây ra. Bệnh xâm nhiễm vào cây lúa thông qua môi giới là rầy nâu (*Nilaparvata lugens*). Virus tồn tại ít nhất 6 giờ trong cơ thể rầy nâu mới có thể nhân mật số và truyền bệnh sang cây. Cây lúa bị rầy tiêm nhiễm virus thì sau khoảng 10 –12 ngày, thậm chí là 20 ngày mới bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Lúa bị nhiễm bệnh sẽ xuất hiện hai dạng triệu chứng là triệu chứng vàng lùn và triệu chứng bệnh lúa cỏ.

- **Triệu chứng vàng lùn:** Lá lúa lần lượt chuyển màu từ xanh nhạt đến màu vàng, màu cam rồi cuối cùng vàng khô. Vị trí bị vàng sẽ lan theo chiều từ các lá ở gần gốc lên các lá ở phía trên. Vết bệnh vàng lá xuất hiện trước tiên ở phần chóp rồi kéo dần xuống bẹ lá. Lá bị nhiễm bệnh thường không mọc thẳng đứng mà có xu hướng xòe ngang. Số chồi giảm nhiều và chồi thấp. Khi quan sát ruộng bị bệnh sẽ thấy ruộng có màu ngả vàng, chiều cao các cây trên đồng không đồng đều.
- **Triệu chứng bệnh lúa cỏ:** Bụi lúa thấp lùn, chồi mọc thẳng đứng, lá ngắn, hẹp và có màu xanh nhạt hoặc vàng cam nhìn rất giống bụi cỏ. Trên các lá non có các đốm rỉ sắt. Khi lúa trở thường không có gié hoặc có gié nhưng hạt lép.

2. Bệnh lùn xoắn lá trên lúa

- **Tên thường gọi:** Bệnh lùn xoắn lá
- **Tác nhân gây bệnh:** Rice Ragged Stunt Virus (RRSV)



Lúa bị lùn xoắn lá

Bệnh lùn xoắn lá trên lúa được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1977 tại Tiền Giang và sau đó lan rộng ra các khu vực trồng lúa trên cả nước. Bệnh do tác nhân là Rice Ragged Stunt Virus (RRSV) gây ra. Tương tự như bệnh vàng lùn, bệnh lùn xoắn lá cũng xâm nhập và gây hại thông qua môi giới chích hút là rầy nâu.

Bệnh có thời gian ủ bệnh là 10 ngày, sau 15 ngày bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Triệu chứng của bệnh như sau:

Khi bị nhẹ, cây lúa bị lùn, đốt thân ngắn, thân cây cứng hơn các cây bình thường. Lá cứng (nhẹ), dày và có màu xanh đậm, xung quanh mép lá có hình như gân thưa và gân lá bị phồng lên. Bên trong rãnh và bẹ lá xuất hiện hiện tượng đậm chồi và rãnh. Rãnh mọc ngược, chồi mọc xoắn bên trong bẹ. Lúa bị nhiễm bệnh nhẹ vẫn có khả năng trổ bông được, nhưng trổ muộn, bông xoắn, hạt lép và bị các đốm nâu trên hạt.

Khi bị nhiễm bệnh nặng, lá lúa ngắn lại và xoắn tít lại như hình mũi khoan, có các đốm nâu trên lá. Ở thể nhiễm này cây lúa hoàn toàn không trổ được, thất thu rất lớn.

3. Biện pháp quản lý

Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do virus gây ra vẫn chưa có các loại thuốc đặc trị nên biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là phòng ngừa.

Kiểm soát rầy nâu để ngăn chặn lúa bị nhiễm bệnh do virus

Biện pháp canh tác:

- Cày bừa, làm đất thật kỹ để loại bỏ tàn dư thực vật và các nguồn bệnh có trong đất.
- Vệ sinh ruộng đồng thường xuyên, loại bỏ cỏ dại, cây ký chủ (đặc biệt là cỏ lồng vực và cỏ đuôi phụng). Tìm hiểu các quản lý cỏ dại hiệu quả tại đây.
- Gieo sạ tập trung theo lịch khuyến cáo để né rầy nâu.
- Sử dụng giống kháng bệnh, giống kháng rầy nâu để canh tác.
- Nhổ bỏ cây bị bệnh và tiêu hủy các cây bị nhiễm bệnh.
- Thăm đồng thường xuyên để nắm bắt diễn biến dịch hại trên đồng.

Biện pháp hóa học:

Hiện nay trên thị trường chưa có các dòng thuốc đặc trị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Để giảm thiểu tình trạng bệnh, bà con cần quản lý tốt rầy nâu.

Sử dụng các sản phẩm diệt rầy có chứa hoạt chất như là *Emamectin benzoate*, *Pymetrozine*,....

Xem thêm thông tin chi tiết về cách quản lý rầy nâu hiệu quả [tại đây!](#)

Biện pháp sinh học:

Chặn đứng tình trạng vàng lùn, lùn xoắn lá bằng chế phẩm MOFI. Với thành phần từ nano chitosan và các vi sinh có lợi khác, MOFI giúp cô lập virus, nhanh chóng chặn đứng lây lan bệnh hại và bổ sung dinh dưỡng để cây phục hồi tốt hơn.

Sử dụng kết hợp Metar để quản lý rầy nâu sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Tìm hiểu và đặt mua sản phẩm:

[Sản phẩm MOFI](#)

[Sản phẩm Metar](#)

ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

TẠO TÀI KHOẢN



TRAO TRỌN GIẢI PHÁP XANH

CÔNG TY TNHH SINH HỌC CHÂU Á

Chuyên sản xuất và gia công chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Thông tin công ty

Mã số thuế: 0316080851

Trụ sở: Tầng 2, toà nhà Hado Airport Building, số 2 Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Nhà máy: C1, cụm Công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Liên hệ

Hotline: 0589 688 988

Email: sinhhocchaua@gmail.com

Liên kết

