



Mục lục bài viết

- I. Thông tin chung về bệnh đốm nâu trên lúa
- II. Đặc điểm và biểu hiện của bệnh đốm nâu trên lúa
 - 1. Triệu chứng bệnh đốm nâu trên lúa
 - 2. Điều kiện phát sinh bệnh đốm nâu trên lúa
 - 3. Cách thức lây lan
 - 4. Phân biệt bệnh đốm nâu trên lúa với bệnh khác
- III. Hậu quả của bệnh đốm nâu trên lúa
 - 1. Ảnh hưởng đến cây trồng
 - 2. Ảnh hưởng đến năng suất và kinh tế
 - 3. Triệu chứng cụ thể
- IV. Biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu trên lúa
 - 1. Biện pháp canh tác
 - 2. Quản lý ruộng
 - 3. Cải thiện dinh dưỡng và đất
 - 4. Sử dụng thuốc BVTV
 - 5. Kiểm tra và xử lý sớm
- V. Lưu ý trong phòng trừ bệnh đốm nâu trên lúa
 - 1. Sản phẩm chuyên dụng
 - 2. Giải pháp kỹ thuật đồng bộ
 - 3. Lời khuyên từ chuyên gia ABA
 - 4. Kết luận

Bệnh đốm nâu trên lúa (*Helminthosporium oryzae*) là một bệnh hại phổ biến trên lúa, đặc biệt ở vùng đất nhiễm phèn như Đồng bằng sông Cửu Long, gây thiệt hại năng suất nghiêm trọng nếu không được kiểm soát kịp thời. Bệnh xuất hiện ở nhiều quốc gia trồng lúa trên thế giới, tấn công từ giai đoạn mạ non đến khi thu hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng hạt và giá trị kinh tế. Hãy cùng ABA Chemical tìm hiểu chi tiết về bệnh đốm nâu và các biện pháp phòng trừ hiệu quả để bảo vệ ruộng lúa, đảm bảo vụ mùa năng suất cao! **Cùng cập nhật thêm nhiều bài viết kỹ thuật mới nhất tại ABA Chemical**



Tìm hiểu thông tin bệnh đốm nâu trên lúa, nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết và cách phòng trừ hiệu quả

I. Thông tin chung về bệnh đốm nâu trên lúa

Thông tin	Chi tiết
Tên khoa học	<i>Helminthosporium oryzae</i> (<i>Cochliobolus miyabeanus</i>)



protected by reCAPTCHA

Tên tiếng Anh	Brown spot of rice
Cây trồng bị hại	Lúa, bắp, lúa mì, lúa mạch, tiểu mạch, mía; ký chủ phụ: cỏ dại
Bộ phận bị hại	Lá, vỏ trấu, bẹ lá, nhánh bông, diệp tiêu, rễ mạ non
Điều kiện phát sinh	Nhiệt độ 16-35°C, độ ẩm >89%, đất thiếu đạm, kali, silic, nhiễm phèn

Bệnh đốm nâu gây hại trên lúa ở mọi giai đoạn sinh trưởng, đặc biệt trong điều kiện đất nghèo dinh dưỡng, độ ẩm cao, làm giảm năng suất và chất lượng hạt lúa.

II. Đặc điểm và biểu hiện của bệnh đốm nâu trên lúa

1. Triệu chứng bệnh đốm nâu trên lúa

- Trên lá:** Vết bệnh hình bầu dục, dài 2-5 mm, màu nâu hoặc nâu đậm, có quầng vàng nâu bao quanh. Ở giống lúa nhiễm nặng, vết bệnh dài đến 1 cm, liên kết thành mảng, làm lá khô, rụng sớm.
- Trên hạt:** Vết bệnh là đốm bầu dục nhỏ, màu nâu đậm hoặc đen trên vỏ trấu, gây lem lép hạt. Nếu nặng, vết bệnh lan toàn hạt, làm hạt mất giá trị thương mại.
- Trên mạ và rễ:** Mạ non có diệp tiêu lùn, rễ sẫm màu, sinh trưởng kém. Rễ mạ nhiễm bệnh dễ thối, làm cây con chết, ảnh hưởng mật độ gieo trồng.

2. Điều kiện phát sinh bệnh đốm nâu trên lúa

- Thời tiết:** Nhiệt độ 16-35°C, độ ẩm tương đối trên 89%, đặc biệt trong mùa mưa, tạo điều kiện cho nấm phát triển. Bệnh ngừng phát triển khi nhiệt độ vượt 36°C, nhưng bào tử vẫn sống sót trong môi trường khô.
- Môi trường ruộng:** Ruộng thiếu đạm, kali, silic, mangan, magie hoặc dư lân dễ bị bệnh. Đất nhiễm phèn, mây che phủ, bóng râm làm bệnh phát triển mạnh hơn.

3. Cách thức lây lan

- Qua gió:** Bào tử nấm *Helminthosporium oryzae* phát tán qua gió, lây lan xa từ ruộng bệnh sang ruộng khỏe. Gió là yếu tố chính giúp bệnh lan rộng trong vùng trồng lúa.
- Qua hạt, tàn dư:** Nấm tồn tại trên hạt giống, rơm rạ chôn trong đất (lên đến 2 năm) hoặc trên cỏ dại. Hạt giống nhiễm bệnh và tàn dư không vệ sinh là nguồn lây chính qua các vụ mùa.

4. Phân biệt bệnh đốm nâu trên lúa với bệnh khác

- Đốm nâu vs. đạo ôn lá:** Đốm nâu (*Helminthosporium oryzae*) gây vết bầu dục, nâu, quầng vàng; đạo ôn lá (*Pyricularia oryzae*) tạo vết hình thoi, xám trắng, viền nâu. Đốm nâu thường xuất hiện ở ruộng thiếu dinh dưỡng, đạo ôn lá phát triển mạnh khi ẩm cao.
- Đốm nâu vs. đốm vằn:** Đốm nâu gây vết nhỏ, bầu dục trên lá, hạt; đốm vằn (*Rhizoctonia solani*) tạo vết lớn, xám xanh, viền nâu trên bẹ, thân. Đốm nâu lây qua gió, đốm vằn lây qua đất, nước.

III. Hậu quả của bệnh đốm nâu trên lúa

1. Ảnh hưởng đến cây trồng

- Lá, mạ bị hại:** Vết bệnh làm lá khô, rụng sớm, giảm khả năng quang hợp, khiến cây lúa còi cọc. Mạ non lùn, rễ thối, chết hàng loạt, gây thiếu hụt mật độ gieo trồng.
- Hạt lép, kém chất lượng:** Vết bệnh trên vỏ trấu gây lem lép hạt, hạt nhỏ, đen, mất giá trị thương mại. Bệnh nặng làm tỷ lệ hạt lép tăng, giảm năng suất đáng kể.
- Dễ bị bệnh khác:** Vết bệnh tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn khác (đạo ôn, thối thân) xâm nhập. Cây nhiễm bệnh thứ cấp dễ chết, tăng thiệt hại ruộng lúa.

2. Ảnh hưởng đến năng suất và kinh tế

- Mất trắng vụ mùa:** Bệnh nặng khiến cây lúa còi cọc, không trổ bông, hoặc hạt lép, gây thiệt hại nghiêm trọng ở vùng trồng chuyên canh. Nông dân phải gieo lại mạ, tăng chi phí đầu tư.
- Giảm hiệu quả kinh tế:** Hạt lúa nhỏ, đen, lép không bán được giá cao, làm giảm thu nhập đáng kể. Chi phí phân bón, thuốc BVTV, công chăm sóc không thu hồi được, ảnh hưởng sinh kế.
- Tăng chi phí xử lý:** Nông dân phải chi nhiều cho thuốc trừ nấm, cải tạo đất, nhưng khó cứu vãn nếu bệnh lan rộng. Nấm lưu tồn trong đất, rơm rạ gây khó khăn cho các vụ mùa sau.

3. Triệu chứng cụ thể

Giai đoạn đầu

- **Dấu hiệu ban đầu:** Vết bệnh chấm kim, màu nâu trên lá non, dập tiêu mạ, hoặc rể mạ sẫm màu. Mạ phát triển chậm, lá có quầng vàng nâu nhẹ, là dấu hiệu sớm của bệnh.
- **Suy giảm chất lượng:** Cây lúa con lùn, lá giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng sinh trưởng. Nếu không kiểm soát, nấm sinh bào tử, lan nhanh sang lá và hạt.

Vết bệnh chấm kim, màu nâu trên lá non, dập tiêu mạ, hoặc rể mạ sẫm màu, lá có quầng vàng nâu nhẹ, là dấu hiệu sớm của bệnh.

Giai đoạn tiến triển

- **Hại lan rộng:** Vết bệnh lớn, bầu dục, dài 5-10 mm, liên kết thành mảng, làm lá khô, rụng. Hạt lúa xuất hiện đốm nâu đen, lép, ảnh hưởng chất lượng thóc.
- **Cây mất sức sống:** Cây còi cọc, ngừng trổ bông, ruộng xơ xác sau vài tuần nếu bệnh lan rộng. Nấm lây qua gió, rơm rạ, làm cả ruộng nhiễm bệnh nếu không xử lý.

Ảnh hưởng lâu dài

- **Sản phẩm mất giá trị:** Hạt lúa lép, đen, không đạt tiêu chuẩn thương mại, gây thiệt hại kinh tế lớn. Nấm lưu tồn trong đất, rơm rạ, cỏ dại, ảnh hưởng vụ mùa tiếp theo nếu không vệ sinh ruộng.
- **Lan rộng trong vùng:** Bào tử nấm phát tán qua gió, cỏ dại, lây nhiễm hàng loạt ruộng lúa. Nông dân đối mặt nguy cơ thất thu nghiêm trọng nếu không tiêu hủy tàn dư bệnh.

IV. Biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu trên lúa

1. Biện pháp canh tác

- **Xử lý hạt giống:** Ngâm hạt giống trong nước ấm 54°C (10 phút) hoặc thuốc trừ nấm (Mancozeb 80WP, liều 2g/kg hạt) trước khi gieo. Hạt sạch giảm nguy cơ lây bệnh từ giai đoạn mạ.
- **Luân canh cây trồng:** Luân canh với đậu, ngô, khoai trong 1-2 năm để phá vỡ vòng đời nấm *Helminthosporium oryzae*. Luân canh cải thiện đất, giảm nguồn nấm trong ruộng.

2. Quản lý ruộng

- **Vệ sinh tàn dư:** Thu gom, đốt rơm rạ, cỏ dại sau thu hoạch để giảm nguồn nấm lưu tồn. Phương pháp này ngăn nấm tái phát, bảo vệ vụ mùa tiếp theo.
- **Kiểm soát cỏ dại:** Nhổ bỏ cỏ dại họ Hòa thảo, ký chủ phụ của nấm, đặc biệt trước khi gieo mạ. Cỏ sạch giảm nguồn bào tử, hạn chế bệnh lây lan.

3. Cải thiện dinh dưỡng và đất

- **Bón phân cân đối:** Bón 80-100 kg N + 40-50 kg K₂O + 30-40 kg SiO₂/ha để tăng sức đề kháng cây. Cây khỏe ít bị nấm tấn công, hạt lúa to, chất lượng cao.
- **Cải tạo đất phèn:** Bón vôi bột 500-700 kg/ha, cày bừa, rửa phèn trước khi gieo để giảm độ chua. Đất cải tạo tốt giúp cây lúa phát triển mạnh, ít nhiễm bệnh.

4. Sử dụng thuốc BVTV

- **Phun thuốc trừ nấm:** Sử dụng Farader 225EW (Propiconazole 125g/l + Tebuconazole 100g/l), liều 100ml/100 lít nước, phun khi phát hiện vết bệnh. Phun 2-3 lần, cách nhau 7-10 ngày, vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi lúa trổ.
- **Chế phẩm sinh học:** Bón *Trichoderma* spp. vào đất (5-7 kg/ha) để ức chế nấm *Helminthosporium oryzae*. Chế phẩm tăng sức đề kháng cây, an toàn cho sản phẩm.

Dùng thuốc bvtv phun khi phát hiện vết bệnh vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi lúa trổ.

5. Kiểm tra và xử lý sớm

- **Thăm ruộng thường xuyên:** Kiểm tra lá, hạt, mạ 2-3 lần/tuần khi nhiệt độ 16-35°C, độ ẩm cao để phát hiện sớm vết bệnh. Phát hiện kịp thời giúp xử lý trước khi bệnh lan rộng.
- **Loại bỏ cây bệnh:** Nhổ bỏ mạ, cây lúa nhiễm bệnh, tiêu hủy bằng cách đốt, rải vôi bột quanh khu vực bệnh. Phương pháp này giảm mật độ nấm, bảo vệ cây khỏe trong ruộng.

Cùng ABA Chemical đọc thêm: **Bệnh trừ đốm nâu trên lúa** tại đây!

V. Lưu ý trong phòng trừ bệnh đốm nâu trên lúa

1. Sản phẩm chuyên dụng

- **Thuốc trừ nấm:** ABA Chemical cung cấp Farader 225EW (Propiconazole + Tebuconazole) diệt nấm *Helminthosporium oryzae* hiệu quả. Sản phẩm bảo vệ lá, hạt lúa, giữ năng suất và chất lượng cao.
- **Chế phẩm sinh học:** Cung cấp *Trichoderma* spp. tăng sức đề kháng cây, giảm nấm gây bệnh. Sản phẩm an toàn, hỗ trợ lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP, xuất khẩu.

2. Giải pháp kỹ thuật đồng bộ

- **Tư vấn kỹ thuật:** Hỗ trợ nông dân xử lý hạt giống, bón phân cân đối, phun thuốc đúng thời điểm để phòng bệnh đốm nâu. Đội ngũ chuyên gia hướng dẫn vệ sinh ruộng, cải tạo đất phèn hiệu quả.
- **Lịch trình phòng trừ:** Cung cấp lịch bón phân, phun thuốc, kiểm tra bệnh theo giai đoạn sinh trưởng của lúa. Điều này giúp kiểm soát bệnh, đảm bảo cây lúa phát triển khỏe mạnh.

3. Lời khuyên từ chuyên gia ABA

- **Phòng bệnh từ sớm:** Xử lý hạt giống, bón phân kali, silic, cải tạo đất phèn để cây khỏe, ít bị nấm tấn công. Phương pháp này giảm nguy cơ bệnh, tăng chất lượng hạt lúa.
- **Kết hợp biện pháp:** Dùng thuốc BVTV, chế phẩm sinh học, vệ sinh tàn dư để kiểm soát bệnh bền vững. Điều này bảo vệ cây toàn diện, giữ sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại.
- **Thăm ruộng thường xuyên:** Kiểm tra lá, hạt khi nhiệt độ 16-35°C để phát hiện sớm vết bệnh, xử lý kịp thời. Điều này tránh bệnh lan rộng, giữ ruộng lúa năng suất cao.

4. Kết luận

Bệnh đốm nâu trên lúa là mối đe dọa lớn, đặc biệt ở vùng đất nhiễm phèn, gây thiệt hại năng suất và chất lượng hạt nếu không được kiểm soát. Áp dụng giải pháp từ ABA Chemical sẽ giúp nông dân phòng trừ bệnh hiệu quả, bảo vệ ruộng lúa và đảm bảo kinh tế ổn định. Cùng đọc thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại **website ABA Chemical**

ABA
CHEMICAL

- > Trang chủ
- > Giới thiệu
- > Dữ liệu
- > Bài viết kỹ thuật
- > Liên hệ

SẢN PHẨM

- > Phân bón
- > Thuốc BVTV
- > Nguyên liệu

GIẢI PHÁP

- > Gia công & Sản xuất
- > R&D
- > Khảo nghiệm sản phẩm

Office address: B18-QL1A, KDC TTVH Tây Đô, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Factory address: Số 86-QL1A, KV Yên Thạnh, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Hotline/Zalo: 0877 877 655 – 0899 476 777

Email: abachemical.com@gmail.com