



Trang chủ / Tin tức / Bệnh đốm nâu trên lúa – Nguyên nhân, triệu chứng và giải pháp quản lý hiệu quả bằng Upper 400SC

CẨM NANG NÔNG NGHIỆP, TIN TỨC

Bệnh đốm nâu trên lúa – Nguyên nhân, triệu chứng và giải pháp quản lý hiệu quả bằng Upper 400SC

Bệnh đốm nâu trên lúa là một trong những “kẻ thù” quen thuộc của bà con nông dân. Xuất hiện nhiều ở giai đoạn đẻ nhánh đến trổ bông, bệnh có thể khiến lá vàng, hạt lép, năng suất giảm nghiêm trọng – thậm chí mất trắng nếu không xử lý kịp thời. Nguyên nhân chủ yếu đến từ điều kiện canh tác thiếu cân đối, đất phèn – mặn hoặc thời tiết nóng ẩm. Vậy làm sao để nhận biết sớm, quản lý hiệu quả và bảo vệ ruộng lúa? Cùng Đức Thành tìm hiểu ngay trong bài viết này.

Mục lục [ẩn]

1. Bệnh đốm nâu trên lúa là gì?
2. Nguyên nhân gây bệnh đốm nâu
3. Triệu chứng nhận biết
4. Tác hại của bệnh đốm nâu
5. Biện pháp quản lý bệnh đốm nâu bằng UPPER 400SC
 - 5.1 a. Biện pháp canh tác
 - 5.2 b. Biện pháp hóa học
 - 5.3 c. Cách sử dụng UPPER 400SC theo khuyến nghị
6. Liên Hệ & Hợp Tác

1. Bệnh đốm nâu trên lúa là gì?

Đức Thành



PHÂN HỮU CƠ
HI-TECH
ORGANIC ĐẠT
CHỨNG HVNCLC
3 NĂM LIÊN TIẾP



BÀI VIẾT MỚI
NHẤT



Cán tác lúa
Hè Thu
2026: Tối ưu
đầu tư – giữ
ổn định
năng suất

Chức năng bình
luận bị tắt



Mưa nhiều
khí sầu

BÁO GIÁ AI

Cán tác lúa
Hè Thu
2026: Tối ưu
đầu tư – giữ
ổn định
năng suất

Chức năng bình
luận bị tắt



Hình 1. Dấu hiệu bệnh đốm nâu

Bệnh đốm nâu trên lúa (Brown spot rice disease) là một trong những bệnh hại phổ biến nhất, thường xuất hiện ở giai đoạn đẻ nhánh – trổ bông. Nếu không kiểm soát kịp thời, bệnh có thể làm giảm năng suất.

Bệnh thường phát triển mạnh trên những ruộng:

- Thiếu dinh dưỡng, đất bạc màu.
- Đất phèn, đất mặn, đất gò.
- Gieo sạ dày, bón thừa phân đạm.

2. Nguyên nhân gây bệnh đốm nâu



Hình 2. Tác nhân gây đốm nâu trên lúa

Tác nhân chính: Nấm *Cochliobolus miyabeanus* (tên cũ *Helminthosporium oryzae*).

Điều kiện thuận lợi:

- Thời tiết nóng ẩm cao, nhiều mây.
- Ruộng ẩm thấp, thoát nước kém.
- Canh tác liên tục, không luân canh.

3. Triệu chứng nhận biết

Trên lá: vết chấm nhỏ màu nâu nhạt, sau lan rộng thành đốm bầu dục nâu đậm → nặng thì chuyển đỏ gạch.

Trên bẹ, thân, cổ bông: có đốm nâu đen, cây yếu, dễ gãy đổ.

Trên hạt: vỏ hạt lúa có đốm nâu đen, hạt lép lửng, tỷ lệ nảy mầm kém.



Vì Sao Đầu
Mùa Mưa Là
Thời Điểm
“Vàng” Để
Bón Phân
Hữu Cơ Cho
Đất?

Chức năng bình
luận bị tắt



Các côn
trùng gây
hại phổ biến
trên cây
thanh long
và cách
quản lý hiệu
quả

Chức năng bình
luận bị tắt



Cẩm nang
chăm sóc
sâu riêng
mùa mưa –
Làm ngay
để bảo vệ
năng suất

Chức năng bình
luận bị tắt

**UPPER – DIỆT
SẠCH ĐẠO ÔN,
TRỊ LEM LÉP HẠT**



**THUỐC TRỪ CỎ
GLUFOSAT 200SL
– DIỆT CỎ TẬN
GỐC, AN TOÀN
ĐẤT TRỒNG**





4. Tác hại của bệnh đốm nâu

Giảm diện tích lá xanh, giảm khả năng quang hợp.

Nhiễm nặng giai đoạn trổ có thể dẫn đến mất trắng.

Nấm tồn dư trong rơm rạ, hạt giống → lây lan vụ sau.



5. Biện pháp quản lý bệnh đốm nâu bằng UPPER 400SC

a. Biện pháp canh tác

Vệ sinh đồng ruộng: dọn sạch cỏ, xử lý rơm rạ bằng chế phẩm vi sinh, luân canh hoặc để đất nghỉ.

Gieo sạ hợp lý: 100–120 kg/ha, tránh gieo quá dày.

Bón phân cân đối: không lạm dụng đạm, kết hợp lân và kali để cây khỏe.

Sử dụng giống lúa có khả năng chống chịu bệnh.





Hình 5. Quản lý bệnh đốm nâu bằng biện pháp canh tác

b. Biện pháp hóa học

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho nấm phát triển, bà con có thể kết hợp phun thuốc trừ nấm để bảo vệ ruộng lúa. Một số nhóm hoạt chất phổ biến:

- Triazole: Difenoconazole, Propiconazole, Tebuconazole.
- Strobilurin: Azoxystrobin, Metominostrobin.
- Benzimidazole: Carbendazim.

Trong đó, bà con tại Tây Ninh và nhiều vùng lúa khác đã tin dùng Upper 400SC (Đức Thành) – sản phẩm chứa hai hoạt chất kép Azoxystrobin + Difenoconazole. Đây là sự kết hợp “mát”, an toàn cho lúa, có tác động rộng đến nhiều bệnh hại như đốm nâu, đạo ôn, khô vằn, lem lép hạt. Thuốc giúp lúa khỏe, lá xanh lâu, bông to chắc hạt và hiệu lực kéo dài, giảm số lần phun.

Hình 6. Quản lý bệnh đốm nâu bằng biện pháp hóa học

c. Cách sử dụng UPPER 400SC theo khuyến nghị

- Liều lượng: 50 ml/bình 25L, sử dụng 8 – 10 bình cho 1ha.
- Thời điểm: phun khi vết bệnh chớm xuất hiện, lặp lại sau 7–10 ngày nếu cần.
- Nên kết hợp trong quy trình quản lý tổng hợp (IPM) để đạt hiệu quả cao.

Lời khuyên cuối cùng: Bệnh đốm nâu có thể gây hại nghiêm trọng nếu không được quản lý kịp thời. Bà con cần áp dụng đồng bộ biện pháp canh tác, kết hợp thuốc phù hợp như Upper 400SC của Đức Thành, để bảo vệ ruộng lúa xanh tốt, năng suất ổn định và hạt gạo chất lượng.

Hình 7. Quản lý bệnh đốm nâu bằng UPPER 400SC

6. Liên Hệ & Hợp Tác

Để được tư vấn thêm hoặc đặt hàng sản phẩm liên quan đến các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, bà con vui lòng gọi: 0933 921 349 Hoặc inbox Fanpage: [Đức Thành Group](#) để được hỗ trợ kỹ thuật.

Hiện nay, Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành đang mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc với chính sách chiết khấu – hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông – đào tạo sản phẩm.

Quý đối tác có nhu cầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ: Hotline 0933 921 349 Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí và đồng hành cùng bạn xây dựng hệ thống phân phối bền vững.



PHÂN BÓN & THUỐC BVTV ĐỨC THÀNH

[← Bộ đôi Upper 400SC & Amino 15SL Gold – Giải pháp kép cho cây trồng khỏe mạnh](#)

[Thông báo đổi bao bì thuốc trừ bệnh Hexalazole 300SC >](#)



785 - 787, Cách Mạng Tháng 8,
P. Tân Ninh, Tây Ninh

0933 921 349

admin@ducthanhco.vn

ducthanhco.vn

SẢN PHẨM

Thuốc BVTV

Phân bón hữu cơ HTO

Phân bón hoá học NPK

Gạo ngon đặc sản Tây Ninh

LIÊN KẾT

Hoạt động

An sinh xã hội

Cầm nang nông nghiệp

Giải pháp phòng bệnh



Đức Thành Group
4.962 người theo dõi

Theo dõi Trang

Chia sẻ

FOLLOW

