



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NINH BÌNH

NINH BÌNH CROP AND PLANT PROTECTION SUBDEPARTMENT



Thứ Bảy, 13/06/2026 15:14:29



KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI

Bệnh đạo ôn trên lúa và biện pháp phòng trừ

Thứ Tư, 08/03/2023



Hiện nay trà lúa xuân sớm đang đồng đến trổ, trà lúa xuân muộn đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh. Những ngày qua thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại. Qua công tác kiểm tra đồng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy bệnh đạo ôn lá xuất hiện rải rác trên các trà lúa. Đặc biệt trên trà xuân muộn, bệnh đã gây hại cục bộ ở những diện tích lúa xanh tốt, giống nhiễm như: LT2, Bắc thơm số 7, Đài thơm 8, TBR 225, Nếp... Tỷ lệ bệnh nơi cao: 3-5%; cá biệt: 20-30% số lá C1-3 (xã Yên Nhân, Yên Lâm, Khánh Thịnh, huyện Yên Mô; xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh; xã Phú Sơn, huyện Nho Quan...)



Đã kết nối EMC

Tên khoa học: do nấm *Piricularia oryzae* gây ra.

1. Triệu chứng, tác hại

- Trên lá: Vết bệnh lúc đầu là những chấm nhỏ màu xanh lục sau chuyển sang màu xám nhạt tùy theo mức độ phản ứng của các giống lúa mà vết bệnh điển hình có hình thoi to, nhỏ khác nhau và có màu nâu nhạt, quầng vàng nhạt hoặc hình không đặc trưng (đối với giống kháng). Nếu ruộng bị nặng có thể gây lùn lụi (giai đoạn đẻ nhánh).



Ảnh: Hình ảnh bệnh đạo ôn lá

- Trên cổ bông: Lúc đầu là một chấm nhỏ màu xám đen sau lan dần quanh cổ bông làm cho bông lúa bị lép lửng, gây hiện tượng bông bạc (ở giai đoạn trổ - chắc). bệnh có thể gây hại trên cổ gié và trên hạt. Nếu bị hại ngay giai đoạn lúa trổ bông sẽ gây ảnh hưởng lớn đến năng suất.



Ảnh: Hình ảnh bệnh đạo ôn cổ bông

2. Điều kiện phát sinh và phát triển

Bệnh phụ thuộc nhiều vào yếu tố ngoại cảnh do đó bệnh phát triển thất thường.

- Điều kiện thời tiết: bệnh hại nặng vào lúc trời mát, gió nhẹ, ẩm độ không khí cao, có mưa thường xuyên và kéo dài, trời âm u ít nắng cũng thuận lợi cho bệnh phát triển và gây hại nặng.

- Điều kiện dinh dưỡng (phân bón): Bón nhiều phân đạm, thiếu lân và kali thường làm cho bệnh phát triển. Ở những ruộng đã bón nhiều đạm, nếu bón thêm phân lân sẽ làm bệnh nặng hơn. Còn nếu đất thiếu lân thì bón thêm lân hạn chế được bệnh (ở những vùng đất phèn). Bón kali nhiều hay ít cần phải cân đối lượng đạm bón vào ruộng.

- Giống lúa: Ở nước ta đã xác định được nhiều giống chống bệnh trong điều kiện ngoại cảnh ở các địa phương. Phản ứng với bệnh của các giống biến đổi theo từng nước, thậm chí từng vụ ở ngay trong một địa phương. Mức độ chống bệnh của các giống liên quan đến điều kiện thời tiết, đất đai và kỹ thuật canh tác.

Tính chống bệnh của giống lúa có liên quan đến các đặc điểm hình thái và thành phần hoá học trong cây lúa.

- Điều kiện khô hạn: ở những vùng lúa bị hạn, những vùng trồng lúa rẫy, nhiệt độ ngày đêm có chênh lệch, sương mù bệnh phát triển nặng.

- Nguồn bệnh: nấm bệnh lưu tồn trong rơm rạ, cỏ dại, hạt giống... là nguồn bệnh lây lan qua vụ sau.

3. Biện pháp phòng trừ

* Đối với bệnh đạo ôn lá

- Khi bón thúc để nhánh xong lúa kín đất. Cuối tháng 3 và tháng 4 nhiều ngày có mưa phùn, chênh lệch ngày và đêm cao, độ ẩm cao rất thuận tiện cho bào tử nấm đạo ôn phát sinh, phát triển và gây hại.

- Ruộng bị bệnh cần dừng ngay việc bón các loại phân, đặc biệt là phân đạm. Không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón qua lá. Giữ mực nước trong ruộng từ 1-3 cm. Đối với những ruộng bị bệnh nặng phải phun kén 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày, trước khi phun thuốc cần loại bỏ các lá bị bệnh nặng tiêu huỷ rồi mới tiến hành phun thuốc (Chú ý: Tranh thủ thời tiết thuận lợi để phòng trừ kịp thời và đảm bảo lượng nước thuốc đã pha từ 25-30 lít/sào).

Phun trừ trên những ruộng có tỷ lệ bệnh $\geq 3\%$ số lá bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Bump 650WP, Kasoto 200SC, FujiOne 40WP, Beam 75WP, Kabim 30WP, Bamy 75WP, Fu-army 30WP,...

* Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:

Phun phòng theo tốc độ lúa trổ trên những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá, giống nhiễm, ruộng xanh tốt gần nguồn bệnh khi lúa thấp thoáng trổ từ 3-5%. Những ruộng bị đạo ôn lá nặng, cần phun kén hai lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Kasoto 200SC, Bump 650WP, Katana 20SC, Kabim 30WP, Filia® 525SE, Bamy 75WP,...


Phạm Thị Xuyên – Trạm Kiểm dịch thực vật.

DANH SÁCH LIÊN QUAN

- > Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2024
Thứ Sáu, 10/11/2023
- > Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ Ba, 05/09/2023
- > Bệnh Lem lép hạt và các biện pháp phòng trừ
Thứ Ba, 05/09/2023
- > Các biện pháp phòng trừ nhện gié hại lúa
Thứ Ba, 05/09/2023
- > Các biện pháp phòng chống bệnh Bạc lá hại lúa vụ Mùa 2023
Thứ Ba, 05/09/2023
- > Phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa vụ Mùa 2023
Thứ Hai, 28/08/2023
- > Các biện pháp phòng chống bệnh đốm sọc vi khuẩn hại lúa vụ Mùa 2023
Thứ Sáu, 25/08/2023
- > Phòng trừ sâu đục thân lúa hai chấm trên mạ vụ mùa 2023
Thứ Hai, 10/07/2023
- > Hướng dẫn phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa vụ mùa 2023
Thứ Hai, 10/07/2023

TRỒNG TRỌT
> Tin hoạt động
> Thị trường nông sản
> Kỹ thuật trồng trọt
> Giống cây trồng
BẢO VỆ THỰC VẬT
> Dự tính, dự báo
> Kỹ thuật phòng trừ dịch hại
> Danh mục thuốc BVTV
QUẢN LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
> Công bố hợp quy
> Cơ sở đủ ĐK KD phân bón
> Cơ sở đủ ĐK KD thuốc BVTV
> Hội thảo, quảng cáo
KIỂM DỊCH THỰC VẬT
> Tin hoạt động
> Mã số vùng trồng

VIDEO



Trailer Festival Ninh Bình lần thứ II năm 2023



Hướng dẫn phòng trừ sâu keo mùa thu



Hướng dẫn đăng ký trực tuyến mã số vùng trồng nông sản chủ lực địa phương



Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình phục tráng và bảo tồn thành công giống lúa Nếp hạt cau tại Nho Quan



Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa

» Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

> 84/2019/NĐ-CP

Quy định về quản lý phân bón

Ban hành: 14/11/2019

> 62/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ban hành: 11/07/2019

> 31/2018/QH14

Luật Trồng trọt

Ban hành: 19/11/2018

> 64/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

Ban hành: 26/06/2014

> 41/2013/QH13

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 25/11/2013

> 42/2013/QH13

Luật Tiếp công dân

Ban hành: 01/01/1970

» Xem thêm



DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT



DANH BẠ



BÁO CÁO - THỐNG KÊ



LỊCH CÔNG TÁC





ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG TRỰC TUYẾN

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NINH BÌNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Tuấn - Chi cục Trưởng

Địa chỉ: Số 113 Nguyễn Huệ, Nam Bình, Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.903

Ghi rõ nguồn: "chicucttbvtv.ninhbinh.gov.vn" khi phát hành thông tin từ trang này

Số lượt truy cập: 354896

Hôm nay: 227

© Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Bình