

Thứ bảy, ngày 13-06-2026, 01:05 (GMT +7)



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ > KHCN TRONG NƯỚC

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

Cập nhật lúc 10:19, Thứ sáu, 20/08/2021



🌐 Chia sẻ 0

Giọng Hà Nội - Ngọc Huyền

📖 Đọc



0:00 / 0:00



Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay các tỉnh thành phía Nam lúa Hè Thu đang ở giai đoạn đồng - trổ với 200.000 ha. Trong thời gian tới, nếu có mưa bão kéo dài, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại trên lúa Hè Thu và bệnh đạo ôn lá sẽ phát triển mạnh trên trà lúa Thu Đông – Mùa.

Để bảo vệ diện tích hè thu còn lại và lúa thu đông - lúa mùa 2021 an toàn, cần lưu ý các triệu chứng của bệnh và cách phòng trừ bệnh đạo ôn.

1. Triệu chứng và tác hại

- **Trên lá:** Ban đầu vết bệnh rất nhỏ nhưng ở giữa vết bệnh, phần tế bào lá đã bị hoại tử và khô xám, sau đó vết bệnh lớn dần và có hình thoi. Khi bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết với nhau làm cho toàn lá bị "cháy".
- **Trên cổ lá:** Bệnh tấn công ngay cổ lá giữa phiến lá và bẹ, vết bệnh có màu nâu đỏ sau chuyển qua nâu sậm, bệnh nặng làm gãy lá và lá hư.
- **Trên đốt thân:** Vết bệnh màu nâu làm đốt teo lại, nếu bệnh xuất hiện thời điểm lúa đang trổ thì toàn bộ bông bị lép trắng nhưng lấy tay rút lên thấy khó hơn triệu chứng lép trắng do sâu đục thân.
- **Trên cổ bông, cổ gié:** Bệnh tấn công ngay cổ bông hoặc cổ gié, vết bệnh màu nâu thối tóp lại làm cho toàn bộ bông hoặc từng gié bị lép. Nếu bệnh xuất hiện sớm toàn bộ bông hoặc từng gié

lúa bị lép trắng.



Hình ảnh bệnh đạo ôn trên lá lúa



Triệu chứng bệnh lần lượt trên lá, cổ lá, đốt thân và cổ bông

2. Điều kiện phát sinh phát triển

- Bệnh đạo ôn phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết âm u, giờ nắng trong ngày ít, sáng sớm có sương mù hay trời có mưa phùn, nhiệt độ thích hợp nhất trong khoảng từ 18 – 26°C. Bệnh đạo ôn thường gây hại nặng nhất trong vụ Đông Xuân, nhưng nếu ở vụ Hè Thu và Thu Đông khi gặp điều kiện thời tiết thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh phát triển như mưa bão kéo dài, bệnh sẽ vẫn gây

hại nặng.

- Các yếu tố như giống nhiễm (Jasmine 85, Nàng Hoa 9, VD 20, RTV, OM 4900, OM 5451...), sạ dày, bón thừa phân đạm, lá lúa nằm ngang, phiến lá rộng, ruộng thiếu nước, cỏ dại nhiều là điều kiện thuận lợi để nấm phát sinh, phát triển và gây bệnh nặng.

3. Biện pháp phòng trừ

*** Để bảo vệ lúa Hè Thu ở giai đoạn đồng - trở:** cần phun thuốc phòng ngừa khi lúa trở lệt xệt và lúc lúa trở đều.

*** Lúa Thu Đông - Mùa:**

- Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại quanh bờ và mương tưới, tạo điều kiện cho đất có thời gian nghỉ ngơi hoặc luân canh cây trồng... để cắt nguồn bệnh.

- Chọn giống kháng: tuy nhiên hiện nay do các giống chất lượng cao đáp ứng được xuất khẩu thì ít kháng hoặc chỉ kháng tạm thời nên yếu tố này tùy thuộc vào điều kiện từng vùng mà xem xét.

- Không gieo sạ quá dày để cây lúa được khỏe mạnh, kháng được bệnh (áp dụng theo lượng giống khuyến cáo của chương trình IPM, 1P5G, 3G3T). Mật độ gieo sạ tốt nhất là 80-100 kg/ha.

- Bón phân cân đối hợp lý, không bón thừa đạm bởi khi lúa bị thừa đạm, lá có màu xanh đậm và phiến lá sẽ không đứng thẳng mà nằm ngang khiến lá rất khó quang hợp. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm bệnh phát triển.

- Tăng cường bón phân có chứa canxi, silic để giúp lúa cứng cây (thành lóng dày, bẹ lúa ôm sát lóng), lá lúa dày đứng thẳng (lá lúa không nằm ngang) để hạn chế lá lúa "hứng" bào tử nấm và không cho bào tử nấm nảy mầm xâm nhập vào bên trong.

- Quản lý không để trong ruộng có nhiều cỏ vì cỏ dại là ký chủ quan trọng của nấm gây bệnh đạo ôn.

- Theo dõi ruộng thường xuyên, nhất là những giai đoạn cây lúa mẫn cảm với bệnh (từ giai đoạn lúa con gái đến đồng trở), không để ruộng lúa bị thiếu nước

- Khi thấy bệnh chớm xuất hiện thì không bón thêm phân đạm, các loại phân bón lá, thuốc kích thích sinh trưởng và cần phun thuốc phòng trừ. Nên sử dụng thuốc chứa các hoạt chất như: Tricyclazole, Fenoxanil, Isoprothiolane... để cho hiệu quả cao. Nếu áp lực bệnh cao cần phải phun lặp lại lần 2 sau 5-7 ngày.

Chú ý: Hiện nay hầu hết các giống lúa đang canh tác trong sản xuất đều nhiễm bệnh đạo ôn, do vậy cần phun thuốc phòng ngừa khi lúa trở lệt xệt và lúc lúa trở đều. Khi phun thuốc để phòng trừ bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông nên áp dụng nguyên tắc 4 đúng./.

HM



 Chia sẻ 0

Tin tức liên quan



Quy trình kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ cho cây chôm chôm cho các tỉnh Nam Bộ



Giải pháp khoa học khôi phục và phát triển bền vững đàn chim yến tại đảo Cù Lao Chàm



Khuyến cáo chủ động ứng phó nguy cơ bệnh lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1



Giải pháp phát triển bền vững cây sầu riêng tại Tây Ninh



Triệu chứng và biện pháp phòng bệnh Tembusu trên đàn vịt



Chủ động giảm stress nhiệt cho lợn trong mùa nắng nóng

Bạn đọc quan tâm






Hoạt động hưởng ứng các ngày lễ bảo vệ môi trường năm 2026 tại Tuyên Quang



Khuyến nông Lào Cai chuyển giao kỹ thuật bằng nền tảng số






Lễ ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững - Center of Excellence



Đoàn TNCS HCM Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức hoạt động "Pin cũ đổi mầm xanh – Môi trường làm việc trong lành"





Hợp tác công tư – Động lực thúc đẩy canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Sơn La

Dữ liệu khuyến nông	Hoạt động khuyến nông
Chương trình ngành nông nghiệp	Khoa học công nghệ
Hợp tác QT- Hợp tác PPP	Thị trường
Thiên tai - Dịch hại	Sự kiện khuyến nông
Trồng trọt	Chăn nuôi
Thủy sản	Chuyên canh lúa CLC
Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số	Khuyến nông cộng đồng
Kiến toàn hệ thống tổ chức Khuyến nông	Khôi phục sản xuất

Quản lý hoạt động KN

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

NATIONAL AGRICULTURE EXTENSION CENTER (NAEC)

Trụ sở chính: số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

LIÊN HỆ

 02437.282485 - 02437.715294
 02437.282485
 tthlknqg@gmail.com; tochucknqg@gmail.com

Chính sách bảo mật

Giấy phép số 31/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-03-2021

KẾT NỐI



© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Đã truy cập: 90,258,284 Đang Online: 246