

Trang Chủ / Giải Pháp

Giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa



Tên bệnh hại: Bệnh đạo ôn hại lúa (Đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông).

Tên khác: Cháy lá, thối cổ bông.

Tên tiếng Anh: Blast

Tác nhân: Do nấm *Pyricularia oryzae* (*Magnaporthe grisea*).

Triệu chứng gây hại:

Bệnh phát sinh gây hại suốt quá trình sinh trưởng của cây lúa, gây hại trên lá, cổ lá, đốt thân, cổ bông, hạt, làm cháy lá, cây chết khô, đổ ngã, lép hạt, hạt kém chất lượng.

+ **Trên lá:** Vết bệnh ban đầu là chấm trắng hay xanh xám nhạt bìa xanh xám. Vết bệnh điển hình có dạng hình thoi, ở giữa màu xám hay trắng, chung quanh viền nâu hay nâu đỏ, vết bệnh có thể liên kết lại tạo thành mảng cháy lớn, giai đoạn mạ làm chết lụi từng

đám.

+ **Trên cổ lá:** Phần tiếp giáp giữa phiến lá và bẹ lá bị thối.

+ **Trên thân:** Bệnh gây hại ở đốt, đốt thân có màu nâu, khô teo lại, cây lúa dễ bị gãy gục.

+ **Trên cổ bông, cổ gié:** Bệnh xảy ra ngay đốt dưới cổ bông và cổ gié làm bông và gié dễ gãy.

+ **Trên hạt:** Vỏ hạt bị bệnh có vết màu nâu hay đen.



Triệu chứng bệnh đạo ôn trên bộ phận chính của cây lúa

Điều kiện phát sinh và phát triển của bệnh:

- Bệnh tồn lưu trong rơm rạ, hạt giống, ... lan truyền qua tàn dư thực vật, hạt giống bị nhiễm bệnh, cỏ dại là ký chủ phụ của bệnh (cỏ lồng vực, đuôi phụng, cỏ chỉ, lúa ma, lúa chết, ...) và qua không khí.
- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu mát mẻ, ẩm độ cao, mưa nhỏ kéo dài, đêm sương mù nhiều, ngày nóng đêm lạnh, ít hay không gió vào ban đêm.
- Ruộng bón nhiều phân, nhất là phân đạm, giống nhiễm bệnh đạo ôn, mật độ gieo sạ dày cũng tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh hơn.
- Bệnh thường gây hại nặng từ làm đồng đến sau trổ.

Biện pháp phòng trừ:

- Biện pháp canh tác: Vệ sinh đồng ruộng, tiêu hủy tàn dư thực vật; dùng giống kháng, bón phân cân đối NPK, gieo sạ mật độ vừa phải, khi ruộng bị bệnh ngưng bón phân và đưa nước vào ruộng.
- Biện pháp hóa học: Sử dụng Katana 20SC. Liều dùng: 480 ml/ha (30 ml/25 lít nước). Lượng nước phun: 400 L/ha. Phun ướt đều cây trồng.

+ Đối với đạo ôn lá: Phun ngừa khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho

bệnh phát triển hoặc phun khi bệnh chớm xuất hiện.

+ Đối với đạo ôn cổ bông: Phun ngừa trước khi lúa trổ bông và ngay sau khi lúa đã trổ đều.

Khi phối hợp Katana 20SC với Nanowall 500SC và Ameed Top 750WG giúp tăng hiệu lực của các loại thuốc và phòng trừ được hầu hết các loại bệnh trên ruộng lúa (Đạo ôn, bạc lá, thối bẹ do vi khuẩn, đốm vằn, lem lép hạt, ...).

Tags: *Giải pháp bảo vệ thực vật; Bệnh đạo ôn; Cháy lá; Thối cổ bông; Katana 20SC.*

CÔNG TY TNHH NICHINO VIỆT NAM

Tầng 13, Cao ốc Phụng Long 2, 16 Nguyễn Trường Tộ,
Phường Xóm Chiếu, Hồ Chí Minh

Điện Thoại: +84 28 3827 4070

Fax: +84 28 3827 4071

Email: nvc@nichinovn.co

Cam Kết Bảo Mật

© Copyright 2023. Nichino Việt Nam. All rights reserved. Nihon Nohyaku Japan