

BỆNH THAN HẠI MÍA

1. Nguyên nhân

Do một loại nấm có tên là *Ustilago scitaminea* H. & P. Sydow gây ra, loại nấm này lây lan bằng bào tử.

Các bào tử nấm bệnh có thể tồn tại lâu trong đất và gây hại mía trong những năm sau

2. Triệu chứng bệnh

Lúc đầu cây mía nhỏ lại, lóng kéo dài, lá hẹp và ngắn sau đó cây mía tạo ra các roi chứa các bào tử nấm bệnh, các bào tử này tiềm ẩn trong mắt mầm của cây bị bệnh

Roi than có kích thước dài ngắn khác nhau, roi này có thể xuất hiện từ đỉnh sinh trưởng của cây hoặc từ mầm nách. Khi mới nhú lên roi than có một lớp màng mỏng màu trắng bạc bao bọc, bên trong chứa rất nhiều bào tử màu đen. Các bào tử này có thể dễ dàng phát tán theo gió và nước mưa. Khi mía bị bệnh cây cằn lại, đường kính thân và chiều cao cây nhỏ hơn bình thường



Hình 1. Các roi than cao vồng lên khỏi ngọn mía



Hình 2. Roi bào tử được bao phủ bởi lớp màng trắng bạc

3. Quy luật phát sinh phát triển

Bệnh phát sinh nhiều vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm

Có một số giống bị nhiễm bệnh nặng như VD79-177, VD63, F134, QĐ11, QĐ86-368. Công ty NASU không khuyến khích nông dân trồng các giống mía này

Một số giống kháng được bệnh này như VN84-4137, ROC10, F156, My 55-14, QĐ15

Mía gốc bị bệnh nặng hơn mía tơ



Hình 3. Roi than xuất hiện từ mắt mầm ở giai đoạn mía đã lớn



Hình 4. Roi than xuất hiện từ gốc cây có bệnh

4. Sự lây lan

Bệnh than có khả năng lây lan rất mạnh và mức độ phát tán nhanh do số lượng bào tử rất lớn trong các roi than (hàng triệu bào tử trong mỗi roi than)

Bệnh này có thể lây lan qua 3 con đường khác nhau:

- Lây qua hom giống: nếu dùng hom bị bệnh thì cây con cũng bị bệnh theo
- Lây qua không khí nhờ gió phát tán các bào tử
- Lây qua môi trường đất: những ruộng có mía bị than thì khi phá trồng lại các giống khác cũng bị nhiễm bệnh theo

5. Ảnh hưởng kinh tế

Bệnh than có thể gây thất thoát trên 50% về mặt năng suất và lượng đường trong mía.

Là loại bệnh rất nguy hiểm với cây mía do có số lượng bào tử nhiều, khả năng tích lũy lớn, mức độ lây nhiễm rất cao. Bệnh có khả năng gây thiệt hại lớn cho cả vùng nguyên liệu

6. Phòng trừ

Hiện nay chưa có thuốc hoá học trừ được nấm gây bệnh than, chúng ta chỉ sử dụng các biện pháp sau:

- Biện pháp phòng trừ tốt nhất là sử dụng giống kháng bệnh, chỉ trồng các giống kháng được bệnh than như VN84-4137, ROC10, F156, My55-14
- Đối với những ruộng đã bị bệnh thì biện pháp phòng trừ bắt buộc là đào và gom những cây hoặc bụi bị bệnh than đưa ra khỏi lô và đốt. Điều này có thể hạn chế được sự lây lan của bệnh than trên đồng ruộng.
- Không dùng hom giống ở những ruộng bị nhiễm than
- Ruộng bị nhiễm nặng không nên để lưu gốc mà nên cày phá và luân canh

Địa chỉ liên hệ:

Vùng mía số 1: ĐT: 3 817 212
 Vùng mía số 2: ĐT: 3 818 218
 Vùng mía số 3: ĐT: 3 888 500
 Vùng mía số 4: ĐT: 3 816 599
 Vùng mía số 5: ĐT: 3 988 755
 Vùng mía số 6: ĐT: 3 644 333

Ban Nông nghiệp
 Công ty TNHH mía đường Nghệ An
 Nghĩa Xuân, Quỳnh Hợp, Nghệ An
 ĐT: 038 888 185
 Fax: 038 888 193