



Bệnh Khảm Lá Mía: Dấu Hiệu Nhận Biết & Biện Pháp Phòng Trừ Bền Vững

ĐÃ ĐĂNG TRÊN THÁNG 8 18, 2025 BỞI KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ECOM




Bệnh Khảm Lá Mía: Dấu Hiệu Nhận Biết & Biện Pháp Phòng Trừ Bền Vững



Trong số các loại dịch hại trên cây mía, có những “kẻ thù” vô hình nhưng lại có sức tàn phá ghê gớm, đó chính là nhóm **virus cây mía**. Điển hình và phổ biến nhất là **bệnh khảm lá mía**, do virus Sugarcane Mosaic Virus (SCMV) gây ra. Đây là một căn bệnh nguy hiểm vì một khi cây đã nhiễm, chúng ta gần như không có thuốc đặc trị, và mọi nỗ lực sau đó chỉ có thể là hạn chế sự lây lan.

Với kinh nghiệm thực tế trên đồng ruộng, tôi hiểu rằng chìa khóa để chiến thắng căn bệnh này không nằm ở việc “chữa trị”, mà nằm ở chiến



lược “phòng ngừa” thông minh và chủ động. Bài viết này sẽ là một cẩm nang toàn diện, giúp bà con và các kỹ sư nông nghiệp hiểu đúng bản chất của bệnh, nhận diện chính xác triệu chứng và áp dụng các biện pháp phòng trừ bền vững, hiệu quả theo định hướng nông nghiệp xanh của Ecomco.

Tóm tắt bài viết



1. Hiểu Đúng Về Bệnh Khảm Lá Mía: “Kẻ Thù Giấu Mặt” Mang Tên Virus SCMV

Để phòng trừ hiệu quả, trước hết chúng ta cần hiểu rõ đối thủ của mình là ai. **Bệnh khảm lá mía** không phải do nấm hay vi khuẩn thông thường gây ra, mà tác nhân là **Sugarcane Mosaic Virus (SCMV)**. Đây là một loại virus thực vật, có kích thước siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường và sống ký sinh bắt buộc bên trong tế bào sống của cây.

Khi xâm nhập vào cây, virus SCMV sử dụng chính bộ máy của tế bào để nhân lên hàng triệu bản sao. Chúng phá vỡ cấu trúc của lục lạp, làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình quang hợp – quá trình tạo ra năng lượng và “đường” của cây. Đây chính là lý do tại sao không có loại thuốc phun nào có thể “chữa” được bệnh virus, vì thuốc không thể tiêu diệt virus bên trong tế bào mà không làm hại chính cây trồng.

2. Cách Nhận Biết Chính Xác Triệu Chứng Bệnh Khảm Lá Mía Trên Đồng Ruộng

Phát hiện bệnh sớm là yếu tố sống còn để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Bà con cần thường xuyên thăm đồng và quan sát kỹ các dấu hiệu, đặc biệt là trên các lá non đang phát triển.

2.1. Dấu hiệu đặc trưng trên lá: Triệu chứng “khảm” loang lổ

Đây là triệu chứng điển hình và dễ nhận biết nhất của bệnh. Trên phiến lá, đặc biệt là các lá non và lá bánh tẻ, sẽ xuất hiện những **vệt, đốm hoặc sọc dài không đều, có màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt xen kẽ với màu**

xanh đậm bình thường của lá.

Các mảng màu này sắp xếp lộn xộn, tạo thành hình dạng loang lổ như một bức tranh khảm, nên bệnh có tên gọi là **bệnh khảm lá**. Khi bệnh nặng, các vết vàng có thể lan rộng, nhưng hầu như không bao giờ làm lá vàng hoàn toàn mà luôn có sự xen kẽ màu sắc.

2.2. Ảnh hưởng tổng thể lên cây: Còi cọc, giảm năng suất và chữ đường

Triệu chứng khảm lá chỉ là biểu hiện bên ngoài, tác hại thực sự của virus lại nằm ở sự suy kiệt toàn diện của cây trồng. Cây bị nhiễm bệnh nặng sẽ có các biểu hiện sau:

- **Sinh trưởng kém:** Cây còi cọc, chiều cao thấp hơn hẳn so với cây khỏe.
- **Lóng ngắn:** Các lóng mía ngắn lại, đường kính thân nhỏ, làm giảm nghiêm trọng trọng lượng cây.
- **Giảm năng suất và chất lượng:** Đây là hậu quả kinh tế nặng nề nhất. Năng suất mía cây có thể **giảm từ 15-30%**, thậm chí cao hơn ở những giống mẫn cảm. Quan trọng hơn, hàm lượng đường (CCS) cũng bị sụt giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán và thu nhập của bà con.

Góc nhìn chuyên gia: Một sai lầm phổ biến mà tôi thường thấy là bà con nhầm lẫn triệu chứng ban đầu của bệnh khảm lá với hiện tượng thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: thiếu dinh dưỡng (như thiếu kẽm, mangan) thường gây vàng lá đồng nhất hoặc vàng theo gân lá một cách có quy luật. Ngược lại, **bệnh khảm lá mía** gây ra các mảng màu loang lổ, xen kẽ bất quy tắc và không tuân theo gân lá.

3. “Vạch Trần” Con Đường Lây Lan Của Virus Cây Mía

Hiểu rõ cách thức virus lây lan chính là chìa khóa để cắt đứt nguồn bệnh và bảo vệ ruộng mía một cách hiệu quả. Virus SCMV không thể tự di chuyển mà phải nhờ vào các “phương tiện” trung gian.

3.1. Côn trùng chích hút – Vector truyền bệnh số một

Đây là con đường lây lan nhanh và nguy hiểm nhất trong một vụ canh tác. Tác nhân chính là các loài **rệp vừng (aphids)**, đặc biệt là rệp ngô.

Khi rệp chích hút nhựa ở cây bị bệnh, virus sẽ dính vào vòi chích của chúng. Sau đó, chúng bay sang cây khỏe mạnh và chỉ cần một vết chích ngắn để hút thử, virus sẽ được truyền ngay sang cây mới. Quá trình này diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài giây đến vài phút.

3.2. Hom giống nhiễm bệnh – Nguồn lây lan khởi đầu nguy hiểm nhất

Nếu như rệp là tác nhân lây lan bệnh trên đồng ruộng, thì **hom giống nhiễm bệnh** chính là nguồn khởi đầu của dịch bệnh. Virus tồn tại sẵn trong các mắt mầm của hom giống được lấy từ cây mẹ đã bị bệnh. Khi bà con đem những hom này đi trồng, cây con mọc lên sẽ mang bệnh ngay từ đầu, trở thành nguồn bệnh sơ cấp để rệp tiếp tục phát tán ra khắp ruộng. Đây là con đường chính khiến bệnh lây truyền từ vụ này sang vụ khác và từ vùng này sang vùng khác.

3.3. Lây nhiễm cơ giới qua dụng cụ nông nghiệp và cỏ dại

Mặc dù ít phổ biến hơn nhưng đây cũng là một con đường lây nhiễm bà con cần lưu ý. Khi chúng ta dùng dao, cuốc để chặt hom, làm cỏ hay tỉa lá, nếu dụng cụ dính phải nhựa cây bệnh thì hoàn toàn có thể truyền virus sang cây khỏe mạnh thông qua các vết thương cơ giới. Ngoài ra, một số loài cỏ dại trong ruộng và ven bờ như cỏ lồng vực, cỏ chỉ... có thể là cây ký chủ phụ, vừa là nơi trú ẩn của virus, vừa là nơi sinh sống của rệp.

4. Quy Trình Phòng Trừ Bệnh Khảm Lá Mía Tận Gốc: “Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh”

Như đã nhấn mạnh, với **bệnh khảm lá mía**, chúng ta không có thuốc đặc trị. Do đó, toàn bộ chiến lược phải tập trung vào việc xây dựng một hàng rào phòng thủ vững chắc ngay từ đầu. Đây là một quy trình tổng hợp, đòi hỏi sự kiên trì và áp dụng đồng bộ, trong đó mỗi biện pháp đều đóng một vai trò không thể thiếu.

4.1. Biện pháp quan trọng nhất: Sử dụng giống kháng bệnh và hom giống sạch bệnh

Đây chính là tuyến phòng thủ số một, là nền tảng quyết định sự thành bại của cả vụ mía. Theo kinh nghiệm của tôi, việc đầu tư vào nguồn giống

tốt ngay từ đầu sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí xử lý dịch bệnh về sau.

- **Chọn giống kháng bệnh:** Bà con nên chủ động liên hệ với các Viện nghiên cứu, Trung tâm giống cây trồng uy tín để được tư vấn và lựa chọn các **giống mía kháng bệnh khảm lá** đã được công nhận và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương.
- **Đảm bảo hom giống sạch bệnh:** Tuyệt đối không lấy hom giống từ những ruộng đã có biểu hiện bệnh, dù chỉ là vài cây. Nguồn hom giống phải được đảm bảo sạch bệnh 100% để tránh mang mầm bệnh vào ruộng của mình.

4.2. Quản lý vector truyền bệnh: Kiểm soát triệt để quần thể rệp

Kiểm soát được **rệp vừng** chính là cắt đứt được con đường lây lan nhanh nhất của virus trên đồng ruộng. Bà con cần áp dụng các biện pháp quản lý rệp theo hướng tổng hợp (IPM):

- **Bảo vệ thiên địch:** Tạo điều kiện cho các loài thiên địch của rệp như bọ rùa, bọ mắt vàng, ruồi ăn rệp... phát triển bằng cách hạn chế sử dụng thuốc hóa học phổ rộng.
- **Can thiệp kịp thời:** Khi mật độ rệp cao, cần can thiệp bằng các giải pháp an toàn. Sử dụng **Trừ Sâu Sinh Học Eco-Beta** là một lựa chọn hiệu quả để tiêu diệt rệp mà không làm hại thiên địch, hoàn toàn phù hợp với định hướng nông nghiệp bền vững.

4.3. Vệ sinh đồng ruộng và quản lý cỏ dại

Môi trường đồng ruộng sạch sẽ, thông thoáng sẽ làm giảm đáng kể áp lực dịch bệnh. Bà con cần thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

- **Làm cỏ thường xuyên:** Thường xuyên làm sạch cỏ dại trong ruộng và ven bờ để loại bỏ nơi trú ẩn và ký chủ phụ của cả rệp và virus.
- **Khử trùng dụng cụ:** Tập thói quen khử trùng các dụng cụ nông nghiệp như dao, cuốc (có thể nhúng qua dung dịch cồn hoặc Javel loãng) khi chuyển từ làm việc ở ruộng này sang ruộng khác, đặc biệt là các ruộng nghi ngờ có bệnh.

4.4. Tăng cường sức đề kháng cho cây mía bằng dinh dưỡng cân đối

Một cây mía khỏe mạnh, được cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng sẽ có sức đề kháng tự nhiên tốt hơn, giúp giảm thiểu tác hại ngay cả khi bị virus xâm nhập. Việc chỉ tập trung vào phân bón hóa học là chưa đủ.

Lời khuyên từ chuyên gia: Đầu tư vào sức khỏe của đất là đầu tư cho sức khỏe của cây. Việc sử dụng các dòng **phân bón sinh học** giúp cải tạo đất, kích thích bộ rễ phát triển mạnh, từ đó cây hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Một nền đất khỏe với hệ vi sinh vật phong phú sẽ tạo ra những cây mía có sức chống chịu vượt trội.

5. Cần Làm Gì Khi Phát Hiện Bệnh Khảm Lá Mía Trên Ruộng?

Dù đã phòng ngừa kỹ, đôi khi bệnh vẫn có thể xuất hiện do các yếu tố khách quan. Khi phát hiện cây có triệu chứng, bà con cần hành động một cách bình tĩnh, nhanh chóng và dứt khoát.

5.1. Nhổ bỏ và tiêu hủy triệt để nguồn bệnh

Đây là việc làm cấp bách và quan trọng nhất. Ngay khi phát hiện bất kỳ cây nào có dấu hiệu **bệnh khảm lá**, bà con phải tiến hành nhổ bỏ toàn bộ gốc cây đó. Sau đó, cho vào bao nilon và mang ra khỏi ruộng để tiêu hủy triệt để (đốt hoặc chôn sâu có rắc vôi), tuyệt đối không vớt bừa bãi ra bờ mương hay dùng làm thức ăn cho gia súc vì có thể phát tán virus.

5.2. Tăng cường phun trừ rệp để ngăn chặn lây lan

Sau khi đã loại bỏ cây bệnh (nguồn virus), việc tiếp theo là phải tiêu diệt ngay “kẻ vận chuyển”. Bà con cần tiến hành phun thuốc trừ rệp ngay lập tức trên toàn bộ ruộng, đặc biệt là các cây xung quanh vị trí vừa nhổ bỏ. Việc này nhằm tiêu diệt các cá thể rệp có thể đã mang virus, ngăn chúng tiếp tục truyền bệnh sang các cây khỏe mạnh còn lại.

6. Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) Về Bệnh Khảm Lá Mía

6.1. Bệnh khảm lá mía có chữa được bằng thuốc phun không?

Trả lời thẳng thắn: Không. Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ

loại thuốc hóa học hay sinh học nào có thể tiêu diệt được **virus cây mía** khi chúng đã xâm nhập vào bên trong tế bào. Mọi biện pháp hiệu quả đều chỉ tập trung vào việc phòng ngừa lây lan.

6.2. Tại sao ruộng mía của tôi vụ trước không bị mà vụ này lại bị?

Có nhiều nguyên nhân có thể giải thích cho việc này:

- **Nguồn giống:** Có thể nguồn hom giống vụ này đã vô tình được lấy từ một ruộng khác đã nhiễm bệnh.
- **Vector truyền bệnh:** Rệp vừng có thể di chuyển từ các ruộng mía, ruộng ngô bị bệnh ở khu vực xung quanh bay đến.
- **Áp lực mầm bệnh:** Cỏ dại hoặc cây ký chủ mang mầm bệnh xung quanh ruộng phát triển mạnh, tạo điều kiện cho rệp mang virus đến tấn công.

6.3. Làm sao để sản xuất hom giống sạch bệnh tại nhà?

Để chủ động nguồn giống sạch, bà con có thể tự sản xuất theo quy trình cơ bản: Chọn những cây mía khỏe mạnh nhất, sinh trưởng tốt, tuyệt đối không có triệu chứng bệnh trong ruộng để làm cây mẹ. Nhân giống các cây này ở một khu vực riêng biệt, cách ly với khu sản xuất đại trà.

Thường xuyên kiểm tra và nhổ bỏ ngay lập tức bất kỳ cây nào có biểu hiện nghi ngờ để đảm bảo nguồn giống cuối cùng là sạch bệnh tuyệt đối.

7. Kết Luận

Bệnh khảm lá mía do virus SCMV gây ra thực sự là một bệnh hại nguy hiểm, có khả năng gây thiệt hại kinh tế nặng nề. Tuy nhiên, đây là một căn bệnh hoàn toàn có thể quản lý được nếu chúng ta áp dụng một chiến lược phòng ngừa tổng hợp và chủ động. Chìa khóa thành công nằm ở 3 trụ cột chính: **SỬ DỤNG GIỐNG SẠCH BỆNH – KIỂM SOÁT VECTOR TRUYỀN BỆNH – ÁP DỤNG CANH TÁC BỀN VỮNG.**

Hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ thành quả lao động của bạn!

Đừng chờ đến khi bệnh xuất hiện mới tìm cách xử lý. Hãy bắt đầu bằng việc đầu tư vào sức khỏe cây trồng từ gốc rễ. Khám phá ngay các giải pháp **phân bón sinh học** và **thuốc trừ sâu sinh học** từ Ecomco để xây

dựng một hàng rào bảo vệ vững chắc cho ruộng mía của bạn.

ECOM – NÔNG NGHIỆP TRI THỨC VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

- ✓ Sản phẩm sinh học 100% an toàn
- ✓ Tư vấn kỹ thuật miễn phí
- ✓ Hỗ trợ 24/7 trong quá trình sử dụng

☎ Liên hệ ngay: 0336 001 586

🌐 Website: www.ecomco.vn

Youtube : Ecom TV

Fanpage: facebook.com/PhanthuocsinhhocEcom

Nguồn tham khảo :

- **Báo Nông Nghiệp Việt Nam**
- **Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam (IAS)**



Mục nhập này đã được đăng trong Giải đáp, Kỹ thuật canh tác và được gắn thẻ Bệnh Khảm Lá Mía.



KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP ECOM

< GIÁ SẴU RIÊNG HÔM NAY 16/8:
RI6 LOẠI A NEO Ở MỨC THẤP 42.000
ĐỒNG/KG

Bệnh Đốm Nâu Mía: Nhận Biết, Tác Hại
& Cách Trị Dứt Điểm >

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc

được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

☐ Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

GỬI BÌNH LUẬN

**Thay đổi nền
nông nghiệp**

**Thông tin liên
hệ**

- **Địa chỉ:** Tòa OCT3A KĐT HandiResco, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm,

Sản phẩm

- Trừ sâu sinh học
- Trừ bệnh sinh học
- Trừ tuyến trùng
- Phân bón sinh học
- Hỗ trợ nông nghiệp

**Thông tin
chung**

- Về Ecom
- Giải đáp
- Chính sách
- Liên hệ

Hà Nội

- **Hotline:** 0336 001
586
- **Email:**
Marketingecomjsc@gmail.com
- **Mã số thuế:**
0109864128

Theo dõi Ecom

