



Bệnh than ở mía hiện nay là loại bệnh khá phổ biến ở các vùng canh tác mía chủ lực của nước ta. Biểu hiện của bệnh khá dễ phát giác. Khi phát hiện, bà con cần áp dụng biện pháp phòng trừ thích hợp nhanh chóng. Mục đích là để tránh tác hại về sau của nó. Bà con hãy tìm hiểu về loại bệnh than ở mía này qua bài viết sau đây.

Tên gọi khác

Bệnh đen bột, Bệnh than xoắn đọt

Tác nhân

Ustilago scitaminea H. Sydow

Đặc điểm của bệnh than ở mía

Trên cây mía có nhiều loại sâu bệnh gây hại khác nhau, trong đó có bệnh than ở mía. Chúng còn được gọi là bệnh đen bột hay bệnh than xoắn đọt, gây hại nghiêm trọng. Bệnh do loại nấm *Ustilago scitaminea* H. Sydow gây ra. Bào tử của nấm bệnh tồn tại ở nhiều nơi. Thường chúng có trong đất, trên hạt giống, trên các đọt chứa bào tử mọc ra từ ngọn cây mía (giống như cây cần câu), bám trên thân cây mía, bay trong không khí...


Bào tử của loại bệnh này lan truyền chủ yếu nhờ gió, nước hoặc phương tiện vận chuyển giữa các vùng. Khi mầm của cây mía phát triển, bào tử sẽ xâm nhập vào cây để gây bệnh ngay từ khi cây còn non. Những hạt giống đã nhiễm bệnh, khi trồng xuống, cây con sẽ nhanh chóng bị nhiễm bệnh.

Do hiện tượng tích lũy, bệnh gây hại trên ruộng mía tái sinh (mía trồng để gốc) thường nhiều hơn so với ruộng mía mới trồng. Đây là một bệnh nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh. Một khi bị bệnh, bà con chỉ còn cách đốn bỏ cây. Bệnh thường phát sinh và gây hại nhiều vào hai giai đoạn trong năm. Thường bệnh phát triển mạnh từ tháng 4 đến 6 và từ tháng 9 đến 11.

Triệu chứng phổ biến của bệnh than ở mía

Khi cây mía bị bệnh, nó sẽ phát triển nhiều nhánh mới, và bụi mía sẽ trông giống như bụi sả. Những cây mía nhỏ không thể phát triển lớn được, chúng sẽ có thân cây ngắn và lá hẹp. Bên cạnh đó, chúng sẽ mất khả năng để phát triển lóng mới. Cuối cùng, lá đọt của cây sẽ mọc ra một roi cong, bên trong chứa đầy bào tử nấm. Đây là triệu chứng đặc trưng và điển hình chỉ có ở bệnh than. Cây mía sẽ tiếp tục mất dần khả năng sống và cuối cùng chết. Khi đó, lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài bị vỡ. Kết cục là các lớp bột phấn đen sẽ được giải phóng. Sau đó, chúng phát tán vào không khí, rơi xuống đất và bám vào cây mía khác để lập lại quá trình gây bệnh.

Những giống mía khác nhau sẽ có các cây roi chứa bào tử bệnh có hình dạng và độ dài khác nhau. Có thể kể đến như: có giống ngắn, nhưng cũng có giống dài đến 2-3 mét.



protected by reCAPTCHA



Bệnh Than Mía

Phương pháp phòng trừ bệnh than ở mía hiệu quả

Để hạn chế tác hại của bệnh, bạn cần tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ ngay từ đầu mùa trồng cây (từ khi chuẩn bị hom giống và chuẩn bị đất trồng). Nếu để cho bệnh phát triển và can thiệp khi bệnh đã xuất hiện thì hiệu quả sẽ rất thấp. Dưới đây là một số biện pháp bà con có thể tham khảo:

- Không nên lấy hom giống từ những vườn mía đã bị bệnh để làm giống cho vụ sau.
- Sau mỗi vụ thu hoạch, nên thu gom toàn bộ tàn dư của cây mía và đưa chúng ra khỏi ruộng để tiêu hủy.
- Cần cày bừa và làm đất kỹ để chôn vùi bớt mầm bệnh.
- Bà con nên chọn giống cây mía có khả năng kháng bệnh cao như: VN 85-1859, R 570, QĐ 15, K 84-200, ROC 1, ROC 2, ROC 8, ROC 20...
- Trước khi gieo trồng, nên nhúng giống mía vào ngâm trong nước ấm khoảng 50 độ C trong 15-20 phút.
- Cần bón phân đầy đủ NPK để cây mía phát triển tốt, tăng cường sức đề kháng với bệnh.
- Hãy kiểm tra định kỳ ruộng mía của mình nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời những cây đã bị bệnh đem ra khỏi ruộng để loại bỏ. Lúc thu gom, nên đưa những roi chứa phần bào tử vào trong túi nylon, thắt kín miệng, để tránh bào tử phát tán.
- Nếu ruộng mía đã bị bệnh nặng, bà con không nên để mía gốc tái sinh cho mùa vụ sau.
- Nếu đã áp dụng kết hợp nhiều biện pháp mà bệnh vẫn không đỡ hơn, bà con nên cân nhắc chuyển sang luân canh với cây trồng khác khoảng 1-2 năm, sau đó trở lại trồng mía.

Cảm ơn bà con đã tham khảo bài viết của ABA Chemical về bệnh than ở mía.

Tham khảo một số giải pháp hạn chế bệnh hại từ ABA Chemical

- **Tên sản phẩm:** Farader 225EW
- **Phân loại:** Thuốc trừ bệnh
- **Thành phần:** Propiconazole 125g/l + Tebuconazole 100g/l

- **Phân dạng:** nhũ tương dầu trong nước (EW)
- **Dung tích:** 100 ml
- **Hiệu quả tác động:** Đặc trị đốm vằn trên lúa, than ở mía,...
- **Liều dùng:** 0,4 lít/ha
- **Đơn vị nhập khẩu và cung ứng tại Việt Nam:** ABA Chemical

Xem thêm:

> **Thuốc BVTT**

> **Phân bón**

Liên hệ ngay hotline tư vấn: **0877 877 655 – 0899 476 777**

ABA CHEMICAL – KIẾN TẠO THÀNH CÔNG

- Nhập khẩu – cung ứng hóa chất và sản phẩm theo yêu cầu.
- Nguyên cứu & phối chế, gia công sản xuất sản phẩm.
- Cung ứng vật tư bao bì, thiết kế in ấn nhãn mác, video review kỹ thuật sản phẩm và công nghệ sản xuất.
- Định hướng kinh doanh, tư vấn pháp lý ngành & đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

Hotline: 0877 877 655 – 0899 476 777

Email: contact@abachemical.comchemical.com

Website: www.abachemical.com

Địa chỉ: 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ABA CHEMICAL

- > Trang chủ
- > Giới thiệu
- > Dữ liệu
- > Bài viết kỹ thuật
- > Liên hệ

SẢN PHẨM

- > Phân bón
- > Thuốc BVTV
- > Nguyên liệu

GIẢI PHÁP

- > Gia công & Sản xuất
- > R&D
- > Khảo nghiệm sản phẩm

Office address: B18-QL1A, KDC TTVH Tây Đô, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Factory address: Số 86-QL1A, KV Yên Thạnh, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Hotline/Zalo: 0877 877 655 – 0899 476 777

Email: abachemical.com@gmail.com