



Danh mục cây trồng



Côn trùng hại cây trồng



Bệnh hại cây trồng

[Trang chủ](#) > [Bệnh hại cây trồng](#) > [Bệnh do nấm](#) >

Than đen

6,676

Liên hệ QC: ☎ 0336.180068

Cây trồng bị hại: [Cây mía](#)

Xem chủ đề liên quan: [Than đen](#), [Ustilago scitaminea Sydow](#), [cây mía](#), [cây mía đường](#)
[Biệt thự FLC Sầm Sơn](#)

Tên khoa học: *Ustilago scitaminea* Sydow

Triệu chứng của bệnh than đen *Ustilago scitaminea* Sydow


Bụi mía bị than đen và cờ than *Ustilago scitaminea* Sydow

Roi được hình thành từ mô ngọn hay chồi tận cùng của cây bị nhiễm, phủ đầy bao tử màu đen (teliospore: đông bào tử). Chồi bị nhiễm trở nên mảnh dẻ và giống như cỏ, với phiến lá hẹp và ngắn.

Tác nhân của bệnh than đen: Do nấm *Ustilago scitaminea* H. Sydow.



Cây trồng được quan tâm



Cây đào
(Peach tree)



Cây mai chiếu thủy
(Water Jasmine/Wrightia
religiosa Hook.f)



Cây thường sơn
(*Dichroa febrifuga* Lour.)



Cây hoa hồng
(*Rosa* sp)




Cây nhãn
(*Dimocarpus longan*)

Tiêu điểm



**[Ad.] COMBO COMBI
05: Biến vàng thành
xanh**

COMBO COMBI 05 – Bộ vi lượng giúp biến
vàng thành xanh, phục hồi nhanh lá vàng,
tăng diệp lục, quang hợp và sức sống cho



Bào tử bệnh than đen *Ustilago scitaminea* Sydow

Sự lan truyền của bệnh than đen *Ustilago scitaminea* Sydow

Bào tử được phát tán nhờ gió, nhiễm vào chồi ngọn của cây. Sự nhiễm này duy trì tiềm ẩn nhưng phát triển trong chồi non sau khi nảy mầm, dần dần tạo ra roi. Sự nhiễm cũng có thể xảy ra trong đất, do không khí bị ô nhiễm nặng. Nấm có thể sống sót vài tuần lễ trong đất khô. Điều kiện ẩm ướt làm giảm khả năng sống của bào tử. Những dòng nấm khác nhau đã được ghi nhận.

Biện pháp phòng trừ bệnh than đen *Ustilago scitaminea* Sydow

+ Ngâm hom trong nước lạnh đang chảy 48 giờ, sau đó xử lý nước nóng (50°C từ 150 – 180 phút); hoặc ngâm hom trong nước nóng 52°C trong 30 phút sẽ trừ được bệnh than đen khỏi hom bị nhiễm.

+ Dùng giống kháng.

+ Dùng hom sạch bệnh lấy từ vườn ươm đã được kiểm tra hệ thống và đã hủy sạch bệnh.

+ Hủy bỏ ruộng nhiễm và cày phá gốc những chỗ nhiễm tập trung nghiêm trọng.

Nhổ bỏ tận gốc những bụi mía mọc tự nhiên (mía rài: mọc từ gốc mía cũ còn sót) khi trồng mía trên ruộng trước đó đã trồng giống mía mắc cảm với bệnh.

Nguồn: Sổ tay QL dịch hại tổng hợp trên cây mía
- Cty CP đường Biên Hòa

cây trồng.



[Adl.] COMBO T-ROOT
kích rễ toàn diện - phục hồi cây yếu, thúc rễ cực mạnh



[Adl.] Sử dụng kết hợp đạm Ure và Atonik đậm đặc - 'Công thức vàng' trong sử dụng phân bón



[Adl.] Những tác dụng và tính năng nổi bật khi sử dụng Cytokinin DA6 trên cây trồng



[Adl.] Làm cách nào để ngăn chặn lợc, đọt non trên cây trồng?



[Adl.] Hướng dẫn kích thích hoa ly nở và kìm hãm hoa cúc nở vào đúng

dịp Tết



[Adl.] Làm cách nào để cây hoa cúc phát triển nhanh và nở hoa đúng

thời điểm?

Được xem nhiều



Lở cổ rễ, thối gốc, héo rũ, héo khô, héo cây con (*Rhizoctonia solani*)



Héo xanh, héo tươi, héo rũ, chết ẻo (*Pseudomonas solanacearum*)



Bồ hóng (*Capnodium* sp.)



Thân thư
(Colletotrichum sp.)



Thối thân, thối bẹ, thối
gốc, thối rễ
(Erwinia sp)

Bài viết liên quan



Hỏi đáp về cây mía và sản xuất mía đường
(kỳ 9)

Thích trang để theo dõi trên
Facebook

Xem thêm



Bệnh đốm lá dứa (Cercospora sp.)



Bệnh ghẻ trên cây ổi (Elsinoe psidii)



Bệnh than đen trên cây kê (Moesziomyces
penicillariae)



Bệnh thối quả, khô đọt trên cây xoài
(Diplodia natalensis)



Bệnh thối nhũn trên quả roi (mận miền
Nam)



Bệnh đốm lá trên cây hồng
(Pseudocercospora kaki)



Trang chủ



Cây trồng phong
thủy



Cây CN dài ngày



Cây CN ngắn ngày



Cây lương thực



Cây rau màu

-
-  Cây ăn quả (trái)  Cây cảnh, hoa cảnh
-
-  Cây thuốc (dược liệu)  Cây lâm nghiệp
-
-  Côn trùng hại cây trồng  Bệnh hại cây trồng
-
-  Dinh dưỡng cây trồng
-
-  Cẩm nang phân bón  Trồng trọt, chăm sóc
-
-  Khoa học nông nghiệp  Sức khỏe và làm đẹp
-



Trang chủ . Facebook . Liên hệ quảng cáo:
☎ 0336.180068 .

Copyright © 2016
www.camnangcaytrong.com

