




BỆNH ĐỐM ĐEN - ĐỐM NÂU TRÊN LÁ

Ngày 12 tháng 11 năm 2024

Bệnh đốm nâu và đốm đen trên lá là những bệnh phổ biến ảnh hưởng đến nhiều loại cây trồng, từ cây ăn trái như cam, quýt, bưởi, đến các cây rau màu như cà chua, ớt, và thậm chí cả cây cảnh. Các bệnh này thường do nấm hoặc vi khuẩn gây ra, dẫn đến hiện tượng lá bị đốm màu, khô rụng, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, làm cây suy yếu, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và các biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá.

1. Nguyên nhân gây bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá



Bệnh đốm nâu và đốm đen trên lá chủ yếu do các loại nấm và vi khuẩn gây ra. Một số loại phổ biến bao gồm:

Nấm gây bệnh: Các loại nấm như *Alternaria spp.*, *Cercospora spp.*, *Phyllosticta spp.*, *Mycosphaerella spp.*, và *Colletotrichum spp.* là tác nhân phổ biến gây ra bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá ở nhiều loại cây trồng. Nấm phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao và dễ lây lan qua gió, mưa và nước tưới.

Vi khuẩn gây bệnh: Một số loại vi khuẩn như *Xanthomonas campestris* và *Pseudomonas syringae* cũng có thể gây bệnh đốm trên lá, tạo ra các vết đốm nâu hoặc đen. Vi khuẩn thường lây lan qua nước tưới, công cụ lao động và côn trùng chích hút.

Điều kiện thời tiết và môi trường: Bệnh đốm nâu, đốm đen thường phát sinh mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều và nhiệt độ ẩm áp. Đất thoát nước kém hoặc môi trường có độ ẩm cao kéo dài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn gây bệnh phát triển.

2. Triệu chứng của bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá




Tìm

Thể Loại

Bệnh Hại

Bài viết cùng chủ đề



BMC – Tiên Phong Sản Xuất Thuốc BVTV Dạng CS (Capsule Suspension) Tại Việt Nam

Xem Thêm





Triệu chứng của bệnh đốm nâu và đốm đen khá dễ nhận biết với các dấu hiệu đặc trưng trên lá cây. Các triệu chứng này có thể xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào loại cây trồng và tác nhân gây bệnh.

2.1. Triệu chứng trên lá

Đốm nâu hoặc đốm đen: Trên lá cây xuất hiện các vết đốm nhỏ, có màu nâu hoặc đen. Ban đầu, đốm có thể xuất hiện ở một vùng nhỏ trên lá, sau đó lan rộng ra và hợp lại thành những mảng lớn hơn. Đối với một số loại cây, các đốm có thể có quầng vàng xung quanh.

Lá khô và rụng: Lá bị bệnh thường khô dần từ phần mép lá hoặc từ vết đốm, chuyển sang màu vàng hoặc nâu và có thể rụng sớm, ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và sinh trưởng của cây.

Lá bị biến dạng: Ở một số cây, các vết đốm lớn có thể làm lá bị cong vẹo, biến dạng và giảm kích thước.

2.2. Triệu chứng trên thân và quả

Đốm trên thân và cành: Ngoài lá, nấm và vi khuẩn gây bệnh có thể tấn công cành và thân cây, tạo ra các vết đốm nâu hoặc đen. Cành bị bệnh sẽ yếu đi, dễ gãy và có thể bị khô dần.

Đốm trên quả: Đối với các cây ăn trái, bệnh đốm có thể lây lan lên quả, tạo thành các đốm nâu hoặc đen làm giảm chất lượng sản phẩm. Quả bị bệnh thường không phát triển bình thường, dễ rụng và mất giá trị thương mại.

3. Tác hại của bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá



Bệnh đốm nâu và đốm đen gây ra nhiều tác hại đối với cây trồng, đặc biệt là các cây ăn trái và rau màu. Một số tác hại chính bao gồm:

Giảm năng suất và chất lượng: Bệnh đốm nâu, đốm đen làm giảm khả năng quang hợp của lá, khiến cây suy yếu và chậm phát triển, từ đó giảm năng suất và chất lượng nông sản.

Làm cây suy yếu và chết dần: Nếu bệnh không được kiểm soát, cây có thể bị suy yếu nghiêm trọng, cành lá rụng nhiều và dẫn đến chết cây, đặc biệt là các cây con hoặc cây non.

Gây mất giá trị thương mại: Đối với cây ăn trái và rau màu, bệnh đốm trên lá và quả làm giảm giá trị thương phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng.

4. Điều kiện phát sinh bệnh



Bệnh đốm nâu, đốm đen thường phát sinh và lây lan mạnh trong các điều kiện:

Thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều: Độ ẩm cao và nhiệt độ ẩm áp là điều kiện lý tưởng cho nấm và vi khuẩn phát triển. Mưa nhiều và nước đọng trên lá tạo điều kiện cho bệnh phát triển nhanh chóng.

Đất thoát nước kém: Đất bị ngập úng hoặc thoát nước kém làm cho cây trồng yếu đi và dễ bị nhiễm bệnh.

Vườn trồng có mật độ cây cao: Cây trồng với mật độ quá dày làm giảm khả năng thông thoáng, tăng độ ẩm cục bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan.

5. Biện pháp phòng trừ bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá



Để phòng và kiểm soát bệnh đốm nâu, đốm đen trên lá, cần áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp,

từ việc chọn giống kháng bệnh, cải thiện điều kiện môi trường, đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

5.1. Quản lý nước tưới và điều kiện môi trường

Tưới nước hợp lý: Tránh tưới quá nhiều nước và nên tưới vào buổi sáng để cây có thời gian khô ráo trước khi trời tối. Tránh tưới lên lá vào thời điểm chiều tối để giảm nguy cơ nước đọng trên lá qua đêm.

Cải thiện thoát nước cho đất: Đảm bảo vườn có hệ thống thoát nước tốt, đặc biệt là trong mùa mưa, tránh tình trạng đất ngập úng làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

5.2. Cắt tỉa và vệ sinh vườn

Cắt tỉa cây thường xuyên: Cắt tỉa các cành lá bị nhiễm bệnh và tiêu hủy chúng để ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Việc cắt tỉa cũng giúp vườn thông thoáng, giảm độ ẩm và hạn chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn.

Vệ sinh vườn: Dọn dẹp các tàn dư thực vật bị bệnh trong vườn sau mỗi vụ thu hoạch. Các tàn dư bị bệnh có thể là nơi lưu giữ mầm bệnh và lây lan cho các cây trồng trong vụ tiếp theo.

5.3. Bón phân hợp lý

Bón phân cân đối: Bón phân đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng giúp cây trồng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu bệnh. Đặc biệt, các loại phân bón có hàm lượng kali và canxi cao có thể giúp tăng cường độ bền của lá, hạn chế bệnh lây lan.

Sử dụng phân hữu cơ: Bón phân hữu cơ hoai mục hoặc phân vi sinh giúp cải thiện chất lượng đất, tăng cường hệ vi sinh vật có lợi và giúp cây phát triển bền vững.

5.4. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Phun thuốc phòng ngừa: Khi điều kiện thời tiết ẩm ướt và mưa nhiều, có thể phun thuốc phòng ngừa bệnh đốm lá bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật như Mancozeb, Copper oxychloride, hoặc Chlorothalonil để ngăn chặn sự phát triển của nấm. Một số thuốc có chứa hoạt chất trị bệnh hiệu quả như: [An-k-zeb 800WP](#), [Byphan 800WP](#), [Gone Super 350EC](#), [Bretil Super 300EC](#), [Scortian 80WP](#), [Thalonil](#)

Sử dụng thuốc trừ nấm và vi khuẩn: Khi phát hiện cây bị bệnh, cần phun thuốc trừ nấm hoặc vi khuẩn để kiểm soát bệnh. Cần tuân thủ liều lượng và cách sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

5.5. Biện pháp sinh học

Sử dụng chế phẩm sinh học: Các chế phẩm sinh học chứa vi sinh vật có lợi như *Trichoderma* có thể được sử dụng để ức chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh.

5.6. Chọn giống kháng bệnh

Chọn giống kháng bệnh: Đối với một số loại cây, có thể chọn các giống kháng bệnh đốm lá hoặc ít bị ảnh hưởng bởi bệnh. Sử dụng giống kháng bệnh giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh từ đầu.

6. Kết luận

Bệnh đốm nâu và đốm đen trên lá là một trong những bệnh phổ biến và gây ra nhiều thiệt hại cho cây trồng. Tuy nhiên, với sự hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng và các biện pháp phòng ngừa, người trồng có thể kiểm soát và giảm thiểu thiệt hại do bệnh gây ra.

Việc áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, bón phân đầy đủ, cắt tỉa và vệ sinh vườn thường xuyên, kết hợp với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách sẽ giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu bệnh và mang lại năng suất cao.

Tên của bạn

Email/SĐT

Tiêu đề

Bình luận

Đăng

Bình luận

Những bình luận mới nhất

Liên Hệ

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VIỆT NAM. Lô MB1-2, KCN Đức

Hòa 1, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An

☎ (HR) 0272 3777 861

☎ (Kinh Doanh) 02723 778 061

☎ (Vật Tư) 0272 3779 162

✉ nv.hcns@bmcgroup.com.vn

✉ bmchcm@gmail.com

🏠 CÔNG TY CỔ PHẦN BMC VINH PHÚC. Cụm KTXH xã Đại

Đông, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

☎ 0211 3779 985



Bản Đồ

Công Ty

> Giới Thiệu

> Thông Báo

> Sản Phẩm

> Cơ Hội Việc Làm