

← Bệnh gỉ sắt phổ biến trên mía



 Mía

Bệnh gỉ sắt phổ biến trên mía



Puccinia melanocephala

Nấm

Chữa cho cây trồng



Chụp ảnh



Xem chẩn đoán



Lấy thuốc

 Sử dụng ứng dụng Plantix

Tóm lại

- Triệu chứng ban đầu là những đốm lá màu vàng thon dài.
- Các đốm dần thay đổi màu sắc sang màu nâu đỏ.

- Lá bị ảnh hưởng nặng có thể bị hoại tử.

Cũng có thể được tìm thấy ở

1 Cây trồng

 Mía



Triệu chứng

Các triệu chứng ban đầu của bệnh gỉ sắt thông thường là các đốm lá màu vàng thon dài, dài khoảng 1–4 mm. Với sự phát triển của bệnh (chủ yếu ở bề mặt lá dưới), các đốm kéo dài song song với kiểu phân bố của gân lá. Chúng lan rộng lên tới 20 mm chiều dài và từ một đến ba mm chiều rộng. Chúng cũng biến thành những vệt màu nâu cam hoặc nâu đỏ với một vàng hào quang úa vàng mảnh nhưng dễ thấy. Sau đó, các nốt mụn gỉ sắt vỡ ra. Điều này dẫn đến vỡ lớp biểu bì lá và sự phát triển của các vùng hoại tử. Các thương tổn thường dày đặc hơn ở gần chóp lá và giảm số lượng về phía gốc.

Các khuyến nghị

Kiểm soát hữu cơ

Rất tiếc, chúng tôi không biết bất kỳ phương pháp điều trị thay thế nào chống lại bệnh gỉ sắt *Puccinia melanocephala*. Hãy liên lạc với chúng tôi trong trường hợp bạn biết điều gì đó có thể giúp chống lại căn bệnh này. Mong được nghe từ bạn.

Kiểm soát hóa học

Nếu có thể, hãy luôn cân nhắc giải pháp dung hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và các biện pháp xử lý sinh học. Điều trị bằng thuốc diệt nấm có thể không hiệu quả về mặt kinh tế và không thực tế.

Nguyên nhân gây bệnh

Độ ẩm tương đối 98% và đêm mát mẻ sau đó là ngày ẩm áp với nhiệt độ từ 20°C đến 25°C tạo thuận lợi cho bệnh gỉ sắt. Lá liên tục ẩm ướt (chín giờ trở lên) cũng hỗ trợ cho sự lây lan của bệnh. Trong điều kiện thuận lợi, chu kỳ lây nhiễm của bệnh gỉ sắt (*Puccinia melanocephala*) kéo dài dưới 14 ngày. Cây có tuổi từ hai đến sáu tháng dễ bị bệnh gỉ sắt nhất.

Biện pháp Phòng ngừa

- Trồng các giống kháng bệnh.
- Đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho đất.
- Đảm bảo cung cấp đủ nước cho đất trong thời kỳ sinh trưởng.
- Áp dụng phương pháp trồng theo luống dài hoặc ghép hàng đôi.
- Loại bỏ và đốt phần thừa còn lại và thu hoạch rác của cây trồng bị ảnh hưởng.

Chia sẻ



Tải xuống Plantix



Dành cho nông dân

Ứng dụng Plantix

Tìm sản phẩm

Dành cho doanh nghiệp

Demand Creation

Book a Demo

Dành cho doanh nghiệp

API Toolkit

Crop Insights

Công ty

Cơ hội nghề nghiệp

Báo chí và Truyền thông



© 2026 Plantix

Ấn hiệu

Thông báo bảo mật

 **Tiế**

Điều khoản sử dụng

Quản lý cookie

Sơ đồ website