



Bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô (*Zea mays*) là một trong những bệnh phổ biến, gây thiệt hại đáng kể về năng suất và chất lượng hạt, đặc biệt ở các vùng trồng ngô chuyên canh. Bệnh do nấm *Exserohilum turcicum* (tên cũ: *Helminthosporium turcicum*) gây ra, xuất hiện trên khắp các vùng trồng ngô tại Việt Nam, từ đồng bằng đến miền núi. Bài viết này **ABA Chemical** trình bày chi tiết triệu chứng, tác nhân gây bệnh, điều kiện phát triển, tác hại, và các biện pháp phòng trừ tổng hợp, giúp bà con nông dân giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả canh tác.

Mục lục bài viết

- I. Triệu chứng của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô
- II. Tác nhân gây bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô
- III. Điều kiện phát triển của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô
- IV. Tác hại của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô
- V. Biện pháp phòng trừ bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô
- VI. Lưu ý khi phòng trừ bệnh đốm lá lớn
- Câu hỏi thường gặp (FAQ)
 - 1. Tại sao ngô bị đốm lá lớn dù đã chăm sóc kỹ?
 - 2. Làm sao nhận biết bệnh đốm lá lớn và đốm lá nhỏ?
 - 3. Có nên phun thuốc khi ngô đang trổ cờ?
- Kết luận

Tên khoa học	<i>Helminthosporium turcicum</i> Pass
Tên thông thường	Bệnh đốm lá lớn

I. Triệu chứng của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô

- Vị trí xuất hiện:** Bệnh chủ yếu tấn công phiến lá, nhưng cũng có thể xuất hiện trên bẹ lá, bao bắp, và đôi khi trên thân. Bệnh thường bắt đầu từ các lá già sát gốc, sau lan dần lên lá bánh tẻ và các lá phía trên ngọn, đặc biệt từ giai đoạn cây có 7-8 lá trở đi.
- Hình dạng và đặc điểm vết bệnh:**
 - Vết bệnh ban đầu là các vết nhỏ, dạng ngấm nước, màu xám hoặc nâu nhạt.
 - Sau đó, vết bệnh lớn dần, hình thoi hoặc sọc dài không đều, kích thước từ 0,3-3 cm, đôi khi dài tới 5-10 cm, màu nâu sáng ở trung tâm và viền nâu tối.
 - Trong điều kiện ẩm ướt, trên bề mặt vết bệnh xuất hiện lớp mốc đen nhỏ, là các cành bào tử phân sinh và bào tử của nấm (*Exserohilum turcicum*).
 - Khi bệnh nặng, các vết bệnh liên kết thành mảng lớn, làm lá khô táp, rách ở chóp lá, mất màu, héo khô, và giòn.
- Thời điểm xuất hiện:** Bệnh thường phát triển mạnh từ giai đoạn cây ngô trổ cờ (tháng 4-6 ở miền Bắc, tháng 7-9 ở miền Nam) đến khi làm hạt, đặc biệt ở các ruộng chăm sóc kém, đất xấu, hoặc thời tiết mưa ẩm kéo dài.





Vết bệnh ban đầu là các vết nhỏ, dạng ngậm nước, màu xám hoặc nâu nhạt.

II. Tác nhân gây bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô

- **Tác nhân chính:** Bệnh đốm lá lớn do nấm *Exserohilum turcicum* (*Helminthosporium turcicum* Pass), thuộc họ *Pleosporaceae*, lớp Nấm Bất Toàn (*Deuteromycetes*), giai đoạn hữu tính thuộc lớp Nấm Túi (*Ascomycetes*). Bào tử phân sinh của nấm có dạng hình thoi, tương đối thẳng, ít cong, màu nâu vàng, kích thước 45-152 x 15-25 µm, có 2-9 ngăn ngang.
- **Nguồn bệnh:** Bào tử phân sinh tồn tại trên hạt giống, tàn dư cây bệnh (lá, thân, bẹ lá) trong đất, hoặc trên cỏ dại thuộc họ Hòa thảo (*Gramineae*). Sợi nấm trong tàn dư cây bệnh là nguồn lây nhiễm chính cho vụ sau, đặc biệt ở các ruộng không vệ sinh kỹ sau thu hoạch.
- **Phương thức lây lan:** Nấm xâm nhập qua lỗ khí khổng hoặc trực tiếp qua biểu bì lá. Bào tử nấm phát tán qua gió, nước mưa, hoặc côn trùng (như rệp ngô *Aphis maydis*), đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt. Thời kỳ tiềm dục của bệnh kéo dài 3-8 ngày, tùy thuộc vào tuổi cây và trạng thái lá.

III. Điều kiện phát triển của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô

Bệnh đốm lá lớn phát triển mạnh trong các điều kiện sau:

- **Nhiệt độ:** Nấm sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 28-30°C, phù hợp với khí hậu ẩm áp của Việt Nam, đặc biệt vào mùa xuân hè và hè thu.
- **Độ ẩm:** Độ ẩm cao (>80%) và mưa ẩm kéo dài tạo điều kiện cho bào tử nấm nảy mầm và lây lan nhanh. Bệnh thường nặng ở các ruộng ngập úng, trũng thấp, hoặc trồng dày.
- **Chất lượng đất và chăm sóc:** Đất nghèo dinh dưỡng, chặt, dễ đóng váng, hoặc bón phân không cân đối (thiếu kali, thừa đạm) làm cây ngô sinh trưởng kém, dễ nhiễm bệnh. Ruộng ngô chăm sóc kém, thiếu nước, hoặc trồng liên tục nhiều vụ mà không luân canh là môi trường lý tưởng cho nấm phát triển.
- **Giống ngô:** Các giống ngô địa phương (như *Iova*, *Ganha 2*, *Găng 5*) thường bị bệnh nặng hơn các giống lai (*LVN4*, *LVN10*, *Q2*). Ngô trồng mật độ quá dày (trên 70.000 cây/ha) làm ruộng thiếu thông thoáng, tăng nguy cơ bệnh.

IV. Tác hại của bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô

- **Ảnh hưởng đến cây ngô:** Bệnh làm giảm khả năng quang hợp do lá bị tổn thương, dẫn đến cây còi cọc, sinh trưởng kém, lá vàng và tàn lụi sớm. Khi bệnh nặng, lá cháy khô hàng loạt, cây có thể chết, đặc biệt ở giai đoạn cây con (3-5 lá).
- **Thiệt hại năng suất:** Năng suất ngô giảm 12-30% ở điều kiện bình thường, thậm chí lên tới 40% nếu bệnh xảy ra sớm và không được kiểm soát. Bắp ngô nhỏ, hạt lép, chất lượng kém, ảnh hưởng đến giá trị thương mại, đặc biệt với ngô ngọt và ngô rau.
- **Ảnh hưởng kinh tế:** Tăng chi phí phòng trừ (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, công lao động). Giảm thu nhập do sản lượng thấp và chất lượng hạt không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bệnh làm giảm khả năng quang hợp do lá bị tổn thương, dẫn đến cây còi cọc, sinh trưởng kém, lá vàng và tàn lụi sớm.

V. Biện pháp phòng trừ bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô

Để quản lý bệnh đốm lá lớn hiệu quả, cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, ưu tiên phòng ngừa và kết hợp canh tác, sinh học, và hóa học:

- **Biện pháp canh tác:**
 - **Chọn giống kháng bệnh:** Sử dụng các giống ngô lai có khả năng chống chịu bệnh như *LVN4*, *LVN10*, *Q2*, hoặc các giống nhập nội được kiểm chứng. Xử lý hạt giống bằng thuốc *Rovral* (2 g/10 kg hạt) hoặc *Dithane M45* (3 g/kg hạt) trước khi gieo để loại bỏ bào tử nấm.
 - **Luân canh cây trồng:** Luân canh ngô với lúa nước, đậu tương, hoặc rau màu (cải, ngò) để cắt đứt nguồn nấm trong đất. Tránh trồng liên tục ngô trên cùng một chân đất nhiều vụ.
 - **Vệ sinh đồng ruộng:** Thu gom và tiêu hủy tàn dư cây bệnh (lá, thân, bẹ lá) bằng cách đốt hoặc chôn sâu sau thu hoạch. Làm đất kỹ, cày xới, ngâm nước ruộng để diệt hạch nấm và bào tử trong đất.
 - **Điều chỉnh mật độ trồng:** Trồng ngô với mật độ hợp lý (60.000-70.000 cây/ha, khoảng cách 70 x 20-25 cm), tỉa định cây khi cây cao 25-30 cm để ruộng thông thoáng. Loại bỏ cây còi cọc, yếu để giảm nguồn lây bệnh.
 - **Tưới tiêu hợp lý:** Chủ động tưới nước (20-30 lít/cây/ngày) trong giai đoạn cây con và trổ cờ, giữ độ ẩm đất 70-80%. Đào rãnh thoát nước (sâu 20-30 cm) để tránh ngập úng khi mưa nhiều.
- **Quản lý dinh dưỡng:**
 - **Bón phân cân đối:** Bón lót phân hữu cơ hoai mục (10-15 tấn/ha) kết hợp phân vi sinh (*Trichoderma spp.*, 5-10 kg/ha) để cải thiện đất. Bón thúc kali cao (*NPK 10-10-20*, 300-400 kg/ha) và phân bón lá chứa kẽm, bo (*Growmore 10-10-60 + Zn*, 20-30 ml/bình 16 lít) vào giai đoạn 4-6 lá và trước trổ cờ. Hạn chế bón thừa đạm (*ure*, *NPK 20-20-15*) để tránh cây phát triển lá quá mức, dễ nhiễm bệnh.
 - **Cải thiện đất:** Rắc vôi bột (500-700 kg/ha) quanh gốc trước mùa mưa để nâng pH đất (5,5-6,5), giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
- **Biện pháp sinh học:**
 - **Chế phẩm vi sinh:** Sử dụng *BS02 – Tika* (250 g/400 lít nước) hoặc chế phẩm chứa *Chaetomium spp.* và *Trichoderma spp.* để phun phòng bệnh. Các vi nấm này cạnh tranh dinh dưỡng và tiết enzyme tiêu diệt nấm *Exserohilum turcicum*. Phun 3-4 lần/vụ, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày, vào giai đoạn cây 3-4 lá và 7-8 lá.
 - **Thiên địch:** Trồng xen cúc vạn thọ hoặc rau ngò quanh ruộng để thu hút bọ rùa (*Coccinella repanda*, *Chilomenes sexmaculata*), giúp tiêu diệt rệp ngô – trung gian truyền bệnh.
 - **Chitosan và dầu neem:** Phun *Chitosan* (10-15 ml/bình 16 lít) hoặc *Dầu neem* (10-15 ml/bình 16 lít) để tăng sức đề kháng cây và hạn chế nấm bệnh.
- **Biện pháp hóa học:**
 - **Thuốc đặc trị:** Phun *Asmaitop 325SC* (hỗn hợp *Azoxystrobin + Difenoconazole*, 50 ml/25 lít, 2 bình/1000 m²) hoặc *Tilt Super 300EC* (10-15 ml/bình 16 lít) khi bệnh chớm xuất hiện. Các thuốc khác hiệu quả: *Amistar Top 325SC*, *Anvil 5SC*, *Dithane M45* (20-30 g/bình 16 lít), hoặc *Boocdo 1%* (100-150 ml/bình 16 lít). Phun 2-3 lần, cách nhau 5-7 ngày, vào giai đoạn cây 3-4 lá, 7-8 lá, hoặc trước trổ cờ.
 - **Lưu ý khi phun thuốc:** Phun vào chiều mát, ướt đều hai mặt lá và vùng đất dưới gốc. Tuân thủ thời gian cách ly (7-14 ngày trước thu hoạch, đặc biệt với ngô ngọt và ngô rau). Tránh lạm dụng thuốc hóa học để bảo vệ thiên địch và môi trường.
- **Ứng dụng công nghệ:**

- **Máy bay phun thuốc:** Sử dụng máy bay không người lái (*DJI Agras T40, XAG P40*) để phun thuốc đều, tiết kiệm 30% thuốc và 90% nước, đặc biệt ở các vùng đồi núi.
- **Cảm biến thời tiết:** Lắp cảm biến độ ẩm, nhiệt độ để dự báo thời điểm bệnh dễ bùng phát, từ đó phun thuốc phòng ngừa kịp thời.

Thu gom và tiêu hủy tàn dư cây bệnh (lá, thân, bẹ lá) bằng cách đốt hoặc chôn sâu sau thu hoạch.

VI. Lưu ý khi phòng trừ bệnh đốm lá lớn

- **Theo dõi ruộng ngô:** Thăm ruộng 5-7 ngày/lần, đặc biệt từ giai đoạn 4-6 lá đến trổ cờ, để phát hiện sớm vết bệnh.
- **Kiểm tra thời tiết:** Theo dõi dự báo thời tiết để che mưa hoặc tưới bổ sung khi khô hạn, tránh tạo điều kiện cho nấm phát triển.
- **Hạn chế thuốc hóa học:** Ưu tiên chế phẩm sinh học (*BS02 – Tika, Trichoderma*) để bảo vệ môi trường và sức khỏe người dùng.
- **Tham khảo chuyên gia:** Liên hệ cán bộ khuyến nông hoặc trung tâm bảo vệ thực vật (như Chi cục Bảo vệ Thực vật Nam Định) để được tư vấn giống, thuốc, và kỹ thuật phù hợp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Tại sao ngô bị đốm lá lớn dù đã chăm sóc kỹ?

Có thể do tàn dư cây bệnh từ vụ trước, hạt giống nhiễm nấm, hoặc thời tiết mưa ẩm kéo dài. Cần vệ sinh ruộng, xử lý hạt giống, và phun phòng *BS02 – Tika* hoặc *Amistar Top*.

2. Làm sao nhận biết bệnh đốm lá lớn và đốm lá nhỏ?

Đốm lá lớn: Vết bệnh hình thoi, sọc dài (5-10 cm), màu nâu/xám, không có quầng vàng, xuất hiện từ lá già (7-8 lá trở đi).

Đốm lá nhỏ: Vết bệnh tròn/bầu dục, kích thước nhỏ (5-6 mm), màu nâu/xám, có quầng vàng, xuất hiện sớm từ 2-3 lá.

3. Có nên phun thuốc khi ngô đang trổ cờ?

Hạn chế phun thuốc hóa học khi ngô trổ cờ để tránh ảnh hưởng phần hoa và côn trùng thụ phấn. Nếu cần, dùng chế phẩm sinh học (*Chitosan, Dầu neem*) vào chiều mát.

Kết luận

Bệnh đốm lá lớn hại bắp ngô là một mối đe dọa lớn đối với năng suất và chất lượng vụ mùa,

đặc biệt trong điều kiện thời tiết ẩm ướt và chăm sóc kém. Bằng cách áp dụng các biện pháp tổng hợp như chọn giống kháng bệnh (*LVN10, Q2*), luân canh cây trồng, vệ sinh đồng ruộng, bón phân cân đối, và sử dụng chế phẩm sinh học (*BS02 – Tika*) hoặc thuốc hóa học (*Asmaitop 325SC, Tilt Super*), bà con có thể kiểm soát hiệu quả bệnh đốm lá lớn. Việc phát hiện sớm, chăm sóc đúng kỹ thuật, và ứng dụng công nghệ (*máy bay phun thuốc, cảm biến thời tiết*) là chìa khóa để đảm bảo vụ mùa ngô năng suất cao, chất lượng tốt. Chúc bà con nông dân thành công trong việc phòng trừ bệnh và đạt vụ mùa ngô như ý!

Xem thêm nhiều hơn tại Website ABA Chemical

ABA CHEMICAL

- > Trang chủ
- > Giới thiệu
- > Dữ liệu
- > Bài viết kỹ thuật
- > Liên hệ

SẢN PHẨM

- > Phân bón
- > Thuốc BVTV
- > Nguyên liệu

GIẢI PHÁP

- > Gia công & Sản xuất
- > R&D
- > Khảo nghiệm sản phẩm

Office address: B18-QL1A, KDC TTVH Tây Đô, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Factory address: Số 86-QL1A, KV Yên Thạnh, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

Hotline/Zalo: 0877 877 655 – 0899 476 777

Email: abachemical.com@gmail.com