



Bệnh gỉ sắt gây hại trên cây ngô (bắp) và biện pháp phòng trừ

Bên cạnh bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, thì bệnh gỉ sắt cũng là một trong những bệnh hại ngô phổ biến tại các vùng trồng ngô của nước ta. Hiện nay đã có rất nhiều loại thuốc đặc trị bệnh gỉ sắt trên cây ngô. Tuy nhiên, việc quan trọng là bà con cần hiểu rõ đặc điểm phát sinh, gây hại của bệnh để sớm có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Hiểu về bệnh gỉ sắt gây hại trên cây ngô

1. Tác nhân gây bệnh gỉ sắt hại ngô

 Tác nhân gây ra bệnh gỉ sắt trên ngô là nấm *Puccinia maydis*, thuộc bộ Uredinales, lớp Nấm Đ.

– *Puccinia maydis* là nấm gỉ sắt chu trình lớn (vòng đời đầy đủ hình thành tới 5 loại bào tử): Bào tử đảm – bào tử giống – bào tử xuân – bào tử hạ – và bào tử đông).

– *Puccinia maydis* là nấm gỉ sắt dị chủ: hoàn thành vòng đời đầy đủ trên 2 cây ký chủ là ngô và

chua me đất.

– Nấm *Puccinia maydis* không phải là tác nhân truyền qua hạt giống mà là bằng bào tử phát tán qua không khí.

– Trên cây ngô, nấm *Puccinia maydis* có thể bắt đầu quá trình xâm nhiễm bằng bào tử xuân hoặc bào tử hạ.

– Bào tử hạ có thể tồn tại lâu dài trên tàn dư lá bệnh ở ruộng và trên hạt qua năm, bào tử hạ nảy mầm ở nhiệt độ 14 – 32°C nhưng thích hợp nhất là 17 – 18° C, trong điều kiện độ ẩm bão hòa.

2. Điều kiện phát sinh phát triển của bệnh gỉ sắt gây hại trên cây ngô

– Trong điều kiện cây ngô được trồng quanh năm, nguồn bệnh chủ yếu là bào tử hạ từ tàn dư cây ngô từ vụ trước.

– Trong điều kiện cây ngô không được trồng quanh năm, nguồn bệnh chủ yếu là bào tử xuân hình thành trên cây chua me đất.

– Ở nước ta, sự lây lan và bảo tồn nguồn bệnh chủ yếu bằng bào tử hạ trên tàn dư cây vụ trước.

– Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết ôn hòa, nhiệt độ trung bình, có mưa.

– Ngô xuân hè và hè thu bị bệnh nặng hơn ở miền trung du, miền núi trên giống ngô mới nhập nội và ngô lai, vào cuối vụ bệnh có thể phát triển mạnh trên toàn cây làm lá nhỏ và cây lụi, bắp nhỏ đi rất nhiều.

3. Dấu hiệu nhận biết cây ngô bị bệnh gỉ sắt

– Bệnh gỉ sắt gây hại chủ yếu ở phiến lá, có khi ở bẹ và lá bì.

– Trên bề mặt lá có các ổ nổi (khoảng 1mm) chứa một khối bột màu nâu đỏ hoặc vàng gạch non (là các ổ bào tử hạ). Đến cuối giai đoạn sinh trưởng của ngô, trên lá hình thành các ổ nổi màu đen là ổ bào tử đông. Vết bệnh thường dày đặc trên lá dễ làm lá cháy khô.

Biện pháp phòng trừ bệnh gỉ sắt hại ngô

1. Biện pháp canh tác ngăn ngừa bệnh gỉ sắt cho ngô

– Vệ sinh đồng ruộng, thu dọn sạch tàn dư thực vật của vụ trước mang đi tiêu hủy bằng cách phơi khô, đốt. Cày xới đất chôn vùi gốc, thân lá bắp còn sót lại sẽ hạn chế bệnh vụ sau.

– Trồng mật độ thích hợp, vừa phải, không trồng dày. thường mật độ trồng thay đổi từ 60.000

cây – 70.000 cây/ Ha. Khoảng cách 70×20 cm -70×25 cm/1 hạt.

– Dùng các giống kháng bệnh gỉ sắt.

– Chăm sóc tốt, bón phân cân đối, hợp lý, không bón thừa đạm, liên tục ngắt tỉa lá già, lá bệnh, tạo độ thoáng đáng cho ruộng ngô.

2. Biện pháp hóa học phòng trị bệnh gỉ sắt trên cây ngô

– Hiện Việt Thắng có các loại thuốc đặc trị bệnh gỉ sắt trên cây ngô hiệu quả cao như Supertim 300EC, A.V.T Vil 5SC, Fovathan 80WP. Bà con có thể liên hệ hotline 089 958 3456 để được cung cấp thông tin đại lý gần nhất.

– Lưu ý sử dụng liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, khi phun cần nâng cao cần để thuốc thấm hết hai mặt của lá và từ trên ngọn xuống. Nên phun vào những buổi chiều mát.

– Trường hợp ruộng bị bệnh nặng thì sau khi phun thuốc cần tăng cường bổ sung phân bón và tưới đủ ẩm để ruộng ngô phục hồi nhanh.

Xem thêm:

- **Bệnh thán thư trên cây hành lá và biện pháp phòng trừ**
- **Bệnh chổi rồng trên cây nhãn và biện pháp phòng trừ**
- **Các ký hiệu EC, SC, SL, WP, WG trong thuốc bảo vệ thực vật là gì?**
- **Bệnh đốm nâu trên cây thanh long và biện pháp phòng trừ**
- **Rầy nâu hại lúa và các biện pháp phòng trừ rầy nâu hại lúa**



Bài viết cùng chủ đề:



Đảm bảo an toàn cho sản xuất trồng trọt trước rét



TOP 3 thuốc đặc trị sâu tơ trên rau màu an toàn, hiệu



Bệnh thối đọt non trên cây ớt và biện pháp phòng trừ

đậm, rét hại



Độ ẩm đất thích hợp cho cây hành lá vụ đông

quả của Việt Thắng



Các biện pháp kỹ thuật chăm sóc mai Tết



Sóc Trăng: Giá lúa đông xuân 2023 – 2024 cao nhất lịch sử



Quảng Trị: Hơn 500ha cao su chết dần vì bệnh lạ



nguy cơ sâu bệnh vụ đông xuân



thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc



Kỹ thuật tưới nước cho cây cà phê trong mùa khô ở Tây Nguyên



bệnh phấn trắng trên cây dưa chuột



ruồi đục lá hại dưa chuột

Kỹ thuật tưới nước cho cây cà phê trong mùa khô ở Tây Nguyên



lưu ý khi gieo sạ lúa đông xuân

Bệnh phấn trắng trên cây dưa chuột (dưa leo) và biện pháp phòng trừ



phòng trừ rầy xanh gây hại trên cây sầu riêng

Ruồi đục lá hại dưa chuột và các biện pháp phòng trừ



Phòng trừ chuột gây hại cây trồng

Một số lưu ý khi gieo sạ

Rầy xanh hại sầu riêng và

Chuột gây hại cây trồng

 **Thuốc đặc trị bệnh đạo ôn
gây hại trên lúa**

**Top 5 thuốc đặc trị bệnh
đạo ôn trên lúa tốt nhất
của Việt Thắng**

Đề lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

☐ Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Gửi Bình Luận



VITHACO Hà Nội đã khẳng định được vị thế trên thị trường thuốc bảo vệ thực vật với những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, tối ưu chi phí, góp phần quan trọng vào quá trình tạo nên nền nông nghiệp phát triển bền vững.



THÔNG TIN CHUNG

- Giới thiệu
- Tầm nhìn - sứ mệnh
- Thư ngỏ
- Giá trị cốt lõi
- Liên hệ



**Hotline: 089
958 3456**

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội

- **Địa chỉ:** Tòa nhà Việt Thắng Hà Nội - Tổ 11, Phường Phúc Lợi, Thành phố Hà Nội
- **Điện thoại:** 089 958 3456
- **Email:** vithacohanoi@gmail.com
- **Website:** www.vietthanghanoi.vn

FANPAGE FACEBOOK



Holtine tư vấn: 089 958 3456

© Copyright 2026 Công ty TNHH Việt Thắng Hà Nội