

Clifford-BEM: Ausarbeitung zu AP 3

Teil I: $\mathcal{H}$ -Matrix mit Adaptiver Kreuzapproximation;
kombinierter Löser am Würfel

Arbeitsstand, Version 0.5

Überblick

Grundlage ist der Galerkin-Prototyp aus AP 2 mit stückweise konstanten Multivektor-Dichten auf ebenen Dreiecken. Der Randoperator E_k wird hierarchisch komprimiert (`hmat.py`), und die Formulierung T_1 wird mit GMRES über das komprimierte Matrix-Vektor-Produkt gelöst (`scatter_h.py`).

Ergebnisse.

- Der Fehler des Matrix-Vektor-Produkts folgt der Toleranz: $\approx 0,1 \varepsilon$.
- Bei 3920 Dreiecken (31360 Unbekannte) braucht der Operator 270 MB statt 15 GB für die dichte Matrix.
- Die Streurechnung auf der Kugel ist jetzt bis 23040 Unbekannte möglich. Für Glas ergibt die Extrapolation $Q_{\text{ext}} = 0,21511$ gegenüber Mie 0,21510.
- Die gemeinsame Kreuzapproximation aller Kernkomponenten spart gegenüber der komponentenweisen 10 bis 19 % Speicher bei gleicher Genauigkeit (H3, erster Teil).
- Nahezu lineare Komplexität (H3, zweiter Teil): Im Python-Bereich (bis 3920 Dreiecke) wuchs der Speicher noch wie $N^{1,39}$. Mit dem C++-Kern bis 20480 Dreiecke zeigt sich $\mathcal{O}(N \log^2 N)$ (Abschnitt 6).
- Am Würfel arbeiten Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung zusammen: Die GMRES-Iterationen sind von der Kantenauflösung unabhängig (Abschnitt 5).

1 Konzept

Was komprimiert wird. Für ein Dreieckspaar ist der Galerkin-Block

$$E_{ij} = -\frac{2}{\sqrt{|\tau_i||\tau_j|}} L((s_{ij} + \mathbf{v}_{ij}) \mathbf{n}_j), \quad (s_{ij}, \mathbf{v}_{ij}) = \int_{\tau_i} \int_{\tau_j} \Phi_k(x - y) dS_y dS_x.$$

Gespeichert werden nur die vier Kernkomponenten $K_c(i, j)$, also s und die drei Komponenten von $\mathbf{v}$, nicht die 8×8 -Blöcke. Weil E_{ij} linear in K_c ist, lässt sich das Matrix-Vektor-Produkt schreiben als

$$(Ex)_i = -\frac{2}{\sqrt{|\tau_i|}} \sum_{c=0}^3 \sum_j K_c(i, j) z_j^c, \quad z_j^c = \frac{L(\mathbf{e}_c \mathbf{n}_j) x_j}{\sqrt{|\tau_j|}}, \quad \mathbf{e}_0 = 1.$$

Das spart gegenüber den Blöcken den Faktor 16, schon bevor komprimiert wird.

Clusterbaum und Zulässigkeit. Der Clusterbaum entsteht durch Halbierung entlang der längsten Achse der Schwerpunkte, mit höchstens 32 Dreiecken je Blatt. Ein Blockpaar (τ, σ) ist zulässig, wenn $\min(\text{diam } \tau, \text{diam } \sigma) \leq \eta \text{dist}(\tau, \sigma)$ mit $\eta = 1$ gilt. Außerdem muss $\text{dist} > 3h_{\max}$ sein, damit alle Paare im Fernfeld der Gauß-Regel liegen, und $k \text{diam} < 20$. Unzulässige Blätter werden dicht mit der Nahfeldbehandlung aus AP 2 assembliert; diese ist jetzt über die Nachbardreiecke vektorisiert.

Kreuzapproximation. Verwendet wird ACA mit partieller Pivotisierung und Abbruch bei $\|u_k\| \|v_k\| \leq \varepsilon \|S_k\|_F$, danach eine QR/SVD-Nachkompression. Bei komplexen Faktoren muss es in der Nachkompression $V = Q_V Z^T$ heißen und nicht $Q_V Z^H$; die konjugierte Variante erzeugte Blockfehler von 20 bis 75 %.

Zwei Varianten.

- *komponentenweise*: vier getrennte ACAs für die vier Kernkomponenten. Speicher $\sum_c r_c(|\tau| + |\sigma|)$.
- *gemeinsam*: eine ACA auf der gestapelten Matrix $|\tau| \times 4|\sigma|$. Die Zeilenfaktoren und Pivots werden also über die Grade geteilt. Speicher $r(|\tau| + 4|\sigma|)$.

Eine echte Block-ACA mit 8×8 -Pivotblöcken ist noch nicht umgesetzt.

2 Genauigkeit und Variantenvergleich

Kugel mit 1280 Dreiecken, $k = 1,5$. Der Fehler ist der relative Fehler des Matrix-Vektor-Produkts gegenüber 40 exakt assemblierten Zeilen (`test_hmat_large.py`):

ε	Fehler	gemeinsam		komponentenweise		
		Niedrigrang	Aufbau	Fehler	Niedrigrang	Aufbau
10^{-3}	$9,4 \cdot 10^{-5}$	18,8 MB	35 s	$9,5 \cdot 10^{-5}$	20,9 MB	53 s
10^{-4}	$1,1 \cdot 10^{-5}$	25,1 MB	37 s	$9,8 \cdot 10^{-6}$	31,1 MB	62 s
10^{-5}	$1,1 \cdot 10^{-6}$	35,0 MB	40 s	$1,0 \cdot 10^{-6}$	41,8 MB	72 s

Bei gleicher Genauigkeit spart die gemeinsame Variante 10, 19 bzw. 16 % Speicher in den Niedrigrangblöcken. Sie ist beim Aufbau schneller, und ihr Matrix-Vektor-Produkt ebenfalls (0,14 s gegenüber 0,20–0,24 s). Das stützt den ersten Teil von H3 in mäßigem Umfang. Die dichten Nahblöcke (29 MB) sind bei beiden Varianten gleich.

3 Skalierung

Gemeinsame Variante, $\varepsilon = 10^{-4}$, $k = 1,5$:

N	Unbekannte	$\mathcal{H}$ gesamt	davon Niedrigrang	dichter Kern	Aufbau	Mat-Vek
720	5 760	25,6 MB	4,7 MB	32 MB	17 s	0,07 s
1280	10 240	53,7 MB	25,1 MB	100 MB	37 s	0,14 s
2000	16 000	114,4 MB	37,8 MB	244 MB	55 s	0,25 s
2880	23 040	166,7 MB	89,9 MB	506 MB	93 s	0,35 s
3920	31 360	269,9 MB	120,9 MB	938 MB	124 s	0,53 s

Die dichte E -Matrix mit 8×8 -Blöcken hätte bei $N = 3920$ etwa 15 GB. Fehler in allen Fällen $0,85$ bis $1,1 \cdot 10^{-5}$.

Der Kompressionsfaktor gegenüber dem dichten Kern steigt von 1,2 auf 3,5. Eine Ausgleichsgerade ergibt Speicher $\propto N^{1,39}$ und Aufbauzeit $\propto N^{1,18}$; Speicher/ $(N \log N)$ steigt noch leicht an. Der Bereich ist also präasymptotisch: Mit wachsendem N werden immer größere Blöcke zulässig, und die strenge Bedingung $\text{dist} > 3h$ hält viele Blätter dicht (bei $N = 3920$ sind 55 % des Speichers dichte Nahblöcke). Nahezu lineare Komplexität (H3, zweiter Teil) ist damit weder gezeigt noch widerlegt. Nötig sind größere N und eine Abstimmung von Blattgröße und Zulässigkeit.

4 Streuung jenseits der dichten Grenze

Gelöst wird $T_1 h = h^{\text{inc}}$ mit GMRES (Neustart 200, Toleranz 10^{-6}) und der punktweisen Vorkonditionierung $2(1 + J)^{-1}$. Beide Operatoren E_{k_1} und E_{k_2} sind als $\mathcal{H}$ -Matrizen gespeichert. Die Werte für $N \leq 500$ stammen aus der dichten Rechnung in AP 2.

N	Unbekannte	Glas, $\omega a = 1$		Gold, $\omega a = 0,5$	
		Q_{ext}	GMRES	Q_{ext}	GMRES
500 (dicht)	4 000	0,20721	12	0,64732	35
720	5 760	0,20959	10	0,63429	26
1280	10 240	0,21198	10	0,61987	25
2000	16 000	0,21310	10	0,61226	25
2880	23 040	0,21371	10	0,60764	25
extrapoliert ($N = 1280, 2000, 2880$)		0,21511		0,59247	
Mie		0,21510		0,59002	

Die GMRES-Zahlen der dichten Zeile bei $N = 500$ sind ohne Neustart und mit Toleranz 10^{-8} ermittelt und daher nicht direkt vergleichbar. Mit $\mathcal{H}$ -Matrizen und gleicher Einstellung sind die Iterationszahlen von N unabhängig.

Für Glas ist die Konvergenz sauber zweiter Ordnung ($p = 1,99$), und die Extrapolation trifft Mie auf $4 \cdot 10^{-5}$. Für Gold ist die beobachtete Ordnung $p \approx 1,46$ geringer, und die Extrapolation liegt 0,4 % über Mie. Die Ursache ist noch offen. Plausibel sind die Kanten des Polyeders, auf die plasmonische Antworten empfindlich reagieren, sowie die langsam konvergente Nahfeldquadratur (AP 2). Die Komprimierung ist nicht die Ursache, denn ihr Fehler liegt bei 10^{-5} .

5 Würfel: Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung kombiniert

Netz. Damit die Kantenblöcke aus AP 2.5 nicht entlang der Kante wachsen, wird jede Seitenfläche in drei Zonen zerlegt (`cube_aniso.py`): ein grobes Innenquadrat (4×4), vier Kantenstreifen, die nur *quer* zur Kante geometrisch gradiert sind (Breite 0,5, L Schichten, entlang der Kante 4 Elemente), und vier Eckquadrate, die in beiden Richtungen gradiert sind. An den Zonengrenzen entstehen hängende Knoten; für stückweise konstante L^2 -Ansätze ist das zulässig. Die Spurtrennung gilt auf dem nichtkonformen Netz mit 2 bis 7 % Fehler bei 432 Dreiecken. Das ergibt 768, 1200, 1728 und 2352 Dreiecke für $L = 2, \dots, 5$.

Löser. E_{k_1} und E_{k_2} werden als $\mathcal{H}$ -Matrizen gespeichert ($\varepsilon = 10^{-4}$, ohne Symmetriezerlegung). Die Kanten- und Eckblöcke (Radius $R = 0,25$) werden exakt mit Nahfeld assembliert und dicht per LU invertiert. Außerhalb der Blöcke wird $(\frac{1}{2}(1 + J))^{-1}$ verwendet. GMRES läuft rechtsvorkonditioniert, mit Neustart 300 und Toleranz 10^{-6} (`cube_h.py`), bei $\omega a = 0,5$.

L	N	$\kappa = -3 + 0,3i$			Gold $-11 + 1,2i$		
		ohne	Blöcke	σ_{ext}	ohne	Blöcke	σ_{ext}
2	768	73	49	18,235	64	45	19,909
3	1200	84	50	18,686	67	47	19,651
4	1728	96	49	18,593	69	47	19,404
5	2352	106	49	18,326	71	47	19,243

$\mathcal{H}$ -Speicher beider Operatoren: 50, 99, 169, 254 MB. Größter Block: 192, 416, 608, 800 Unbekannte. Nur mit $2(1 + J)^{-1}$: 66 bzw. 75 ($-3 + 0,3i$) und 57 bzw. 61 (Gold) für $L = 2, 3$. σ_{ext} mit und ohne Vorkonditionierung auf 6 Stellen gleich.

Befunde.

- *Iterationen:* Mit Kanten- und Eckblöcken sind sie konstant (49 bzw. 47), auch mit komprimierten Operatoren und über alle Symmetriesektoren zugleich. Ohne Blöcke wachsen sie um etwa 11 ($-3 + 0,3i$) bzw. 2–3 (Gold) je Stufe. Damit ist AP 2.5 mit AP 3 kombiniert.
- *Genauigkeit:* Für Gold fällt σ_{ext} monoton (Differenzen 0,26; 0,25; 0,16). Für $-3 + 0,3i$ schwankt der Wert (18,24 $\rightarrow$ 18,69 $\rightarrow$ 18,59 $\rightarrow$ 18,33). Das entspricht qualitativ der Vorhersage aus AP 1: Gold liegt außerhalb des Resonanzfensters, $-3 + 0,3i$ nahe daran. Da nur die Kantenzonen verfeinert werden (Innen- und Längsauflösung sind fest), konvergiert die Folge gegen die Lösung eines Netzes mit fester grober Restauflösung, nicht gegen die exakte Lösung. Ein Referenzwert für den Würfel fehlt.
- *Blockanteil:* Bei $L = 5$ decken die Blöcke 82% der Unbekannten ab, weil in diesem Netz fast alle Elemente in den verfeinerten Zonen liegen. Die Blöcke selbst sind klein (höchstens 800 Unbekannte), die Vorkonditionierung ist hier aber nahezu ein blockweiser Direktlöser. Bei feinerem Innenbereich sinkt der Anteil. Eine $\mathcal{H}$ -LU der Blöcke (AP 3.4 im engeren Sinn) war bei diesen Größen nicht nötig und ist nicht umgesetzt.
- *Aufbauzeit:* Bei $L = 5$ etwa 215 s je Wellenzahl, mit 3216 dichten gegenüber 2590 Niedrigrangblöcken. Ursache ist die Zulässigkeitsbedingung $\text{dist} > 3h_{\text{max}}$: Die gestreckten Kantendreiecke haben lange Kanten (0,25) und machen viele Blöcke unzulässig. Nötig ist eine Nahfeldquadratur, die auch für gestreckte Elemente in kleinerem Abstand genau ist, oder eine Zulässigkeit nach der kurzen Elementausdehnung mit angepasster Fernfeldquadratur.

6 Asymptotik mit dem C++-Rechenkern

Der Kern aus dem Repository `PhotonPower/CliffordBem` (v0.1) implementiert dieselben Kernkomponenten, Nahfeldregeln und ACA-Varianten. Die Einträge stimmen mit dem Prototyp auf 10^{-13} überein, und er ist etwa 6-mal schneller. Einstellungen wie oben ($\varepsilon = 10^{-4}$, gemeinsame ACA). Details und Rohdaten: `docs/results_compression.md` im Repository.

Geometrie	Dreiecke	Unbekannte	Speicher	$10^3 \cdot \text{MB}/(N \log^2 N)$	Aufbau
Kugel, $k = 1,5$	1 280	10 240	55 MB	0,83	6 s
	5 120	40 960	340 MB	0,91	33 s
	11 520	92 160	959 MB	0,95	80 s
	20 480	163 840	1 881 MB	0,93	156 s
Würfel (gleichm.), $k = 1,5$	1 200	9 600	51 MB	0,84	7 s
	6 912	55 296	488 MB	0,90	53 s
	19 200	153 600	1 651 MB	0,88	171 s
Kugel, $k = n/4$	1 280	10 240	55 MB	0,83	6 s
	20 480	163 840	2 075 MB	1,03	192 s

- Der Quotient $\text{Speicher}/(N \log^2 N)$ ist für Kugel und Würfel ab etwa 3000 Dreiecken innerhalb von $\pm 7\%$ konstant. Die Aufbauzeit wächst mit Exponent 1,1 bis 1,2. Die frühere Beobachtung $N^{1,39}$ (Abschnitt 3) war präasymptotisch.
- Kanten und Ecken ändern das Wachstum nicht.
- Bei fester Auflösung je Wellenlänge (etwa 10 Elemente) kostet die Frequenz bis $kD \approx 16$ nur etwa 10 % Speicher. Bei festem Netz wächst der Niedrigrang-Speicher bis $kD = 48$ um 62 %, und der mittlere Rang steigt von 7,0 auf 9,0.
- Gemeinsame gegen komponentenweise ACA: etwa 19 % weniger Niedrigrang-Speicher, konstant über $N = 1280$ bis 11 520, bei halber Aufbauzeit.
- Zu den Kanten gradierte Tensornetze sind dicht-dominiert (bei 3072 Dreiecken 84 % dichte Nahblöcke, 293 MB gegenüber 170 MB gleichmäßig). Das liegt an den auf $h_{\max}$ bezogenen Nahfeld- und Zulässigkeitskriterien und ist mit einer Fernfeldquadratur für gestreckte Elemente zu beheben.

Streulöser. Der C++-Kern (v0.2) löst $T_1 h = h^{\text{inc}}$ mit beiden Operatoren als $\mathcal{H}$ -Matrizen und GMRES (docs/results_scattering.md). Bei 320 Dreiecken reproduziert er die dichte Lösung des Prototyps auf alle Stellen. Bis 92 160 Unbekannte:

	Q_{ext} (11 520 Dreiecke)	extrapoliert	Mie	GMRES
Glas, $\omega a = 1$	0,214752	0,215111 ($p = 1,96$)	0,215098	10
Gold, $\omega a = 0,5$	0,597669	0,590837 ($p = 1,29$)	0,590018	24

Die Iterationszahlen sind von N unabhängig. Bei Gold sinkt die beobachtete Ordnung mit N ($1,42 \rightarrow 1,29$), die Extrapolation nähert sich Mie ($3,2 \rightarrow 1,4 \cdot 10^{-3}$).

Sauter-Schwab (C++-Kern v0.4). Mit Sauter-Schwab-Quadratur für alle Paare mit gemeinsamer Fläche, Kante oder Ecke ändert sich das Bild für Gold grundlegend. Für ein kantenbenachbartes Paar hatte die bisherige Nahfeldregel 1,7 % Fehler, Sauter-Schwab (Ordnung 5) liegt unter 10^{-5} . Die Streurechnung konvergiert für Gold jetzt mit Ordnung $p = 1,99\text{--}2,02$, und die Extrapolation trifft Mie auf $2 \cdot 10^{-5}$ bis $9 \cdot 10^{-5}$ (zuvor $1,4 \cdot 10^{-3}$). Auf dem feinsten Netz sinkt der Fehler ohne Extrapolation von 1,3 % auf 0,19 %. Die langsamere Konvergenz bei Gold lag also an der Nahfeldquadratur, nicht an Formulierung oder Ansatzraum.

Damit ist H3 (zweiter Teil) im Bereich bis etwa 160 000 Unbekannte und $kD \lesssim 16$ numerisch gestützt: Der Aufwand ist $\mathcal{O}(N \log^\alpha N)$ mit $\alpha \approx 2$ für den Speicher.

7 Weiterentwicklung des C++-Kerns (v0.4 bis v0.37)

Kurzfassung; Einzelheiten in den Berichten unter `docs/` im Repository.

- *Nahfeld.* Sauter-Schwab-Quadratur für benachbarte Paare: Die bisherige Regel hatte an gemeinsamen Kanten bis 1,7 % Fehler; mit Sauter-Schwab konvergiert Gold mit Ordnung 2 gegen Mie (Extrapolation $2 \cdot 10^{-5}$ bis $9 \cdot 10^{-5}$ statt $1,4 \cdot 10^{-3}$). Auf gestreckten Dreiecken (Seitenverhältnis bis 16) ist Sauter-Schwab ungenau (bis 1,4 %) und orientierungsabhängig; dort wird eine halbanalytische, zur gemeinsamen Kante gradierte Regel verwendet, für nahe Paare eine adaptive Außenregel, alles in einem Nahfeld-Cache.
- *Chirale Medien.* Innerer Operator $P_+ E_{k_+} + P_- E_{k_-}$, chirale J ; $Q_\pm$ und CD treffen eine chirale Mie-Lösung nach Extrapolation auf 10^{-4} .
- *Mehrere Körper, Gmsh, Spektren.* Blockdiagonaler Innenoperator je Körper; Gmsh-Import; Johnson-Christy-Daten, Orientierungsmittelung (Lebedev). Born-Kuhn-Dimer: bisignates CD-Spektrum, Enantiomere mit entgegengesetztem CD auf 10^{-5} .
- *Vorkonditionierung.* Blockvorkonditionierung für mehrere Körper und chirale Medien (voller Block = 1 Iteration); Würfel-Dimer mit Kanten-/Eckblöcken: Iterationen nahezu unabhängig von der Kantenauflösung ($56 \rightarrow 54$ statt $56 \rightarrow 72$). Hierarchische Faktorisierung im HODLR-Format (schwache Zulässigkeit): direkter Löser mit feiner Toleranz, als Vorkonditionierer lohnend ab etwa 7 bis 18 rechten Seiten; an Plasmonresonanzen nur begrenzt wirksam.
- *ACA mit Multivektor-Pivots.* Kreuzapproximation über $\mathcal{C}\ell_3(\mathbb{C})$ mit Nullteiler-Erkennung: bei gleicher Genauigkeit 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher als die gemeinsame skalare ACA (Kugel, Würfel, $k = 12$). Der Kern ist skalar separabel (skalare Funktionen von x mal paravektorwertige von y); genau das nutzt die gemeinsame ACA.
- *Abgerundete Würfel.* Im Resonanzfenster konvergiert die Rechnung mit gerundeten Kanten monoton, hängt aber stark vom Radius ab; Silberwürfel (50 nm, Wasser): Hauptresonanz verschiebt sich mit schärferen Kanten nach Rot (grob 440, 460, 470 nm für 10, 7,5, 5 nm Radius).
- *Beschichtete Grenzflächen (v0.13).* Verschachtelte Gebiete über einen Grenzflächengraph: jede Schichtgrenze ist eine Fläche, jedes Gebiet hat einen eigenen komprimierten Cauchy-Operator auf seinem Rand (AP 1, Nachtrag). Beschichtete Kugel gegen Aden-Kerker: Extinktion und komplexe Vorwärtsamplitude mit Ordnung 2. Für Schichten dünner als die Elemente wird die Schichtwirkung als Differenz zu einer neutralen Rechnung auf denselben Netzen bestimmt (Fehler 1–5 % bis $d/h \approx 0,04$, Phase 3–9 % auf dem feinsten Netz). Parallele Flächen im Abstand $d \ll h$: Die adaptive Außenregel verfeinert nur noch zu den Rändern des inneren Dreiecks hin (je Paar Faktor 3–4 schneller bei gleicher Genauigkeit, im Gesamtproblem etwa 20 % weniger Nahfeldzeit). Silberwürfel (50 nm) mit 2 nm Oxid: Rotverschiebung der Hauptresonanz um etwa 20 nm, doppelt so viel wie bei der Kugel.

- *Dünnschicht-Näherung* (v0.14). Eine Fläche mit $J_{\text{eff}} = J + L_d$ (Greensche Funktion der Schichtfolge in erster Ordnung, Ableitungen auf der Dichte): Die $\mathcal{H}$ -Matrizen der unbeschichteten Rechnung werden unverändert verwendet, L_d ist ein lokaler Operator über die Kantennachbarn. Kosten wie ohne Schicht; Modellfehler $\approx 1,5 d/a$; für die Phase bei $d/a \lesssim 0,03$ genauer als die Zwei-Flächen-Rechnung, bei etwa einem Fünftel der Kosten.
- *Dünnschicht zweiter Ordnung* (v0.15). Dirac-Form auf Parallellflächen mit Formoperator; die zweiten Ableitungen sind zusammengesetzte Kleinste-Quadrate-Gradienten, alle Schichtkorrekturen nutzen glatte Normalen. Schichtwirkung bis $d/a = 0,05$ auf 0,1–0,7 %, Silberkugel mit 2 nm Oxid so genau wie die exakte Rechnung. Die zusätzlichen Kosten sind lokale Operatoren; die Iterationen steigen für $d \gtrsim h$.
- *Konsistente zweite Ableitungen, mehrere Körper* (v0.16). Quadratische Anpassung über die Knotennachbarschaft mit geschlossener Form für B^2 ; blockdiagonaler Innenoperator für mehrere Körper. Am Silberwürfel braucht die Näherung eine aufgelöste Krümmung (Unterschied zur exakten Rechnung fällt von 11 auf 6 % bei Verfeinerung von 1208 auf 2048 Dreiecke).
- *Chirale Schichten* (v0.17). Mit dem zentralen Multivektor $K = k_+ P_+ + k_- P_-$ gilt die Dirac-Form unverändert; der CD einer dünnen chiralen Hülle auf Gold konvergiert mit Ordnung 2 gegen eine Mie-Lösung für geschichtete chirale Kugeln (0,5–1 % bei $n = 12$), die exakte Zwei-Flächen-Rechnung verfehlt ihn um 30–50 %. Spektrum einer Goldkugel mit chiraler Molekülhülle (v0.18): plasmoninduzierter CD an der Resonanz auf 2–7 %.
- *Schicht als Zweitor* (v0.19, Prototyp). Nach dem Vorbild der S-Matrix von Schichtsystemen: zwei $\mathcal{H}$ -Matrizen (E_2 auf der Außenfläche, E_1 auf dem Kern) und eine Zweitor-Beziehung mit $g(s) = \tanh(d\sqrt{s}/2)/\sqrt{s}$, ausgewertet über Partialbrüche mit dünnbesetzten Resolventen des Laplace-Beltrami-Operators (5–11 innere Schritte je Pol). Stabil bis $d/h = 3,8$ bei unter 62 Iterationen.
- *Mehrfachschichten im Zweitor* (v0.20). Blockbidiagonales System mit den Spuren auf den inneren Grenzflächen; weiterhin nur zwei $\mathcal{H}$ -Matrizen. Jede Schicht auf ihrer eigenen Fläche, dicke Schichten automatisch unterteilt: konvergent bis $d/a = 0,5$, die Iterationen wachsen mit der Zahl der Teilschichten (bis 156).
- *Chirales Außenmedium* (v0.21). Der Außenoperator wird $P_+ E_{k_+} + P_- E_{k_-}$ (doppelte Zahl der Außen- $\mathcal{H}$ -Matrizen), die Anregung eine Helizitätswelle, die Extinktion das optische Theorem je Kanal. Die Blockvorkonditionierung ist dafür noch nicht angepasst (HODLR und punktweise funktionieren).
- *Mehrere Körper im Zweitor* (v0.22): E_2 auf der Vereinigung der Außenflächen, E_1 blockdiagonal; der Aufwand bleibt bei zwei (chiral vier) Operatoren.
- *Nahfeld* (v0.24): Cauchy-Integral der Streuspur mit halbanalytischer Nahquadratur (dieselbe Zerlegung wie für die Randoperatoren); direkte Summation, 24321 Punkte bei 5120 Dreiecken in 17 s. Gegen Mie auf 0,3–2 % bis dicht an die Oberfläche; im Spalt eines Dimers verlangt das Nahfeld feinere Netze als die Spektren. Seit v0.25 als rechteckige $\mathcal{H}$ -Matrix (Punkte $\times$ Dreiecke,

ACA über die vier Kernkomponenten): 4,5-fach schneller bei 28 800 Punkten, die Anwendung allein 60- bis 90-fach, Kompressionsfehler 10^{-5} .

- *Dipolanregung* (v0.26): elektrischer Dipol als rechte Seite, Zerfallsraten und Quantenausbeute von Emitttern. Das Quenching verlangt am Fußpunkt Elemente von etwa $d/8$; ein konform verdichtetes Kugelnetz erreicht das ohne mehr Dreiecke, kostet aber durch die kleinen Elemente Aufbauzeit der $\mathcal{H}$ -Matrix.
- *Fluoreszenzverstärkung* (v0.27): Anregung aus dem Nahfeld, Emission aus den Zerfallsraten, gemeinsam über die Orientierungen gemittelt; vor einer Goldkugel auf 1–5 % wie Mie, im Spalt eines Gold-Dimers etwa 260-fach.
- *Krylov-Recycling* (v0.28) für mehrere rechte Seiten: beim Dipolproblem nur 10–20 % Gewinn, weil der vorkonditionierte Operator zweiter Art keine ausgeprägten langsamen Eigenrichtungen hat; bei einer Testmatrix mit Ausreißer-Eigenwerten 3,6-fach. GCRO-DR (v0.29) mit 20 harmonischen Ritz-Vektoren statt 139 roher Richtungen: nahe einer Plasmonresonanz 1,30-fach, ohne Resonanz 1,09-fach.
- *ACA+* (v0.30) als Voreinstellung der $\mathcal{H}$ -Matrizen: gleiche Ränge, etwa 10 % genauer, 2–6 % mehr Aufbauzeit; bei den bisherigen Geometrien versagt die teilpivotisierte ACA nicht, ACA+ sichert gegen unbemerkt zu kleinen Rang ab.
- *Parallelisierung* (v0.31) mit OpenMP: $\mathcal{H}$ -Matrix-Produkt (Puffer je Thread), Nahfeld, Projektionen, Dipolraten, Zweitor. Mit 1, 2 und 4 Threads auf zwölf Stellen gleich; über 90 % der Rechenzeit parallel, nach Amdahl mit 4 Kernen höchstens 3,5–3,8-fach; auf 6 Kernen gemessen 4,7-fach.
- *Chirale Emitter* (v0.32): magnetischer Übergangsdipol über die Dualität, zirkular polarisierte Lumineszenz aus der Zerlegung des Fernfelds nach Helizität (in der Clifford-Form die Projektoren $P_{\pm}$). Achirale Goldstrukturen verdünnen g_{lum} im Orientierungsmittel, verstärken ihn aber für tangential orientierte Emitter.
- *Optische Kräfte* (v0.33) über den Maxwellschen Spannungstensor auf Körperflächen, Kugeln oder Parallellflächen: Strahlungsdruck wie Mie im Rahmen der Diskretisierung, optische Bindung am Gold-Dimer. Seit v0.34 die Kraft auf kleine, auch chirale Teilchen in Dipolnäherung, einschließlich der enantioselektiven Kraft, gegen die volle Rechnung auf 1–2 %. Die $\mathcal{H}$ -Matrizen der Schichtgebiete enthalten mehr unzulässige Blöcke, weil sich die Cluster beider Flächen überlappen; Speicher und Nahpaare etwa verdoppeln sich je Schicht.
- *Kraftkarten* (v0.35): Kraft und enantioselektive Kraft auf ein kleines chirales Teilchen im Spaltfeld eines Gold-Dimers aus einer Lösung; die chirale Kraft folgt dem Gradienten der optischen Chiralität mit dem aus der Kraftformel erwarteten Faktor auf 0,5 %.
- *Kräfte in chiralen Medien* (v0.36): Minkowski-Tensor mit den chiralen Materialgleichungen, unabhängig geprüft über die Impulsbilanz im Fernfeld je Helizitätskanal; der Strahlungsdruck einer achiralen Goldkugel in chiraler Lösung hängt von der Helizität ab, vor allem über die verschiedenen Photonenimpulse $k_{\pm}$.

- *Strahlanregung und optische Pinzette* (v0.37): einfallende Felder als exakte Winkelspektren (Gaußstrahl, fokussiert nach Richards–Wolf), Kräfte bei Dipolanregung mit Impulserhaltung auf 10^{-4} ; Kennlinien einer optischen Pinzette, wobei der Operator einmal aufgebaut wird und jede Brennpunktlage eine neue rechte Seite ist.

8 Einordnung und nächste Schritte

- *H3, erster Teil*: Gemeinsame Pivotisierung über die Grade spart 10–19 %. Multivektor-Pivots verbessern das nicht, sie kosten 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher (Abschnitt 7); in dieser Form ist die Hypothese widerlegt.
- *H3, zweiter Teil*: Mit dem C++-Kern bis 163 840 Unbekannte gestützt: $\mathcal{O}(N \log^2 N)$ für Kugel und Würfel (Abschnitt 6). Offen sind stark gradierte Netze (Kriterien für gestreckte Elemente) und elektrisch große Streuer ($kD \gg 50$).
- *Laufzeit*: Der C++-Kern ist etwa 6-mal schneller als der Python-Prototyp (ein Rechenkern); die Assemblierung ist für OpenMP vorbereitet.
- *AP 3.4*: Kompression und Kanten-/Eck-Vorkonditionierung sind am Würfel kombiniert (Abschnitt 5). Offen sind die $\mathcal{H}$ -LU für große Blöcke und eine Zulässigkeit, die gestreckte Kantendreiecke nicht bestraft.