

补充定义：

定义 1 排列：对自然数对 $(1, 2, \dots, n)$ 重新排序，得到 (i_1, i_2, \dots, i_n) ，则称其为 1 到 n 的一种排列。♠

定义 2 逆序对数量为奇数，则称该排列为**奇排列**；反之，称之为**偶排列**。♠

$\tau(\pi)$ 也可以被理解为将排列 π 经过一一换序变为 $(1, 2, \dots, n)$ 的最少步骤数。

定理 1 对换两个元素，排列奇偶性改变。♠

上述定理可以进一步推广为：

定理 2 奇（偶）排列经过奇（偶）数次对换变成自然排列 $(1, 2, \dots, n)$ 。♠

定理 3 行排列与列排列同时改变。♠

这里指出一个排列性质。由于不管从行展开还是按列展开，同一项的系数必须相同：

$$\begin{vmatrix} & a_{12} & & \\ & & a_{23} & \\ a_{31} & & & \\ & & & a_{44} \end{vmatrix} \quad (1)$$

按行，系数为 $\tau(2314)$ ，按列为 $\tau(3124)$ 。故必有：

$$\tau(2314) = \tau(3124) \quad (2)$$

问题 1 求行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (3) \quad \spadesuit$$

解答 记：

$$A_n = \begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4)$$

2

则:

$$A_n = \begin{vmatrix} a_{11} & & 0 \\ a_{21} & & \\ \vdots & & A_{n-1} \\ a_{n1} & & \end{vmatrix} = a_{11} A_{n-1} \quad (5)$$

迭代:

$$A_n = \prod_{i=1}^n a_{ii} \quad (6)$$

另一个对角矩阵的行列式与此相同:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n a_{ii} \quad (7)$$

问题 2 求行列式:

$$\begin{vmatrix} & & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (8)$$

解答

$$\det \begin{bmatrix} & & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} i} \prod_{i=1}^n a_{ii} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n a_{ii} \quad (9)$$

定义 3 转置:

$$A_{ij}^T = A^{ij} \quad (10)$$

定理 4

$$\det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^T) \quad (11)$$

从而行的性质都可以对偶地应用在列上。

结论 1. 行公理化定义

2. 列公理化定义

3. 行列式定义



下面是几个例题：

问题 3 设：

$$\mathbf{C} = C_{ab} = c_{ij}(e^i)_a(e^j)_b = (a_i 1_j + 1_i b_j)(e^i)_a(e^j)_b \quad (12)$$

其中 1_i 是为凑齐指标而产生的所有元为 1 的向量，计算 $\det \mathbf{C}$ 。¹



解答

$$\begin{cases} \text{当 } n \geq 3, & 0 \\ \text{当 } n = 2, & (a_1 - a_2)(b_1 - b_2) \end{cases} \quad (13)$$

注意到当 $n \geq 3$ ，行列式中必有两行在拆解后相等 (β 或 $\mathbf{1}$) 则该结论显然。其中 $\det \mathbf{C} = |a_i 1_a + 1_j \beta_a|$ ， $\beta_a = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 。



¹这里利用到了抽象指标记号。