¿SABÍA QUE ALGUNAS ENFERMEDADES NO PSIQUIÁTRICAS PUEDEN CAUSAR DELIRIOS Y ALUCINACIONES?



...iEntienda!.....

Los trastornos psicóticos debido a otra condición médica son caracterizados por delírios y alucinaciones atribuidos a los **efectos fisiológicos de otra enfermedad,** no siendo explicados por otro trastorno mental.



Etiopatogenia---

Condiciones neurológicas

Neoplasias, enfermedade cerebrovascular, enfermedade Huntington, esclerosis multiple, epilepsia, lesion o daño nervioso visual o auditivo, migraña, infecciones del SNC.



Hipoxia, hipercapnia y hipoglicemia.

Otras condiciones

Desiquilíbrios hídricos y eletrolíticos, enfermedades hepáticas o renales, y disturbios autoinmunes, con afectación del SNC.



DSM-5

Diagnóstico -

A - Alucinaciones o delirios destacados.

B - Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra enfermedad.

C - No se explica mejor por otro trastorno mental.

D - No se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional.

E - Causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.



Narra la historia de Mia, cuyo marido Frederik, un director muy respetado, tiene desde hace tres años un tumor cerebral que crece poco a poco y que ha cambiado su personalidad. Sus vidas cambian todavía más drásticamente cuando es acusado de haber malversado 1,6 millones de euros de su escuela de Copenhague. Junto con su abogado, Mia lucha por su absolución. ¿Era él mismo cuando lo hizo?



Factores de Riesgo

Mayores de 65 años, mujeres mayores, disturbios endócrinos y metabólicos no tratados, disturbios autoinmunes y epilepsia del lobo temporal.



Clínica

Alucinaciones

Ver, oír, sentir, oler o probar cosas que no están realmente ahí, como personas, animales u objetos.

Delírios

Creencias falsas que son inquebrantables por la lógica o la evidencia. Puede creer que está siendo seguida o amenazada.



Dificultad para pensar con claridad o concentrarse.

Puede tener habla incoherente, dificultad para seguir instrucciones o dificultad para completar tareas.

Comportamiento inapropiado o extraño

Es cualquier comportamiento que se considera inusual o perturbador. Puede incluir agitación, agresividad o aislamiento social.



Curiosidade....

En España, la prevalencia global en mujeres está cerca de duplicar a la de los hombres (9,3% frente a 5,5%). Es relativamente estable durante la edad adulta, y se eleva de manera marcada y gradual a partir de los 65 años, llegando al 35,8% y 26,6%, mujeres y hombres respectivamente, en el quinquenio de 85 a 89 años.

Pronóstico....

ca

La identificación y el tratamiento de la condición medica subjacente son los mayores responsables por la modificación del curso del trastorno.

-¿Como encontrar ayuda?----



Si está experimentando síntomas de ese trastorno psicótico, es importante hablar con su médico o otro profesional de la salud. Escanea el QR code al lado para encontrar la ayuda más cercana a usted.



Docente: Dra. Carol Andrea Oliveros Estudiante: Milena Gonçalves Sales

Tema: Trastornos psicóticos debido a otra condición médica - 293.81 (F06.2) / 293.82 (F06.0)