

Ein autistisches Kleinkind in Ihrem Angebot

Für Kleinkind-/Aktivitätskurs-Leitende, Schwimm- und Turnlehrkräfte sowie Sportübungsleiter:innen — ein autistisches Vorschulkind (etwa 2–5 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass die Aufmerksamkeit eines kleinen Kindes jeweils in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ gezogen wird. Bewegungs-Settings — hallende Räume, Trillerpfeifen, grelles Licht, plötzliche Wechsel, „alle suchen sich einen Partner!“ — sind für ein monotropes Kind genuinely schwer, *auch für eines, das sich gerne bewegt*. Die gute Nachricht: Ein paar vorhersagbare, sensorisch freundliche Anpassungen (dasselbe Aufwärmen, eine ruhige Ecke, je eine Anweisung nach der anderen) machen Teilnahme möglich und freudvoll. In diesem Alter ist das Ziel einfach — ein Kind, das **nächste Woche wiederkommen möchte**.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Macht nicht mit; klammert; rennt weg	Überlastung durch Lärm, Neuheit und Anforderung — keine Unart
Meltdown oder wird mittendurch schlaff/stumm	Unwillkürliche Reaktion auf sensorische Überlastung oder einen plötzlichen Wechsel
Tief in ein Gerät vertieft	Monotroper Fokus — eine Stärke, auf der man aufbaut, keine Ablenkung
Hört die Trillerpfeife nicht; „ignoriert“ Sie	Wenn es vertieft ist, registrieren sich Dinge außerhalb des Tunnels nicht
Vom Summer, dem Echo, dem grellen Licht verstört	Sensorische Hyperreaktivität — echtes Unbehagen, keine Zickigkeit

Versuchen Sie dies

- **Dasselbe Aufwärmen, dieselbe Routine in jeder Stunde** — Vorhersagbarkeit senkt die Einstiegskosten.
- **Zeigen Sie, sagen Sie nicht nur** — demonstrieren Sie die Fähigkeit; geben Sie **eine kurze Anweisung nach der anderen** mit einem Moment zum Verarbeiten.
- **Reduzieren Sie plötzlichen Lärm** — Handzeichen, leutes Klatschen; warnen Sie vor einer Trillerpfeife oder einem Summer; erlauben Sie Gehörschutz.
- **Bieten Sie eine ruhige Ecke und ein Zeichen** an, um herauszutreten; bestrafen Sie niemals Stimming oder Bewegung.
- **Bauen Sie zuerst die Beziehung auf** — ein Kind, das Ihnen vertraut, hält mehr durch; feiern Sie Einsatz und das Interesse.

Vermeiden Sie dies

- Überraschende Wechsel, laute plötzliche Geräusche oder „alle schauen mir zu!“-Druck.
- Das Kind beim Stimming, Bewegen oder der Nutzung eines Trostobjekts stoppen.

- Ein Erstarren oder Wegrennen als Trotz lesen statt als Überlastung.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Wenn ein Kind häufig überlastet ist, arbeiten Sie mit den Eltern zusammen — sie kennen die Auslöser und frühen Zeichen. Eine vorhersagbare Struktur, ein sensorisch freundlicher Raum und unterstützende Peers sind die evidenzbasierten Förderer körperlicher Aktivität autistischer Kinder. Behalten Sie Wohlbefinden und Zuversicht als Ziel, nicht Leistung.

Wenn das Kind ein Mädchen ist

Mädchen in diesem Alter camouflieren früh und werden vielleicht übersehen; eine ruhige, folgsame Oberfläche kann echte Überlastung verbergen. Achten Sie ebenso auf Rückzug wie auf Meltdowns.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — **Monotrop aufwachsen** (Teil 4, Sport & Coaching) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an das einzelne Kind an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, Scoping-Review körperliche Aktivität); Dwyer (2025). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.