

Un jeune enfant autiste dans votre activité

Pour les animateurs d'activités pour tout-petits, les maîtres-nageurs, les professeurs de gym et les entraîneurs sportifs — soutenir un enfant d'âge préscolaire autiste (environ 2 à 5 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un jeune enfant est attirée vers quelques « tunnels » profonds et intenses à la fois. Les environnements d'activités — salles avec écho, sifflets, lumières vives, changements soudains, consignes comme « trouvez tous un partenaire ! » — sont véritablement difficiles pour un enfant monotropique, *même pour un enfant qui aime bouger*. La bonne nouvelle : quelques ajustements prévisibles et respectueux des sens (même échauffement, un coin calme, une seule instruction à la fois) rendent la participation possible et joyeuse. À cet âge, l'objectif est simple : que l'enfant **ait envie de revenir la semaine prochaine**.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Ne veut pas participer ; s'accroche ; s'enfuit	Surcharge due au bruit, à la nouveauté et aux exigences — ce n'est pas de la malveillance
Meltdown ou corps qui devient mou/silence en pleine séance	Réponse involontaire à la surcharge sensorielle ou à un changement soudain
Profondément absorbé par un seul équipement	Focus monotropique — une force sur laquelle s'appuyer, pas une distraction
N'entend pas le sifflet ; vous « ignore »	Lorsqu'il est absorbé, les choses hors du tunnel ne sont pas enregistrées
Perturbé par le buzzer, l'écho, les lumières vives	Hyper-réactivité sensorielle — un inconfort réel, pas un caprice

Essayez ceci

- **Même échauffement, même routine à chaque séance** — la prévisibilité réduit le coût d'entrée.
- **Montrez, ne vous contentez pas de dire** — démontrez la compétence ; donnez **une seule instruction courte à la fois** avec un moment pour la traiter.
- **Réduisez les bruits soudains** — signaux manuels, applaudissements calmes ; prévenez avant l'utilisation d'un sifflet ou d'un buzzer ; autorisez le port d'un casque antibruit.
- **Offrez un coin calme et un signal** pour s'en éloigner ; ne punissez jamais le stimming ou le mouvement.
- **Construisez la relation d'abord** — un enfant qui vous fait confiance fera plus d'efforts ; célébrez l'effort et l'intérêt.

Évitez ceci

- Les changements surprises, les sons soudains et forts, ou la pression du « tout le monde me regarde ! ».

- Empêcher l'enfant de stimmer, de bouger ou d'utiliser un objet de confort.
- Interpréter un blocage ou une fuite comme de la provocation plutôt que comme une surcharge.

Quand demander plus de soutien

Si un enfant est fréquemment submergé, collaborez avec le parent — il connaît les déclencheurs et les signes précoces. Une structure prévisible, un espace adapté aux sens et des pairs encourageants sont les facilitateurs fondés sur les preuves pour l'activité physique des enfants autistes. Gardez comme objectif le bien-être et la confiance, pas la performance.

Si l'enfant est une fille

Les filles de cet âge camouflent tôt et sont plus souvent oubliées ; une surface calme et docile peut cacher une surcharge réelle. Surveillez autant le retrait que les meltdowns.

À propos de ce guide

*Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — **Grandir Monotropie** (Partie 4, sports et coaching) et le brief **Monotropisme**. Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'enfant individuellement.*

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, revue d'étendue sur l'activité physique); Dwyer (2025). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.