

Votre enfant d'âge préscolaire autiste

Pour les parents et les aidants familiaux — comprendre et soutenir un **enfant d'âge préscolaire autiste** (environ 2 à 5 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention de votre enfant est attirée vers quelques « tunnels » profonds et intenses à la fois. À l'intérieur d'un tunnel, la focalisation est vive et riche ; à l'extérieur, les choses sont à peine perçues — y compris parfois la faim, la douleur ou quelqu'un qui parle. Cette seule différence explique les intérêts intenses, les réactions sensorielles, l'amour de la routine et les meltdowns lors des transitions. Votre enfant n'est pas « en retard » ou « cassé » — son esprit arrose une parcelle de terrain plus petite, mais *profondément*. Votre plus grand pouvoir est de créer un environnement qui travaille *avec* cette attention.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Profondément absorbé par un objet ou un sujet ; aligne des objets ; joue « différemment »	Jeu monotropique — valide et significatif ; c'est souvent la voie de l'enfant vers le calme et l'apprentissage
Ne répond pas à son nom ; « ignore » la faim, la soif, le besoin d'aller aux toilettes	Lorsqu'il est absorbé, les choses hors du tunnel ne sont véritablement pas enregistrées
Pleurs soudains, cris, corps qui devient mou ou silence total	Un meltdown ou un shutdown involontaire dû aux lumières, au bruit ou à l'attente — ce n'est <i>pas</i> de la malveillance
Réactions fortes aux sons, lumières, textures, aliments — ou semble ne rien ressentir	Différences sensorielles : un stimulus <i>dans</i> le tunnel est ressenti intensément ; un stimulus <i>hors</i> tunnel peut ne pas être enregistré
Lent à répondre ; répète vos mots	Temps de traitement + communication littérale sur un canal unique

Essayez ceci

- **Rejoignez leur intérêt avant de guider.** Entrez dans leur tunnel et jouez à *leur manière* d'abord — la connexion et l'apprentissage précoce (langage, comptage, tour de rôle) se construisent à partir de là.
- **Rendez la journée prévisible** — routines stables pour le réveil, les repas, le jeu et le coucher ; prévenez avant chaque changement (« d'abord les chaussures, ensuite le parc ») et utilisez des photos ou un emploi du temps visuel simple.
- **Réduisez la charge sensorielle** — un coin calme et peu éclairé ; un casque antibruit pour les endroits bruyants ; des vêtements sans coutures avec les étiquettes coupées.
- **Utilisez un langage « déclaratif »** — des observations et des réflexions (« Je vois ton manteau près de la porte ») au lieu de commandes et de questions constantes ; cela réduit la pression sur un système nerveux qui réagit vivement aux exigences.

- **Ayez un plan pour les meltdowns/shutdowns** : restez calme, réduisez la charge (calme, lumière tamisée, moins de personnes), ne tentez pas de raisonner ou de juger sur le moment, laissez du temps, assurez la sécurité de tous.
- **Suivez votre instinct et consultez tôt** si vous remarquez une attention ralentie ou « collante », des intérêts intenses, des différences sensorielles ou un jeu atypique — l'aide précoce adapte l'environnement, pas l'enfant.

Évitez ceci

- Forcer le contact visuel, immobiliser l'enfant ou imposer un changement par surprise.
- Considérer l'alignement d'objets, le tri ou le jeu sensoriel comme un jeu « incorrect » à corriger.
- Interpréter quelques minutes de calme à l'extérieur comme un signe que « tout va bien » — l'enfant peut en payer le prix par un shutdown plus tard.

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** / à la « **régression** » — une perte soudaine de compétences signifie généralement un *épuisement* ; la réponse est de **réduire les exigences et de restaurer le repos et les intérêts**, et non de pousser davantage. Interrogez votre visiteur de santé ou votre médecin généraliste sur une évaluation de l'autisme — vous n'avez pas besoin d'être « dans un état critique » pour être orienté. Recherchez un **soutien parental dirigé par des autistes** (c'est généralement le plus précis et le plus affirmant), et prenez soin des frères et sœurs ainsi que de votre propre bien-être.

Si votre enfant est une fille

Les filles sont souvent plus douées pour le **camouflage** précoce et sont plus souvent oubliées. Prenez vos préoccupations au sérieux même lorsque la présentation semble « sociable » ou « subtile » — l'effort du camouflage est un effort réel.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — **Grandir Monotropique** (Partie 1), le **Guide pour la famille** (Parties 1 et 3) et le **brief Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire (« enfant autiste »). **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic**. Vous connaissez le mieux votre enfant ; adaptez ces conseils à lui.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023; 2022, routines); Dwyer (2025); Reframing Autism (2023); Edgar (2024, régression/burnout); Kelly Mahler (2024, interoception); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.