

Un enfant autiste dans votre crèche / établissement de la petite enfance

Pour le personnel des crèches, les praticiens de la petite enfance et les assistantes maternelles — soutenir un enfant d'âge préscolaire autiste (environ 2 à 5 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un jeune enfant est attirée vers quelques « tunnels » profonds et intenses à la fois. À l'intérieur d'un tunnel, la focalisation est vive ; à l'extérieur, les choses sont à peine perçues. Les environnements de la petite enfance — animés, bruyants, riches en transitions et en demandes d'attention partagée — peuvent être véritablement difficiles pour un enfant monotropique, *même pour un enfant qui aime jouer*. C'est également là que les signes précoces apparaissent le plus souvent. Travailler *avec* l'attention de l'enfant (et non contre elle), maintenir la prévisibilité et réduire la charge permettent à un apprenant vif et capable d'émerger — et vous aident à signaler les préoccupations tôt.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Profondément absorbé par un objet ; aligne, trie, répète	Jeu monotropique — valide et significatif ; c'est la voie de l'enfant vers le calme et l'apprentissage
Ne répond pas à son nom ; « ignore » ses pairs	Lorsqu'il est absorbé, les choses hors du tunnel ne sont pas enregistrées ; ce n'est pas de la provocation
Meltdown ou corps qui devient mou/silence lors du rangement ou du temps de cercle	Réponse involontaire à la transition ou à la surcharge — ce n'est <i>pas</i> de la malveillance
Réactions fortes au bruit, aux lumières, aux textures — ou semble ne rien ressentir	Différences sensorielles : stimuli <i>dans</i> le tunnel ressentis intensément, <i>hors</i> tunnel pas du tout
Lent à répondre ; répète vos mots	Temps de traitement + communication littérale sur un canal unique

Essayez ceci

- **Rejoignez d'abord leur intérêt**, puis étendez-le doucement — le langage, le comptage et le tour de rôle se construisent *à travers* le tunnel.
- **Rendez la journée prévisible** — un emploi du temps visuel simple ; prévenez avant chaque changement (« dans deux minutes, on range ») ; utilisez un objet « pont » vers l'activité suivante.
- **Réduisez la charge sensorielle** — un coin calme et peu éclairé ; un casque antibruit pour les moments bruyants ; réduisez l'encombrement visuel et l'éblouissement des néons.
- **Honorez le jeu autistique** — l'alignement, le tri et l'exploration sensorielle sont des jeux valides, et non des jeux « incorrects » à corriger.
- **Autorisez le mouvement et le stimming** — c'est de l'autorégulation ; n'exigez pas l'immobilité ou le contact visuel comme prix du respect.
- **Partagez vos observations avec les parents** — vous êtes souvent les premiers à remarquer ; une conversation douce et bidirectionnelle aide tout le

monde.

Évitez ceci

- Sortir brusquement l'enfant de sa focalisation, ou interrompre constamment son état de flux.
- Forcer le contact visuel, immobiliser l'enfant ou imposer des changements par surprise.
- Traiter l'alignement ou le jeu répétitif comme un comportement « incorrect » à corriger.

Quand demander plus de soutien

Signalez vos préoccupations **tôt et avec bienveillance** aux parents — une attention ralentie ou « collante », des intérêts focalisés intenses, des différences sensorielles ou un jeu atypique justifient une conversation sur l'évaluation ; l'aide précoce adapte l'environnement, pas l'enfant. Soyez attentif à la **surcharge / « régression »** — une perte de compétences signifie généralement qu'il faut *réduire les exigences et restaurer le repos et les intérêts*, et non pousser davantage.

Si l'enfant est une fille

Les filles sont souvent plus douées pour le **camouflage** précoce et sont plus souvent oubuées. Prenez les préoccupations parentales au sérieux même lorsque l'enfant semble « sociable » ou « subtile » en surface.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — **Grandir Monotropique** (Parties 0 & 3), le **Guide pour la famille** (Partie 3) et le brief **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'enfant individuellement.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023; 2019, *Monotropism at School*); Dwyer (2025); Donzelli (2021, autistic play); BERA (2021, flow); Edgar (2024, régression/burnout). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.