

Ein autistisches Kind in Ihrem Hort / Ihrer Betreuung

Für Tagesmütter/Tagesväter, Hortpersonal und Betreuungskräfte — Versorgung eines autistischen Grundschulkindes (etwa 6–11 Jahre).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass die Aufmerksamkeit eines Kindes sich in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Nach einem Tag des Zusammenreißen in der Schule kommt ein autistisches Kind oft **leerlaufend** bei Ihnen an — und der Zusammenbruch passiert bei Ihnen. Ihr Setting kann der Erholungsraum sein, den es dringend braucht, *wenn* es vorhersagbar, anforderungsarm und sensorisch freundlich ist. Widerstand beim Aufräumen oder der Snack-Zeit ist **Trägheit** (die Spur zu wechseln kostet Energie), kein Trotz; ein plötzlicher Verhaltenswechsel bedeutet meist unerfüllten Bedarf.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Meltdown oder Shutdown in dem Moment, in dem es ankommt	Die Schul-Tagesmaske ist gefallen — ein Zeichen von Vertrauen und Erschöpfung
Beginnt, stoppt oder wechselt Aktivitäten nicht	Autistische Trägheit — die Spur zu wechseln kostet echte Energie
Isst, trinkt oder geht nicht auf die Toilette, wenn es vertieft ist	Dinge außerhalb des Tunnels registrieren sich nicht
Durch Lärm, Licht, Gedränge belastet	Sensorische Überlastung nach einem langen Tag
Klammert an ein Objekt, eine Routine oder ein Interesse	Diese sind Regulations- und Sicherheitsanker

Versuchen Sie dies

- **Machen Sie die Ankunft zur Dekompression** — ein ruhiger, anforderungsarmer Empfang; interrogieren Sie es nicht zum Schultag.
- **Halten Sie eine vorhersagbare Routine**, Personal und Räume; warnen Sie vor jedem Wechsel; bieten Sie eine ruhige, schwach beleuchtete Ecke.
- **Schützen Sie das Interesse und die Ruhezeit** — interessen-geleitetes, nebeneinander gerichtetes Spiel ist Regulation und Erholung.
- **Sanfte, konkrete Erinnerungen** für Essen, Trinken und Toilette; bauen Sie Ruhe ein, nicht mehr Anforderungen.
- **Haben Sie einen ruhigen Meltdown-/Shutdown-Plan**: reduzieren Sie Input, sichern Sie Sicherheit, geben Sie Zeit, fixieren oder diskutieren Sie im Moment nicht.
- **Tauschen Sie einen beidseitigen Notizzettel mit Zuhause und Schule** — Konsistenz über alle drei verhindert viele schwere Tage.

Vermeiden Sie dies

- Aktivitäten, Gruppenspiele oder „wie war die Schule?“ auf ein bereits erschöpftes Kind häufen.
- Überraschende Wechsel, erzwungene Gruppenarbeit oder Stimming stoppen.

- Einen Zusammenbruch als Unart oder eine stille Phase als „ihm geht’s gut“ lesen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout / „Regression“** — ein Kompetenzverlust bedeutet meist *Überlastung*; reagieren Sie mit **reduzierten Anforderungen und wiederhergestellter Ruhe und Interessen**.

Untersuchen Sie **zuerst Schmerz oder Überlastung** bei jeder neuen Belastung. Arbeiten Sie mit Eltern und der schulischen Förderkoordination/SENCO-Leitung zusammen.

Wenn das Kind ein Mädchen ist

Mädchen masken stark und kommen vielleicht an, nachdem sie den ganzen Tag zusammengehalten haben; das ruhige, folgsame Kind steht vielleicht am Rande des Shutdowns. Achten Sie auf Rückzug und fragen Sie behutsam nach.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — **Monotrop aufwachsen** (Teil 1), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 3) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an das einzelne Kind an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Reframing Autism (2023); Kelly Mahler (2024, Interozeption); Edgar (2024, Regression/Burnout). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.