

Un enfant autiste dans votre centre aéré / mode de garde

Pour les assistantes maternelles, le personnel périscolaire et les travailleurs de soutien — s'occuper d'un enfant d'âge primaire autiste (environ 6 à 11 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un enfant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Après une journée à « tenir le coup » à l'école, un enfant autiste arrive souvent dans votre structure **à bout de forces** — et c'est avec vous que le crash survient. Votre structure peut être l'espace de récupération dont il a désespérément besoin, *si* elle est prévisible, à faible exigence et respectueuse des sens. La résistance lors du rangement ou du goûter est une question d'**inertie** (changer de voie coûte de l'énergie), et non de la provocation ; un changement soudain de comportement signifie généralement un besoin non satisfait.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Meltdown ou shutdown dès l'arrivée	Le masque de la journée scolaire est tombé — un signe de confiance et d'épuisement
Ne veut pas commencer, s'arrêter ou changer d'activité	Inertie autistique — changer de voie coûte une énergie réelle
Ne veut pas manger, boire ou aller aux toilettes lorsqu'il est absorbé	Les choses hors du tunnel ne sont pas enregistrées
Déresse face au bruit, aux lumières, à la foule	Surcharge sensorielle après une longue journée
S'accroche à un objet, une routine ou un intérêt	Ce sont des ancres de régulation et de sécurité

Essayez ceci

- **Faites de l'arrivée un moment de décompression** — un accueil calme, sans exigences ; ne les orpillez pas de questions sur leur journée d'école.
- **Maintenez une routine prévisible**, ainsi que la stabilité du personnel et des espaces ; prévenez avant chaque changement ; offrez un coin calme et peu éclairé.
- **Protégez l'intérêt et le temps de repos** — le jeu côte à côte, guidé par l'intérêt, est une forme de régulation et de récupération.
- **Utilisez des rappels doux et spécifiques** pour la nourriture, la boisson et les toilettes ; prévoyez du repos, pas plus d'exigences.
- **Ayez un plan calme pour les meltdowns/shutdowns** : réduisez les stimulus, assurez la sécurité, donnez du temps, ne tentez pas de raisonner ou d'immobiliser sur le moment.
- **Échangez régulièrement des notes avec la famille et l'école** — la cohérence entre les trois environnements évite bien des journées difficiles.

Évitez ceci

- Accumuler les activités, les jeux de groupe ou demander « comment s'est passée l'école ? » à un enfant déjà épuisé.

- Changements surprises, travail de groupe forcé, ou arrêter le stimming.
- Interpréter un crash comme de la malveillance, ou un moment de silence comme un signe que « tout va bien ».

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique / à la « régression »** — une baisse des compétences signifie généralement une *surcharge* ; répondez en **réduisant les exigences et en restaurant le repos et les intérêts**. Recherchez d'abord la **douleur ou la surcharge** pour toute nouvelle détresse. Collaborez avec les parents et le référent handicap/inclusion de l'école.

Si l'enfant est une fille

Les filles camouflent énormément et peuvent arriver après avoir tenu le coup toute la journée ; l'enfant calme et docile peut être au bord du shutdown. Surveillez le retrait et interrogez-la avec douceur.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — **Grandir Monotropique** (Partie 1), le **Guide pour la famille** (Partie 3) et le brief **Monotropisme**. Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'enfant individuellement.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Reframing Autism (2023); Kelly Mahler (2024, interoception); Edgar (2024, régression/burnout). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.