

Ein autistisches Kind in Ihrem Training / Angebot

Für Sportübungsleiter:innen, Sportlehrkräfte und Aktivitäten-Leitende — ein autistisches Grundschulkind (etwa 6–11 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass die Aufmerksamkeit eines Kindes sich in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Sport-Settings sind oft laut, unvorhersehbar und sozial fordernd — weshalb autistische Kinder im Mittel **weniger aktiv sind als Peers**, nicht aus mangelndem Interesse, sondern aus Barrieren der Umwelt. Widerstand beim Wechsel ist **Trägheit** (die Spur zu wechseln kostet Energie), kein Trotz. Die Forschung ist klar, was hilft: vorhersagbare Routinen, sensorisch freundliche Räume, gute Beziehungen und ein stärkebasierter, spielbasierter Ansatz. Definieren Sie Erfolg um — das Ziel in diesem Alter ist ein Kind, das **nächste Woche wiederkommen möchte**.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Beginnt, stoppt oder wechselt Übungen nicht; „trotzig“	Autistische Trägheit — die Spur zu wechseln kostet echte Energie
Meltdown oder Rückzug bei der Trillerpfeife oder in der Halle	Sensorische Überlastung durch Lärm, Echo, Licht — unwillkürlich
Tief in eine Fähigkeit oder Routine vertieft	Einfokus-Stärke — lassen Sie es dabei bleiben
Bemerkt Durst, Überhitzung oder eine Schramme nicht	Interozeptions -Unterschiede, wenn vertieft
Nimmt Coaching wörtlich; braucht einen Moment zum Antworten	Wörtliche, eingekanalige Kommunikation + Verarbeitungszeit

Versuchen Sie dies

- **Vorhersagbares Auf- und Abwärmen in jeder Stunde** als Übergangsrampe; warnen Sie vor dem Übungswechsel.
- **Zeigen Sie, dann sagen Sie** — visuelle Demonstration schlägt eine Rede; **eine Anweisung nach der anderen** in klarer Sprache.
- **Reduzieren Sie plötzlichen Schall** (Handzeichen, leises Klatschen), erlauben Sie Gehörschutz und weiche Kleidung; warnen Sie vor einer Trillerpfeife.
- **Geplante, konkrete Trink- und Ruhepausen** — fragen Sie nach („jetzt Wasser — ja, du!“), da das Kind Durst vielleicht nicht meldet.
- **Bieten Sie Wahl und eine definierte Rolle** (Punktierzähler:in, Aufwärm-Leitung) — Kontrolle senkt Angst; feiern Sie Einsatz und das Interesse.
- **Haben Sie einen Plan für Überlastung**: eine vereinbarte ruhige Ecke und ein Zeichen, um herauszutreten.

Vermeiden Sie dies

- Überraschende Wechsel, kurzfristige Spielplanwechsel oder erzwungene Gruppen-Paararbeit ohne Vorbereitung.
- Stimming und Bewegung bestrafen oder öffentlich stoppen.

- Ein Erstarren/Shutdown als „gibt sich keine Mühe“ oder Trotz lesen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Einzel sportarten (Schwimmen, Laufen, Kampfsport, Klettern, Leichtathletik) passen oft zu monotropen Kindern — weniger simultane soziale Kanäle, klare Struktur, Raum für tiefen Fokus. Mannschaftssport kann wunderbar funktionieren, *wenn* die soziale Last gemanagt wird (klare Rollen, unterstützende Mitspieler:innen). Sprechen Sie mit den Eltern über Auslöser und was das Kind reguliert.

Wenn das Kind ein Mädchen ist

Mädchen masken stark und werden vielleicht übersehen; das ruhige, folgsame Kind läuft vielleicht leer. Achten Sie auf Rückzug und fragen Sie behutsam nach.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — **Monotrop aufwachsen** (Teil 4, Sport & Coaching), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 3) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an das einzelne Kind an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, Scoping-Review körperliche Aktivität); Dwyer (2025). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.