

Il vostro bambino autistico alle scuole primarie

Per genitori e assistenti familiari — capire e sostenere un bambino autistico alle scuole primarie (circa 6–11 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione del vostro bambino si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Quel tunnel è il suo motore — di gioia, calma, abilità e identità. Il dono più grande che potete fare è un ambiente che funzioni *con* la sua attenzione, non contro di essa: routine prevedibili, interessi protetti, minor carico sensoriale e tempo per riprendersi dallo sforzo di trattenersi a scuola.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Focus intenso su un argomento, a volte per anni	Una passione che porta gioia, calma e apprendimento — non un'„ossessione” da limitare
„Va bene a scuola”, meltdown o shutdown appena a casa	Casa è il luogo sicuro dove la maschera della giornata finalmente cade — un segno di fiducia ed esaurimento
Non vi sente; „ignora” fame, sete, il bagno	Quando è assorbito, le cose fuori dal tunnel davvero non si registrano
Lento a iniziare, fermare o cambiare; meltdown nei passaggi	Inerzia autistica — cambiare binario costa energia reale
Forti reazioni a suoni, luci, vestiti, cibo	Differenze sensoriali: uno stimolo <i>dentro</i> il tunnel è sentito intensamente; uno <i>fuori</i> può non registrarsi

Provate questo

- **Protegete e usate l'interesse.** Costruite matematica, lettura e connessione *attraverso* di esso; mai „disabituare” una passione sana. Entrateci a volte — sedersi accanto con genuina curiosità è potente.
- **Rendete la giornata prevedibile** — routine stabili per mattine, doposcuola, pasti e bedtime — e date avvisi prima di ogni transizione („10 minuti... 2 minuti...”).
- **Abbassate il carico sensoriale** a casa: un angolo quieto, luce con dimmer, cuffie per i rumori forti, vestiti comodi/senza cuciture.
- **Riducete le richieste nei giorni difficili.** Se si è trattenuto a scuola, aspettatevi un crollo dopo — inserite tempo di recupero calmo e basato sugli interessi.
- **Avere un piano per meltdown/shutdown:** restate calmi, abbassate il carico (silenzio, penombra, meno persone), non ragionate né giudicate sul momento, date tempo, tenete tutti al sicuro.

Evitate questo

- Trattare l'interesse come un problema da gestire, o il meltdown come monelleria.
- Forzare il contatto visivo, l'immobilità o richieste extra quando è già esausto.

- Accumulare attività doposcuola e piani sociali — il riposo è un bisogno, non pigrizia.

Quando serve altro supporto

Un calo improvviso di abilità di solito segnala **sovraccarico/burnout**, non capacità perduta — rispondete riducendo le richieste e ripristinando riposo e interessi. Sostenete la scuola (referente SEN/SEND, uno spazio quieto, apprendimento basato sugli interessi). Guardatevi da **ansia e bullismo**. Cercate il supporto familiare guidato da persone autistiche e una comprensione dell'autismo inquadrata in positivo per i fratelli.

Se il vostro bambino è una bambina

Le bambine camuffano molto e sono spesso mancate — la „perfezionista ansiosa” e quiete può essere una bambina autistica esausta. Fidatevi dei vostri istinti e spingetevi per la valutazione se la scuola vede solo una superficie compiacente.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — **Crescere in modo monotropico** (Parte 1), la guida per la **famiglia** (Parte 3) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Conoscete il vostro bambino meglio di chiunque altro; adattate questo a lui/lei.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023; 2022, routine); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Reframing Autism (2023); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space, meltdown/shutdown). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.