

Ein autistischer Teenager / eine autistische Teenagerin, den/die Sie begleiten

Für Betreuungskräfte, Assistenzkräfte, Mentor:innen und Jugendarbeit — einen autistischen Teenager (etwa 12–18 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Teenagers in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Dies ist das **Spitzenalter für Angst, Depression und Burnout**, und viele autistische Teenager masken den ganzen Tag und kommen erschöpft zu Ihnen. Ihre Rolle ist stetige, vorhersagbare, anforderungsarme Unterstützung: halten Sie Routinen, schützen Sie ihre Interessen und achten Sie auf die Überlastung und das Burnout, das sie vielleicht nicht benennen. Nehmen Sie ihr Innenleben ernst und lesen Sie einen Shutdown nie als „will nicht mitmachen“.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Erschöpft, zurückgezogen, verweigert die Teilnahme	Wahrscheinlich Burnout oder Überlastung — von Faulheit zu unterscheiden
Wird plötzlich still oder geht	Shutdown — unwillkürlich; braucht Ruhe und Zeit, keinen Druck
Klammert an Routinen, Objekte, ein Interesse	Diese sind Regulation und Identität , keine „Zwänge“
Meldet keinen Schmerz, Hunger oder Kranksein	Interozeptions -Unterschiede; „nicht sagen“ ≠ „nicht leiden“
Will alles jedes Mal auf dieselbe Weise	Vorhersagbarkeit senkt eine ohnehin hohe Last

Versuchen Sie dies

- **Halten Sie Personal, Routinen und Orte konsistent**; warnen Sie vor jedem Wechsel; schaffen Sie den Plan *mit* ihnen gemeinsam.
- **Schützen Sie das Interesse und die Ruhezeit** als Regulation und Erholung, nicht als „Verwöhnen“.
- **Kommunizieren Sie wörtlich, eins nach dem anderen**, oft schriftlich/per Text; gewähren Sie Verarbeitungszeit und Wahl.
- **Senken Sie die sensorische Last** — ruhiger, schwach beleuchteter Raum; erlauben Sie Kopfhörer, Stimming und Bewegung.
- **Haben Sie einen ruhigen Meltdown-/Shutdown-Plan**: reduzieren Sie Input, sichern Sie Sicherheit, geben Sie Zeit, kein Festhalten.
- **Fragen Sie direkt, wörtlich** nach Stimmung und Sicherheit, wenn Sie sich Sorgen machen — und geben Sie Bedenken weiter.

Vermeiden Sie dies

- Überraschungswechsel, Druck zum Maskieren oder „Mach mit!“-Forderungen, wenn sie erschöpft sind.
- Stimming stoppen oder einen Shutdown als Verweigerung lesen.

- Eine ruhige, maskierte Stunde mit „gut sein“ gleichsetzen.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Toleranz) und Krisenzeichen — teilen Sie Bedenken der Familie und, wo angemessen, der Schutzbeauftragten/dem Schutzbeauftragten mit. Untersuchen Sie **zuerst Schmerz oder Krankheit** bei jeder neuen Belastung. Verweisen Sie an autistisch geführte Peer-Gruppen und Mentor:innen.

Wenn der Teenager ein Mädchen oder ein marginalisiertes Geschlecht ist

Camouflaging gipfelt hier; die ruhige, „ängstliche Perfektionistin“ kann ein erschöpfter autistischer Teenager sein, der leerläuft. Nehmen Sie ein privates, wörtliches Nachfragen ernst.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4), der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.3) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, Burnout); Pearson & Rose (2021, Masking); Kelly Mahler (2024). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.