

Un adolescente autista a quien apoyas

Para trabajadores de apoyo, asistentes personales, mentores y trabajadores juveniles — apoyar a un adolescente autista (aproximadamente de 12 a 18 años).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un adolescente se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. Esta es la **edad crítica para la ansiedad, la depresión y el burnout**, y muchos adolescentes autistas camuflan todo el día y llegan a usted agotados. Su papel es brindar un apoyo estable, predecible y de baja demanda: mantenga las rutinas, proteja sus intereses y vigile la sobrecarga y el burnout que pueden no saber nombrar. Tome en serio su vida interior y nunca interprete un bloqueo como «no quiere participar».

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Agotado, retraído, se niega a participar	Probable burnout o sobrecarga — distinto de la pereza
Se queda en silencio o se va repentinamente	Bloqueo (<i>shutdown</i>) — involuntario; necesita calma y tiempo, no presión
Se aferra a rutinas, objetos o un solo interés	Estos son regulación e identidad , no «obsesiones»
No reporta dolor, hambre o malestar	Diferencias de intérocepción ; «no decirlo» ≠ «no sufrir»
Quiere que las cosas sean de la misma manera, siempre	La previsibilidad reduce una carga que ya es alta

Intente esto

- **Mantenga la coherencia en el personal, las rutinas y los lugares**; avise antes de cada cambio; co-crea el plan *con* ellos.
- **Proteja el interés y el tiempo de descanso** como regulación y recuperación, no como «capricho».
- **Comunique littéralmente, un elemento a la vez**, a menudo por escrito o mensaje de texto; deje tiempo de procesamiento y ofrezca opciones.
- **Reduzca la carga sensorial** — espacio tranquilo y con poca luz; permita el uso de auriculares, el *stimming* y el movimiento.
- **Tenga un plan tranquilo para el colapso/bloqueo**: reduzca la estimulación, asegure la seguridad, dé tiempo, no contenga.
- **Pregunte directa y literalmente** sobre el estado de ánimo y la seguridad si está preocupado — y transmita sus inquietudes.

Evite esto

- Cambios sorpresa, presión para camuflar o demandas de «¡únete!» cuando están agotados.
- Detener el *stimming*, o interpretar un bloqueo como un rechazo.
- Assimilar una hora calma y camuflada con estar «bien».

Cuándo buscar más apoyo

Vigile el **burnout autístico** (agotamiento, pérdida de habilidades, reducción de la tolerancia) y los signos de crisis — comparta sus inquietudes con la familia y, cuando sea apropiado, con el responsable de protección. Investigue la **dolor o la enfermedad en primer lugar** para cualquier nueva angustia. Oriente hacia grupos de pares autistas y mentores.

Si el adolescente es una niña o de género marginalizado

El camuflaje llega a su punto máximo aquí; la adolescente tranquila y «perfeccionista ansiosa» puede ser una persona autista agotada funcionando al límite. Tome en serio una comprobación privada y literal.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la **Guía para la familia** (Parte 4), el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.3) y la brève sobre el **Monotropism**. Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo** — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico. Adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024). Las citas completas están en los borradores fuente.