

Un adolescent autiste que vous accompagnez

Pour les travailleurs de soutien, les assistants personnels, les mentors et les animateurs jeunesse — soutenir un adolescent autiste (environ 12 à 18 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adolescent se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. C'est **l'âge critique pour l'anxiété, la dépression et le burnout**, et beaucoup d'adolescents autistes camouflent toute la journée et arrivent chez vous épuisés. Votre rôle est d'apporter un soutien stable, prévisible et à faible exigence : maintenez les routines, protégez leurs intérêts, et soyez attentif à la surcharge et au burnout qu'ils ne savent peut-être pas nommer. Prenez leur vie intérieure au sérieux, et ne considérez jamais un shutdown comme un « refus de s'engager ».

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Épuisé, retiré, refuse de participer	Probable burnout ou surcharge — distinct de la paresse
Devient silencieux ou part soudainement	Shutdown — involontaire ; nécessite du calme et du temps, pas de la pression
S'accroche aux routines, aux objets, à un seul intérêt	Ce sont des outils de régulation et d'identité , pas des « obsessions »
Ne signale pas la douleur, la faim ou le malaise	Différences d' intéroception ; « ne pas dire » ≠ « ne pas souffrir »
Veut que les choses soient identiques, à chaque fois	La prévisibilité réduit une charge déjà élevée

Essayez ceci

- **Maintenez la cohérence du personnel, des routines et des lieux** ; prévenez avant chaque changement ; co-créez le plan *avec* eux.
- **Protégez l'intérêt et le temps de repos** comme des outils de régulation et de récupération, et non comme des « caprices ».
- **Communiquez littéralement, une chose à la fois**, souvent par écrit ou SMS ; laissez du temps de traitement et offrez des choix.
- **Réduisez la charge sensorielle** — espace calme et peu éclairé ; autorisez le casque, le stimming et le mouvement.
- **Ayez un plan calme pour les meltdowns/shutdowns** : réduisez les stimulus, assurez la sécurité, laissez du temps, pas de contention.
- **Interrogez directement et littéralement** sur l'humeur et la sécurité si vous êtes inquiet — et transmettez vos préoccupations.

Évitez ceci

- Changements surprises, pression pour camoufler, ou exigences de type « rejoins-nous ! » quand l'adolescent est épuisé.
- Arrêter le stimming, ou interpréter un shutdown comme un refus.
- Assimiler une heure calme et masquée à un état « tout va bien ».

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** (épuisement, perte de compétences, tolérance réduite) et aux signes de crise — partagez vos préoccupations avec la famille et, le cas échéant, le responsable de la protection. Recherchez d'abord la **douleur ou la maladie** pour toute nouvelle détresse. Orientez vers des groupes de pairs autistes et des mentors.

Si l'adolescent est une fille ou d'un genre marginalisé

Le camouflage atteint un sommet ici ; l'adolescent(e) calme, « perfectionniste et sociable » peut être un autiste épuisé fonctionnant à vide. Prenez au sérieux un point de situation privé et littéral.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour la famille** (Partie 4), le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Partie 3.3) et le brief **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.