

Ein autistischer Student / eine autistische Studentin, den/die Sie im Studium begleiten

Für Behinderten-Begleitkräfte, Mentor:innen, Mitschrifthilfen und Assistenzkräfte — einen autistischen Studierenden (etwa 18–25 Jahre) unterstützen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit einer Studierenden/eines Studierenden in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Das Studium ist ein *gewaltiger* Übergang, und viele autistische Studierende **prallen an eine Wand** — Burnout, Angst oder Krise — im ersten oder zweiten Jahr. Als Begleitkraft oder Mentor:in können Sie die stetige, vorhersagbare Beziehung sein, die sie über Wasser hält: klare Kommunikation, geschützter Fokus und frühe Warnung, wenn die Last ins Burnout kippt.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Hört auf zu kommen, zu antworten oder zur Selbstfürsorge	Autistisches Burnout durch kumulative Studienlast
Will alles per E-Mail; meidet Anrufe/Treffen	Eingekanalige Kommunikation senkt die Last
Verpasst Fristen, kann Aufgaben nicht beginnen	Autistische Trägheit + exekutive Überlastung, keine Faulheit
Wird tagelang still oder zieht sich zurück	Shutdown/Erholung unter Überlastung
Erst jetzt, in der Krise, erkannt	Ein häufiger Punkt später Erkennung

Versuchen Sie dies

- **Seien Sie die vorhersagbare Beziehung** — gleiche Zeit, gleiche Person, gleiches Format; bestätigen Sie schriftlich.
- **Kommunizieren Sie schriftlich**, wörtlich, eine Aufgabe nach der anderen; helfen Sie, Aufgaben in Schritte zu zerlegen.
- **Schützen Sie Fokus und Interesse** — strukturieren Sie das Lernen um ihre Tunnel, nicht um ständiges Wechseln.
- **Normalisieren Sie reduzierte Last** — eine Fristverlängerung, Verschiebung oder ein Unterbruch ist ein legitimer Erholungsschritt.
- **Kennen Sie die Wegweiser** — Behindertenservice, Wohlbefinden, Mentoring, autistische Studierenden-Communities — und gehen Sie *mit* ihnen.
- **Fragen Sie wörtlich nach**, wenn sie still wird; Burnout braucht reduzierte Last, keine Motivationsrede.

Vermeiden Sie dies

- Überraschungswechsel, Druck zum „Durchziehen“ oder allgemeiner Sozialkompetenz-Rat.
- Schweigen oder eine verpasste Sitzung mit „nicht engagiert“ gleichsetzen.
- Für sie entscheiden — unterstützen Sie Autonomie und Wahl.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Achten Sie auf **autistisches Burnout** (Erschöpfung, Kompetenzverlust, verminderte Toleranz) und Krisenzeichen — eskalieren Sie an das Wohlbefindens-/Behindertenteam und, wo nötig, den Schutz. Eine vorübergehende Lastreduktion ist ein evidenzangemessener Erholungsschritt, kein Scheitern.

Wenn der/die Studierende eine Frau ist

Spät-erkannte Frauen masken stark; eine „gesellige Überfliegerin“ bricht vielleicht privat zusammen. Nehmen Sie verminderte Toleranz und Rückzug ernst, wie „zusammen“ sie auch wirkt.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Knight (2021, *Tunnel statt Aufgaben*); Pearson & Rose (2021). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.