

Un estudiante autista a quien apoyas en la universidad

Para trabajadores de apoyo a la discapacidad, mentores, transcriutores y asistentes personales — apoyar a un estudiante (aproximadamente de 18 a 25 años).

la idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un estudiante se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. La universidad es una transición *masiva*, y muchos estudiantes autistas **chocan contra un muro** —burnout, ansiedad o crisis— en su primer o segundo año. Como trabajador de apoyo o mentor, puedes ser la relación estable y predecible que los mantenga a flote: comunicación clara, focalización protegida y una señalización temprana cuando la carga deriva en burnout.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Deja de asistir, de responder o de cuidar de sí mismo	Burnout autístico por la carga universitaria acumulada
Quiere todo por correo electrónico; evita llamadas/reuniones	La comunicación de canal único reduce la carga
No entrega trabajos, no puede empezar las tareas	Inercia autística + sobrecarga ejecutiva, no es pereza
Se queda en silencio o se retira durante días	Bloqueo (<i>shutdown</i>) / recuperación bajo sobrecarga
Identificado solo ahora, en crisis	Un punto común de identificación tardía

Intente esto

- **Sea la relación predecible** — misma hora, misma persona, mismo formato; confirme por escrito.
- **Comunique por escrito**, literalmente, una tarea a la vez; ayude a descomponer las tareas en pasos.
- **Proteja la focalización y el interés** — estructure el estudio alrededor de sus túneles, no con cambios constantes.
- **Normalice la reducción de la carga** — una prórroga, un aplazamiento o una interrupción es un paso de recuperación legítimo.
- **Conozca los recursos** — servicio de discapacidad, bienestar, mentorazgo, comunidades de estudiantes autistas — y vaya *con* ellos.
- **Pregunte literalmente** cuando se queden en silencio; el burnout requiere reducción de carga, no una charla motivacional.

Evite esto

- Cambios sorpresa, presión para «resistir» o consejos genéricos de habilidades sociales.
- Assimilar el silencio o una sesión faltada con «falta de compromiso».
- Tomar decisiones *por* ellos — apoye la autonomía y la elección.

Cuándo buscar más apoyo

Vigile el **burnout autístico** (agotamiento, pérdida de habilidades, reducción de la tolerancia) y los signos de crisis — escale el caso al equipo de bienestar/discapacidad y, si es necesario, al responsable de protección. Una reducción temporal de la carga es un paso de recuperación alineado con la evidencia, no un fracaso.

If the student is a woman

Las mujeres identificadas tardíamente camuflan intensamente; una «estudiante sociable y exitosa» puede estar colapsando en privado. Tome en serio la reducción de la tolerancia y el retiro, sin importar cuán bien parezcan estar.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.4), la **Guía para la familia** (Parte 4) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero.

Informativo — no es un herramienta de diagnóstico. Adáptelo al individuo.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Knight (2021, *tunnels not tasks*); Pearson & Rose (2021). Las citas completas están en los borradores fuente.