

Un étudiant autiste que vous accompagnez à l'université

Pour les travailleurs du soutien au handicap, les mentors, les preneurs de notes et les assistants personnels — soutenir un étudiant autiste (environ 18 à 25 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un étudiant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. L'université est une transition *massive*, et beaucoup d'étudiants autistes **frappent un mur** — burnout, anxiété ou crise — lors de leur première ou deuxième année. En tant que travailleur de soutien ou mentor, vous pouvez être la relation stable et prévisible qui les maintient à flot : communication claire, focus protégé, et signalement précoce lorsque la charge bascule vers le burnout.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Arrête de venir, de répondre ou de s'occuper de soi	Burnout autistique résultant de la charge cumulative universitaire
Veut tout par email ; évite les appels/réunions	La communication sur un canal unique réduit la charge
Rate les dates limites, ne peut pas commencer les tâches	Inertie autistique + surcharge exécutive, pas de la paresse
Deviens silencieux ou se retire pendant des jours	Shutdown/récupération sous l'effet de la surcharge
Identifié seulement maintenant, en pleine crise	Un point d'identification tardive courant

Essayez ceci

- **Soyez la relation prévisible** — même heure, même personne, même format ; confirmez par écrit.
- **Communiquez par écrit**, littéralement, une tâche à la fois ; aidez à décomposer les tâches en étapes.
- **Protégez le focus et l'intérêt** — structurez l'étude autour de leurs tunnels, évitez les basculements constants.
- **Normalisez la réduction de la charge** — un report, un report d'échéance ou une interruption est une étape de récupération légitime.
- **Connaissez les points de repère** — service du handicap, bien-être, mentorat, communautés d'étudiants autistes — et allez-y *avec* eux.
- **Interrogez littéralement** lorsqu'ils deviennent silencieux ; le burnout nécessite une réduction de la charge, pas un discours de motivation.

Évitez ceci

- Changements surprises, pression pour « persévérer », ou conseils génériques sur les compétences sociales.
- Assimiler or silence ou une séance manquée à un « manque d'engagement ».
- Prendre des décisions *à leur place* — soutenez l'autonomie et le choix.

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** (épuisement, perte de compétences, tolérance réduite) et aux signes de crise — alertez l'équipe bien-être/handicap et, si nécessaire, le responsable de la protection. Une réduction temporaire de la charge est une étape de récupération alignée sur les preuves, et non un échec.

Si l'étudiant est une femme

Les femmes identifiées tardivement camouflent intensément ; un étudiant « sociable et performant » peut s'effondrer en privé. Prenez au sérieux la réduction de la tolérance et le retrait, quel que soit l'aspect extérieur.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Partie 3.4), le **Guide pour la famille** (Partie 4) et le brief **Monotropisme**. Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Knight (2021, *tunnels not tasks*); Pearson & Rose (2021). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.