

Medir el monotropismo: inercia, «fricción» y energía cognitiva — lo que la evidencia realmente apoya

Un brief de investigación citado — verificando el encuadre de «puntuar el monotropismo en niveles».

Informativo, no consejo médico. Este brief evalúa cómo el monotropismo puede y no puede medirse. El Monotropism Questionnaire (MQ) es un instrumento de investigación de autoinforme, **no una herramienta diagnóstica o clínica**, y no tiene bandas de severidad validadas.

Resumen ejecutivo

- **Su instinto es correcto en la idea central y erróneo en el envoltorio.** La noción de que el monotropismo puede *medirse* a lo largo de un espectro, y que la cantidad realmente de interés es el **esfuerzo («fricción») de cambiar de estados atencionales**, está bien apoyada — pero la taxonomía específica de cuatro niveles («Bajo / Moderado / Alto / Extremo-Absoluto») es un encuadre popular, **no una clasificación científica validada**.
- **El monotropismo es correctamente un *rasgo dimensional*, no un síndrome.** La única medida validada — el **Monotropism Questionnaire (MQ)**, Garau et al. 2023 — devuelve una puntuación continua de 1 a 5. **No tiene umbral publicado, ni bandas de percentiles, ni niveles de severidad** [2]. Dividirlo en niveles con nombre es siempre una decisión editorial arbitraria.

- **La «fricción» de cambiar ya tiene un nombre: *inercia autista*.** Es un constructo real, cada vez más investigado — dificultad para *iniciar, detener y cambiar* tareas que «no está bajo control consciente». Se articuló primero en narrativas comunitarias autistas y ahora en trabajo revisado por pares [3][4][5]. Su «fricción de cambio» es esencialmente esto.
- **La «inercia atencional» confunde dos cosas distintas.** *Inercia autista* (nivel tarea: difícil iniciar/detener/cambiar) y *atención pegajosa / desenganche alterado* (nivel estímulo: difícil apartar la atención de algo, p. ej. Landry & Bryson 2004; metanálisis Sacrey 2015) están relacionadas pero se miden de forma diferente [6][7]. Agruparlas bajo un término pierde precisión.
- **La «economía de energía cognitiva» es el encuadre más fuerte** — y ya existe académicamente como el modelo de «**asignación atípica de recursos**» de Goldknopf (2013), que trata el autismo como una diferencia en *cuánto y dónde* se gastan los recursos atencionales [10]. Esta es la versión neuroafirmativa, no deficitaria, de lo que usted describe.
- **El vínculo burnout/shutdown/meltdown es real pero heurístico.** El burnout autista (agotamiento, pérdida de habilidades, tolerancia reducida) es un constructo establecido, y el vínculo *narrativo* con el cambio forzado + el enmascaramiento es convincente y validado por la comunidad — pero la vía específica «monotropismo → ruptura de túnel → burnout» es en gran medida teórica y en primera persona, no establecida todavía experimentalmente [8][9].

1. ¿Puede «puntuarse» el monotropismo? Sí — como un continuo, no como niveles

El monotropismo es un relato del autismo basado en la atención: una mente monotrópica canaliza recursos de procesamiento a un pequeño número de «túneles de atención» intensamente activados en lugar de repartirlos entre muchos canales [1]. Como se describe como una *diferencia en la asignación de recursos*, es naturalmente un **espectro**, no una categoría — que es exactamente por qué su intuición de «niveles» se siente acertada.

El instrumento validado es el **Monotropism Questionnaire (MQ)** — 47 ítems, puntuados en una escala Likert de 5 puntos, desarrollado en 2023 por Garau y colegas *en colaboración con un grupo comunitario liderado por autistas* [2]. Dos cosas son decisivas para su pregunta:

- **Devuelve una única media continua (1–5), más ocho medias de subescala.** En el estudio de validación (1.110 participantes), los participantes autistas promediaron **4,15** y los no autistas **3,19**, con el TDAH elevando independientemente las puntuaciones [2]. Las dos distribuciones se solapan fuertemente — muchos no autistas superan a algunos autistas, y viceversa.
- **No hay punto de corte, ni umbral diagnóstico, ni banda de severidad.** Un escrutinio del artículo de validación confirma que la palabra «cutoff» solo aparece como una cita *estadística* (criterios de índice de ajuste de Hu & Bentler) y «sensitivity» solo como un *análisis de sensibilidad* de cómo se definió el autismo [2]. Los propios autores del MQ no proponen niveles.

Entonces, ¿qué «significa» una puntuación? Solo su posición relativa en la dimensión. La aplicación en línea comunitaria que inspiró esta pregunta traduce útilmente una puntuación en un *percentil* («más monotrópico que aproximadamente el X % de personas autistas / alísticas»), calculado a partir de la muestra de validación — y esa es una forma razonable y honesta de situar una puntuación. Pero es **un percentil descriptivo, no una banda clínica**: «el percentil 97 de tendencia monotrópica» es significativo; «Nivel 3 / Monotropismo extremo» es una etiqueta que la evidencia no confiere.

Conclusión: *puntúelo, grafíquelo, percentilícelo — pero no lo nivele. El continuo es real; las categorías con nombre no lo son.*

2. Su «fricción de cambio» ya existe: se llama **inercia autista**

Esta es la corrección-por-nombre más importante del brief. El fenómeno que describe — el coste cognitivo de entrar en y especialmente salir de un túnel de atención — es un constructo establecido llamado **inercia autista**: una dificultad para **iniciar, detener y cambiar tareas que no está bajo control consciente** [3].

Tres cosas lo hacen directamente relevante:

- **Se originó en la comunidad autista y ha entrado en la literatura revisada por pares.** La Association for Psychological Science describe la inercia autista como «un concepto articulado primero en narrativas comunitarias autistas», ahora respaldado por trabajo cualitativo y teórico [4]. El estudio de relatos en primera persona de Karen Buckle encontró que los participantes describían repetidamente ser incapaces de iniciar, detener o cambiar actividades a voluntad [3].
- **La literatura usa literalmente su lenguaje de «fricción».** El artículo de la APS llama a la iniciación de tareas un «lanzamiento de alta fricción», enmarca el cambio como portador de «costes de cambio», y señala que una vez comprometido, «cambiar el foco requiere más esfuerzo cognitivo, a veces llevando al agotamiento» [4]. Su instinto de cuantificar el *esfuerzo/fricción* es el mismo movimiento que hacen los investigadores.
- **Se está formalizando ahora.** Trabajo reciente revisado por pares trata el «estado atascado» / iniciación de respuesta limitada como un fenómeno multinivel (muscular-conductual «micro», relacional y ambiental «meso/macro») y co-crea marcos de apoyo con personas autistas [5]; otros lo modelan a través de cuentas de procesamiento predictivo / inferencia activa (referenciado en [4]).

En resumen: si quiere medir la «fricción de cambio», está midiendo la inercia autista — y ese constructo ya tiene evidencia cualitativa, validez de experiencia vivida y una literatura cuantitativa creciente sobre la que construir.

3. La «inercia atencional» en realidad agrupa dos mecanismos diferentes

La precisión importa aquí, porque los dos mecanismos requieren lenguaje diferente y (eventualmente) medidas diferentes.

3.1 Inercia autista — nivel tarea, sobre agencia e impulso. Dificultad para *iniciar*, *terminar* y *cambiar* actividades, experimentada como esfuerzo desproporcionado y una pérdida de control voluntario (la sensación de «un objeto en movimiento permanece en movimiento / en reposo permanece en reposo») [3][4]. Es el ajuste más cercano a su idea de «sacarse a sí mismo del túnel».

3.2 Atención pegajosa / desenganche alterado — nivel estímulo, sobre percepción. Dificultad para *apartar la atención* de un estímulo una vez fijada. Landry & Bryson (2004) mostraron que niños autistas jóvenes eran notablemente más lentos para desenganchar de un estímulo central cuando aparecía uno periférico — «atención pegajosa» [6]. Una metanálisis de 2015 confirmó el desenganche de atención ralentizado a través de los estudios [7], y el mismo desenganche lento aparece en lactantes diagnosticados después como autistas [6]. Esto se mide con tareas experimentales (paradigmas gap/solapamiento), no con cuestionarios.

Por qué importa la distinción: la atención pegajosa es un efecto de captura *perceptivo* (literalmente no nota la interrupción); la inercia autista es un efecto de *control/impulso* (lo nota pero no puede cambiar). Sus descripciones de cuatro niveles en realidad se deslizan entre ambos — p. ej. «los estímulos de fondo no son procesados genuinamente por el cerebro» es atención pegajosa [6], mientras que «las transiciones forzadas se sienten como tirar de un tren fuera de sus vías» es inercia [3]. Un modelo cuidadoso debería mantenerlos etiquetados por separado, porque pueden tener causas y apoyos diferentes.

4. Los cuatro «niveles» propuestos — qué está apoyado, qué está inventado

Más que respaldar o descartar la taxonomía de plano, aquí está cada banda propuesta probada frente a la evidencia.

Nivel propuesto	Afirmación central	Veredicto de la evidencia
Bajo (dominante politrópica)	Muchas «pestañas» abiertas; coste de cambio casi cero	Apoyado como un extremo del continuo. Los puntuadores bajos del MQ y la media del grupo no autista (3,19) describen exactamente esto [2]. «Politrópico» es el propio término de la teoría para ello [1].
Moderado	Puede enfocarse profundamente pero retiene conciencia de base; coste de cambio leve	Apoyado como el medio de la dimensión. Los estados de flujo se reportan a través de la población; las puntuaciones del MQ entre las medias grupales capturan esta banda [2] [11]. Pero el <i>nombre</i> es arbitrario.

Nivel propuesto	Afirmación central	Veredicto de la evidencia
Alto	Prefiere un único túnel intenso; las interrupciones se pierden genuinamente; coste de cambio alto	Mecanismo apoyado, categoría no. Los componentes son reales — interrupciones perdidas = atención pegajosa [6][7]; coste de cambio alto = inercia autista [3][4]; fuerte asociación autismo/TDAH = hallazgos del MQ [2]. Pero no hay umbral que separe «Alto» de «Moderado».
Extremo / Absoluto	Inmersión total; la interrupción causa «choque neurológico», meltdowns, shutdowns	Exagerado. La inmersión profunda («flujo») y el malestar por la interrupción son reales [11], pero « absoluto » implica un salto cualitativo que los datos no muestran , y « choque neurológico » no es un término reconocido . Los meltdowns/shutdowns son respuestas involuntarias de abrumación, no un «choque» específico de una banda de monotropismo.

Tres problemas con publicar la taxonomía tal cual:

- 1. Implica saltos categóricos donde los datos muestran un continuo suave.** Las distribuciones del MQ de personas autistas y no autistas se solapan sustancialmente [2]; no hay «codo» natural que justificaría cuatro niveles discretos.
- 2. Introduce subrepticamente severidad/patología.** «Extremo/absoluto ... meltdowns, burnout» enmarca el extremo alto como inherentemente dañino — lo opuesto al encuadre neuroafirmativo que la teoría pretende [1]. Un monotropismo más alto *no* es lo mismo que peores resultados; los resultados dependen del *ajuste ambiental*, no del nivel.
- 3. Las bandas no tienen datos de fiabilidad.** Un sistema de niveles útil necesita mostrar que las personas caen en la misma banda al re-test y que las bandas predicen algo. Tal estudio no existe para el monotropismo.

Qué hacer en su lugar. Expresa la misma idea como una *posición en la dimensión* más un *perfil*: «alta tendencia monotrópica ($\approx$ top X % de la muestra autista), con inercia autista pronunciada en el cambio de tareas y meltdowns frecuentes por interrupción en entornos poco apoyadores». Eso es preciso, individualizado y no patologizador.

5. Interrupción → meltdown, shutdown, burnout: lo que la evidencia apoya

Esta parte de su encuadre es la más consecuente y necesita el mayor cuidado.

Los meltdowns y shutdowns son reales y bien descritos como respuestas involuntarias al estrés abrumador o a la carga sensorial/cognitiva (un «meltdown» externalizante frente a un «shutdown» internalizante de retirada) — reconocidos en la orientación clínica y el consenso comunitario. Los desencadena el *abrumamiento*, del cual la ruptura del túnel es una vía común [4][8].

El burnout autista es ahora un constructo definido. Dos estudios fundacionales — Raymaker et al. (2020) y Higgins et al. (2021, un estudio Grounded-Delphi con expertos autistas por experiencia) — convergen en una definición: **agotamiento crónico, pérdida de habilidades y tolerancia reducida al estímulo**, conceptualizado como resultante de estrés vital crónico y «un desajuste entre expectativas y capacidades» sin apoyo y recuperación adecuados [8][9].

El vínculo monotropismo → burnout es heurísticamente poderoso pero no establecido aún experimentalmente. La narrativa es convincente y validada por la comunidad: cada transición forzada es una ruptura de túnel; el enmascaramiento y cambio constantes en un mundo politrópico queman recursos; sin tiempo de recuperación/flujo, el sistema se agota [8][9][11]. Pero la contribución *específica* de la ruptura del túnel monotrópico al burnout — frente al enmascaramiento, el trauma, la carga sensorial y la demanda crónica — no se ha aislado experimentalmente. Enúncielo como una *hipótesis fuerte, comprobable*, no un hecho establecido.

La afirmación honesta, basada en la evidencia, es: «El burnout autista está impulsado por el estrés crónico, el enmascaramiento y un desajuste entre demandas y capacidad; el encuadre del monotropismo predice que el cambio forzado constante y la ruptura del túnel son un contribuyente importante y subreconocido — una predicción que encaja con la experiencia vivida y aguarda prueba directa.»

6. «Economía de energía cognitiva» — su encuadre más fuerte

Su movimiento final — cambiar de «déficit» a «cuánto combustible quema un cerebro al cambiar de marchas» — es exactamente correcto, y ya tiene un hogar académico.

El modelo de «**asignación atípica de recursos**» de Goldknopf (2013) operacionaliza el monotropismo como una diferencia de *economía de recursos*: los recursos atencionales en el autismo están **estrechados** (concentrados en menos/menos áreas, modalidades y etapas de procesamiento, a veces más intensamente) y/o **reducidos** en capacidad global [10]. En esta vista, el «coste» de una transición es literalmente el gasto energético de romper un patrón de asignación y construir otro. Eso es «economía de energía cognitiva» enunciada con precisión — y es el encuadre más consistente con una cuenta no patologizadora, porque enmarca el problema como *gasto* (una diferencia en la presupuestación) más que como *rotura*.

Este es el encuadre a mantener. Tres ventajas:

- Es **neutral en valor**: el enfoque intenso es un activo cuando el entorno lo apoya (flujo, pericia) y un coste cuando el entorno exige cambio constante [10][11].
- **Predice intervención**: reducir transiciones innecesarias, proteger el tiempo de flujo/recuperación, ajustar las demandas a la capacidad, y la «factura de combustible» cae — que es precisamente lo que recomienda la orientación de prevención del burnout [8][9].
- **Unifica** los fenómenos en sus cuatro niveles sin necesitar los niveles: los estímulos perdidos, el coste de cambio, el abrumamiento y el burnout se vuelven todos consecuencias de *cómo se asignan y agotan los recursos*, en un continuo.

7. Conclusiones prácticas — qué afirmar, y qué evitar

Afirmar con confianza:

- El monotropismo es un rasgo medible, **dimensional** (MQ, 1–5, con ocho subescalas); reporte la puntuación y el percentil opcional, no un «nivel» [2].

- La «**fricción de cambio**» que describe es **inercia autista** — un constructo real, originado en la comunidad, ahora revisado por pares [3][4][5].
- La **atención pegajosa / desenganche alterado** es un mecanismo distinto, medido experimentalmente [6][7].
- El **burnout autista** es un constructo definido impulsado por el estrés crónico, el enmascaramiento y el desajuste demanda–capacidad; la ruptura del túnel monotrópico es un contribuyente *plausible, validado por experiencia vivida* [8][9].
- «Economía de energía cognitiva» $\approx$ modelo de **asignación de recursos** de Goldknopf — el encuadre más preciso, neuroafirmativo [10].

Evitar o reetiquetar:

- **Niveles / bandas con nombre** («Bajo/Moderado/Alto/Extremo») — no validados; use posición-en-la-dimensión + perfil en su lugar.
- La «**inercia atencional**» como paraguas — difumina la inercia autista (tarea/control) con la atención pegajosa (percepción); use el término preciso [3][6].
- El monotropismo «**absoluto**» y el «**choque neurológico**» — términos no reconocidos; implican un salto categórico y una patología que los datos no apoyan.
- Enunciar la vía **monotropismo** → **burnout** como establecida — es una hipótesis fuerte, no un efecto medido [8].
- Cualquier encuadre donde **más alto = más alterado** — los resultados del monotropismo dependen del ajuste ambiental, no del nivel [1][10].

Fuentes

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.
doi:10.1177/1362361305051398 — origen de la teoría del monotropismo; lo enmarca como una diferencia en la asignación de recursos (un continuo), no un déficit. <https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (medida de autoinforme de 47 ítems; preprint de validación). Open

Science Framework. — puntuación dimensional 1–5 + 8 subescalas; n=1.110; media autista 4,15 vs no autista 3,19; el TDAH eleva las puntuaciones; **sin punto de corte/banda de percentil/nivel de severidad** (confirmado al escrutar el manuscrito de validación). Cuestionario: <https://osf.io/wpx5g> · preprint de validación: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Archivo local: `sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf`

[3] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia*. (Preprint / cualitativo). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — personas autistas describen la dificultad para iniciar, detener y cambiar actividades «que no estaba bajo su control consciente». Archivo local: `sources/11-autistic-inertia-osf.pdf` · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x> · Manchester Research Explorer: <https://research.manchester.ac.uk/en/publications/no-way-out-except-from-external-intervention-first-hand-accounts->

[4] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer, Association for Psychological Science. — enmarca la inercia autista como «articulada primero en narrativas comunitarias autistas», ahora revisada por pares; usa el lenguaje de «lanzamiento de alta fricción» y «costes de cambio»; cita Carls-Diamante & Laciny (2024), Greaves-Lord et al. (2023), Buckle et al. (2021), Heasman et al. (2024), Rapaport et al. (2024), Phung et al. (2021). <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[5] Greaves-Lord, L. et al. (2023). *[Getting 'stuck': an integrative approach to support autistic people]* Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2023.1229596. — marco cualitativo + Delphi revisado por pares sobre iniciación de respuesta limitada («estado atascado») en personas autistas a través de niveles micro/meso/macro, co-creado con personas autistas. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1229596>

[6] Landry, R. & Bryson, S. (2004). *Impaired disengagement of attention in young children with autism*. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1115–1122. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x — «atención pegajosa»: desenganche ralentizado de un estímulo. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>

[7] Sacrey, L.-A. et al. (2015). *Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis*. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 56, 111–121. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.011 — confirma el desenganche de atención ralentizado a través de los estudios.

<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>

[8] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — define el burnout autista como agotamiento crónico, pérdida de habilidades, tolerancia reducida al estímulo, por estrés vital crónico y desajuste de expectativas y capacidades.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · archivo abierto: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[9] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — definición de consenso: agotamiento, retirada, problemas de pensamiento, habilidades de vida diaria reducidas, aumento de rasgos autistas.

<https://www.autismcsrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

[10] Goldknopf, E. J. (2013). *Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism*. Frontiers in Integrative Neuroscience.

PMC3872719 — modela el autismo como una diferencia en la *asignación de recursos* (recursos atencionales estrechados y/o reducidos); la forma académica de la «economía de energía cognitiva».

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719>

[11] Rapaport, H., Clapham, H., Adams, J., Lawson, W., Porayska-Pomsta, K., & Pellicano, E. (2024). *"In a State of Flow": experiential validity of monotropism and its relation to autistic wellbeing*. Autism in Adulthood.

doi:10.1089/aut.2023.0032 — el polo positivo de la inmersión monotrópica profunda (flujo); apoya el encuadre «activo cuando se apoya». Archivo local: `sources/18-flow-experiential-validity-pmc.html` · <https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>