

## Crescere in modo monotropico

---

Una guida amichevole per genitori, nonni, insegnanti e allenatori di bambini autistici (dai 7 agli 11 anni)

---

**A chi è rivolta.** Questa guida è per gli adulti che circondano un **bambino autistico di circa 7–11 anni** la cui mente funziona in modo monotropico — una mente che si concentra in modo profondo e intenso su poche cose alla volta. Comprende **genitori e caregiver, nonni, zii, zie e altri familiari, insegnanti di scuola primaria** e **gli allenatori e istruttori** che seguono lo sport e le attività del bambino. Non è un manuale clinico. È una compagna in linguaggio semplice che vi aiuta a capire il bambino, a connettervi con lui e a rendere casa, scuola e campo sportivo più facili e più gioiosi.

**Una nota sul linguaggio.** La maggior parte delle persone autistiche preferisce il **linguaggio con l'identità per prima** („bambino autistico”), quindi questa guida lo usa. Alcune famiglie preferiscono „bambino con autismo” — seguite la preferenza del bambino e della famiglia. Questa guida evita deliberatamente parole come disturbo, anormale, carente, tragedia o fardello, tranne quando spiega idee che la famiglia può aver ricevuto altrove. L'autismo è una **differenza** — con sfide reali e punti di forza reali.

**L'idea da portare con sé.** "Se vi importa del benessere delle persone autistiche, dovete cercare di capire l'autismo. Se volete capire l'autismo, dovete capire il monotropismo." — Fergus Murray, insegnante e scrittore autistico.

## Parte 0 — L'idea da cogliere subito

L'attenzione della maggior parte delle persone è distribuita su molte cose contemporaneamente: l'orologio, il chiacchiericcio, la persona davanti, cosa c'è per cena. Una mente **monotropica** è diversa: tende a richiamare l'attenzione verso **un piccolo numero di canali profondi e intensi** in ogni momento. I ricercatori autistici Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser hanno chiamato questo fenomeno "**tunnel attentivo**" (Murray, Lesser & Lawson, 2005).

Pensate all'attenzione come a una quantità limitata di acqua. Una mente **politropica** (più tipica) è come un **irrigatore** — acqua distribuita su tutto il giardino. Una mente **monotropica** è come un **tubo con un ugello stretto** — meno terreno bagnato, ma tutto ciò che è nel getto è inaffiato *in profondità* (F. Murray, 2018). Nessuno dei due è „migliore". Ciascuno ha punti di forza e costi.

Questa unica differenza aiuta a spiegare quasi tutto il modo in cui il bambino che avete accanto vive il mondo.

### Cosa potreste vedere → cosa spesso sta davvero accadendo

| Potreste vedere...                                                              | Cosa spesso sta accadendo (monotropismo)                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interesse profondo, „ossessivo" per un argomento, a volte per anni              | Una <b>passione</b> che porta gioia, calma, abilità e identità — non un'„ossessione" da limitare o a cui „disabituare"                                              |
| Non sembra sentirvi; „ignora" le persone o i propri bisogni                     | Quando è completamente assorbito, la mente <b>non registra davvero</b> ciò che sta fuori dal tunnel — inclusi fame, sete, bagno, o qualcuno che parla               |
| Forti reazioni a certi suoni, luci, odori, tessuti — o sembra non sentire nulla | <b>Iper-</b> (eccessiva) o <b>ipo-</b> (insufficiente) reattività: uno stimolo <i>dentro</i> il tunnel è sentito intensamente; uno <i>fuori</i> può non registrarsi |
| Dondolare, sbattere le mani, canticchiare, ripetere parole o movimenti          | <b>Stimming</b> — input autogestito e prevedibile che calma e regola il sistema nervoso                                                                             |
| Lentezza nell'iniziare, fermare o cambiare attività; meltdown nei passaggi      | <b>Inerzia autistica</b> — cambiare „binario" mentale costa energia e tempo reali                                                                                   |

| Potrete vedere...                                                                                                     | Cosa spesso sta accadendo (monotropismo)                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parla in grande profondità di una passione; prende le cose molto alla lettera; ha bisogno di più tempo per rispondere | Comunicazione <b>a canale singolo, letterale</b> , più tempo di elaborazione — non maleducazione o „non ascolta"      |
| Improvviso meltdown o diventa silenzioso e ritirato                                                                   | Sovraccarico — un <b>meltdown</b> (reazione/sovraccarico) o uno <b>shutdown</b> (congelamento/ritiro), non monelleria |

In tutta la guida trasformeremo ciascuno di questi punti in **cose pratiche e amichevoli che potete fare** — a casa, a scuola e sul campo sportivo.

---

## Parte 1 — Per genitori e caregiver

---

Conoscete vostro figlio meglio di chiunque altro. Queste idee sono strumenti da provare, non regole da imporre. Il dono più grande che potete fare a un bambino monotropico è un ambiente che funzioni *con* la sua attenzione anziché contro di essa.

### 1.1 Proteggete e usate l'interesse speciale

L'interesse intenso di un bambino **non è un problema da gestire** — è il suo motore, il suo conforto, la sua porta verso il mondo. Come scrive l'autistico Wenn Lawson, le persone autistiche trovano *"molto più facile connettersi alla comprensione"* quando qualcosa è collegato alla loro area di interesse.

- **Costruite ponti attraverso di esso.** La matematica attraverso gli orari dei treni; la lettura attraverso i dinosauri; storie sociali con il suo personaggio preferito.
- **Non glielo „leviate".** Non c'è beneficio nel limitare una passione sana, e farlo può rimuovere una fonte chiave di regolazione e gioia.
- **A volte entrateci.** Sedersi accanto e mostrare genuina curiosità è uno dei modi più forti per connettersi.

## 1.2 Rendete la giornata prevedibile (e ammorbidite le transizioni)

L'inerzia autistica significa che **cambiare binario costa energia**. Ogni sorpresa o cambiamento improvviso è una tassa in più su un budget limitato (F. Murray, 2019; Reframing Autism, 2023).

- **Routine prevedibili** per mattine, doposcuola, pasti e bedtime. Le routine riducono il carico cognitivo — ma funzionano meglio quando sono *condivise*, non imposte dall'esterno (F. Murray, 2022).
- **Date avvisi prima delle transizioni:** „Tra dieci minuti si smette coi Lego e ci si prepara per il nuoto... tra due minuti...". I timer visivi aiutano.
- **„Tunnel, non compiti".** Il consulente autistico Jamie Knight descrive il pianificare attorno al focus del bambino: invece di trascinarlo fuori da un tunnel, provate ad **aprire uno spazio affinché il tunnel successivo possa attraversarlo** (Knight, 2021).
- **Dite il perché.** I bambini monotropici hanno spesso un forte istinto del „*Ma perché?*". Dare ragioni reali rende le transizioni molto più fluide del „perché lo dico io" (F. Murray, 2019).

## 1.3 Rispettate il mondo sensoriale

Le differenze sensoriali derivano direttamente dal monotropismo: uno stimolo *dentro* il tunnel è sentito intensamente; uno *fuori* può non registrarsi (Murray, Lesser & Lawson, 2005; Reframing Autism, 2023).

- **Abbassate il carico a casa:** interruttori con dimmer, un angolo più silenzioso, cuffie o cuffie antirumore per i rumori forti, vestiti comodi (tagliate le etichette fastidiose, permettete calze senza cuciture).
- **L'ipo-responsività è reale:** il bambino può non accorgersi di avere fame, freddo o bisogno del bagno quando è assorbito. Promemoria gentili e specifici („È un po' che non vai — pausa bagno?") aiutano, perché il bisogno è davvero uscito dalla consapevolezza (Lawson, sull'interocezione; Kelly Mahler, 2024).
- **Lasciatelo muovere e stimmare.** Lo stimming — sbattere, dondolare, canticchiare, ripetere — è autoregolazione, non „comportamento". Fermarlo di solito rende le cose più difficili, non più facili (Reframing Autism, 2023).

## 1.4 Abbassate le richieste quando il „serbatoio" è vuoto

Quando a una mente monotropica si chiede di dividersi su troppi canali, le persone autistiche descrivono uno „**split monotropico**" — sovraccarico che può emergere come meltdown, shutdown, ritiro o rifiuto (una forma di **evitamento della domanda**) (Reframing Autism, 2023). La soluzione è *ridurre* richieste e input, non aumentarle.

- **Notate i segnali precoci:** andare avanti e indietro, fare ripetutamente la stessa domanda, pazienza più corta, silenzio improvviso. Agite prima che bolla.
- **Riducete le richieste non essenziali nei giorni difficili.** Un bambino che si è trattenuto tutto il giorno a scuola spesso **crolla a casa** — casa è il luogo sicuro dove cade la maschera. Quel crollo è un segno di fiducia ed esaurimento, non che state sbagliando qualcosa.

## 1.5 Se c'è un meltdown o uno shutdown

Un **meltdown** è una perdita di controllo dovuta a sovraccarico sensoriale o emotivo — la risposta di lotta/fuga del corpo — e *non* è un capriccio o una scelta. Uno **shutdown** è la versione „congelamento": diventare silenziosi, ritirarsi, a volte incapaci di parlare (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

**Durante l'evento:**

- **Non giudicate e non discutete.** Arrabbiarsi o turbarsi peggiora la situazione.
- **Riducete gli input:** silenziate la stanza, abbassate le luci, allontanate le altre persone, spegnete la musica.
- **Siate una presenza calma e sicura** — ma non accumulate domande, istruzioni o richieste.
- **Date tempo.** Il recupero dal sovraccarico non è istantaneo.
- **Usate l'approccio meno restrittivo** possibile che tenga tutti al sicuro.

**Dopo,** quando il bambino è calmo, potete concordare insieme un piano per la prossima volta — cosa ha aiutato, quali erano i segnali precoci, dov'è uno spazio tranquillo sicuro (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

***Ridimensionatelo nella vostra testa:*** un meltdown è il sistema nervoso del bambino che dice "troppo", non il bambino che fa il monello. Questo solo cambio di prospettiva cambia il modo in cui rispondete.

## 1.6 Amicizie, fratelli e indipendenza (7–11 anni)

L'infanzia di mezzo è quando le amicizie diventano più complesse e il **mascheramento** (nascondere i tratti autistici per inserirsi) può cominciare a prendere piede — il mascheramento è estenuante ed è collegato ad ansia e burnout (Reframing Autism, 2023).

- **Qualità rispetto alla quantità di amici.** Uno o due amici che accettano valgono più di un'agenda sociale fitta. Le persone autistiche spesso trovano comunicazione più facile e più gratificante con altri pari autistici o neurodivergenti (Reframing Autism, 2023).
- **Protegete il tempo di decompressione.** Socializzare e scuola costano entrambi energia. Inserite tempo di recupero tranquillo e basato sugli interessi.
- **Sostenete i fratelli.** I bisogni di un bambino monotropico possono assorbire molte risorse familiari. Assicuratevi che i fratelli abbiano tempo uno-a-uno e spiegazioni oneste e adeguate all'età — e che sappiano che è normale avere i propri sentimenti.
- **Costruite l'indipendenza attorno agli interessi.** Un bambino che fatica ad avviare i compiti può lanciarsi direttamente se sono inquadrati attorno alla sua passione (il sistema di archiviazione dei fatti sui dinosauri; il foglio di calcolo delle statistiche calcistiche).

## 1.7 Prendetevi cura di voi

Non potete versare da una tazza vuota. Accettate aiuto pratico, entrate in contatto con altre famiglie positive sull'autismo e seguite, dove potete, linee guida **guidate da persone autistiche** — tendono a essere le più accurate (Reframing Autism, 2023). State facendo un lavoro più difficile di quanto molti realizzino.

---

## Parte 2 — Per nonni e familiari allargati

---

Nonni, zii, zie e cugini possono essere tra le persone più amorevoli e stabilizzanti nella vita di un bambino. Il vostro compito non è „riparare” nulla — è **capire, accettare e sostenere i genitori** (Autism Society of NC, Fetzer).

### 2.1 Seguite la guida dei genitori

- **Loro conoscono il bambino meglio.** Ascoltate prima di consigliare; lasciate che chiedano aiuto invece di intervenire „a modo vostro”.
- **Mantenete le routine coerenti.** Se la famiglia usa certe strategie, certe agende o strumenti di comunicazione, usateli anche voi — la coerenza abbassa l'ansia del bambino nei passaggi (Autism Society of NC).
- **Rispettate le loro decisioni** anche quando fareste diversamente. È loro figlio.

### 2.2 Connetetevi attraverso il mondo del bambino

- **Incontratelo dove è.** Imparate cosa ama e *giocateci* — quell'interesse è la sua porta d'ingresso alla connessione (Autism Society of NC).
- **Non forzate il contatto visivo tipico, gli abbracci o le chiacchiere.** Molti bambini autistici trovano il contatto visivo opprimente e preferiscono la connessione *fianco a fianco* (fare qualcosa insieme) piuttosto che faccia a faccia.
- **Regali:** puntate sull'interesse. Un libro, un kit o un'esperienza legata alla sua passione atterra meglio di un regalo „carino” generico.

### 2.3 Mantenete il linguaggio chiaro e calmo

- **Linguaggio chiaro, conciso e letterale** funziona meglio (Autism Society of NC). Dite ciò che intendete; evitate il sarcasmo ironico che un bambino piccolo può prendere alla lettera.
- **Concedete tempo di elaborazione.** Se non risponde subito, probabilmente sta ancora elaborando — aspettate invece di ripetere a voce più alta.
- **Non prendetevela per i momenti esplosivi.** Se il bambino va in meltdown, „vedetelo come un sintomo, non come chi è davvero” (Autism Society of NC).

## 2.4 Siate un rifugio sicuro — anche per i genitori

- **Offrite aiuto concreto:** un pasto, guardare i fratelli per un'ora, una corsa al supermercato. Un piccolo aiuto pratico vale più di consigli ben intenzionati.
- **Istruitevi** con le risorse che la famiglia si fida, e condividete ciò che imparate — dimostra che siete in squadra (Autism Society of NC).
- **Prendetevi cura di voi**, e distribuite il vostro amore su tutti i nipoti in modo equo.

***In sintesi:** amate il bambino così com'è, imparate la sua lingua e fate sentire i genitori sostenuti anziché giudicati. È quasi tutto qui.*

---

## Parte 3 — Per gli insegnanti di scuola primaria

---

La scuola è un ambiente ad alto canale multiplo, ad alta transizione, ad alta domanda sociale — il che la rende genuinamente difficile per gli allievi monotropici. Le linee guida dell'insegnante autistico Fergus Murray si riducono a **sei cose da capire** (F. Murray, 2019). Eccole, con cosa fare.

### 3.1 Gestire molti canali è difficile

- **Non affidatevi solo alle istruzioni parlate.** Fornitele **in forma scritta o visiva chiara** così gli allievi possono riguardarle, invece di dover filtrare la vostra voce dal rumore della classe (F. Murray, 2019).
- **Una cosa alla volta.** Una parete di istruzioni verbali sarà parzialmente persa.

### 3.2 Filtrare è delicato e soggetto a errori

- **Riducete rumore, disordine visivo e richieste sociali.** Sgombrate le pareti, usate tessere fonoassorbenti, sedete il bambino lontano dai punti più affollati/ronzanti.
- **Protegete il focus e il flusso.** La concentrazione profonda che deriva dal padroneggiare qualcosa di interessante è *uno degli strumenti più potenti dell'educazione* — progettate la giornata in modo che gli allievi possano entrarci a volte (F. Murray, 2019).



- **Avere un piano per il sovraccarico:** un **luogo tranquillo** dove il bambino può andare a decomprimere e stimmare senza sentirsi osservato (F. Murray, 2019).

### 3.3 Cambiare binario destabilizza

- **La prevedibilità riduce il carico cognitivo.** Orari visibili, lavagne „ora / poi" e preavvisi dei cambiamenti aiutano tutti.
- **Le transizioni sono la zona di pericolo.** Date avvisi; evitate sorprese; ammorbidite il passaggio verso e dal lavoro di gruppo, dall'assemblea e dalla mensa.
- **Il tempo non strutturato è la parte più dura della giornata.** Ricreazione e pause pranzo, senza via di scampo dalla folla e con la pressione di „trovare un compagno", sono spesso più estenuanti delle lezioni (F. Murray, 2019). Offrite opzioni strutturate e a bassa domanda (un club tranquillo, un'attività del pranzo, uno spazio sicuro chiaro).

### 3.4 Gli interessi sono intensi — usateli

- **Lavorare con gli interessi di un allievo porta grandi ricompense educative** (Wood, 2019, citato in F. Murray, 2019). Usate l'interesse come veicolo per il curriculum ovunque possiate.
- **Non usate l'interesse solo come ricompensa da togliere.** Questo trasforma la principale fonte di regolazione del bambino in leva, ed erode la fiducia.

### 3.5 Il „Ma perché?" è reale — date ragioni

Gli allievi monotropici spesso hanno bisogno di capire *perché*, a volte con più dettaglio dei pari. **Le ragioni sono uno strumento chiave di insegnamento**; spesso gli attriti derivano dall'aspettarsi che un bambino accetti le cose solo sull'autorità (F. Murray, 2019). Trattate le sue domande come coinvolgimento, non come sfida.

### 3.6 Le cose escono dalla consapevolezza — fornite struttura esterna

Quando l'attenzione è altrove, bisogni, scadenze e istruzioni scompaiono davvero dalla mente. **Orari visivi, liste di controllo, agende e promemoria** fungono da memoria esterna (F. Murray, 2019). Aiutate il bambino a costruirli — ma teneteli condivisi, non controllanti.

### 3.7 Parlate con l'allievo — e credetegli

*"Se volete sapere cosa è difficile per qualcuno che insegnate, e cosa potrebbe aiutarlo, la cosa migliore è probabilmente parlargli. Cercate di credergli quando vi dice che qualcosa è difficile." — Fergus Murray (2019)*

I profili autistici sono „spigolosi" — enorme variazione tra le aree. Non assumete mai che un bambino dovrebbe trovare facile qualcosa solo perché è capace altrove. E **non insistete mai per il contatto visivo né fermatelo dal muoversi/stimmare** — sono spesso il modo in cui gestisce il sovraccarico (F. Murray, 2019).

### 3.8 Costruite una vera collaborazione casa-scuola

Le famiglie detengono informazioni cruciali sui trigger, i segnali precoci e ciò che regola il bambino. Un semplice quaderno o app di comunicazione a doppio senso — cosa è andata bene, cosa è stato difficile, cambiamenti in arrivo — previene molte brutte giornate per tutti.

---

## Parte 4 — Per allenatori di sport, educazione fisica e attività

---

Il movimento conta: fa bene alla salute, all'umore, alla fiducia e alla connessione sociale. Ma bambini e ragazzi autistici sono, in media, **meno fisicamente attivi dei loro pari** — non per mancanza di interesse, ma perché molti contesti sportivi sono rumorosi, imprevedibili, socialmente esigenti e pieni di transizioni improvvise. Una revisione sistematica del 2025 di tutta la ricerca sull'argomento (Michaud & Harvey, 2025) ha individuato un insieme chiaro di cose che aiutano. Combinata con la lente del monotropismo, ecco la versione pratica.

### 4.1 Cosa dice la ricerca che aiuta (Michaud & Harvey, 2025)

I principali facilitatori della revisione:

- **Routine prevedibili** — stesso riscaldamento, stessa struttura, niente sorprese.

- **Spazi sicuri e sensorialmente amichevoli** — più silenziosi, meno disordine, spazio per ritirarsi.
- **Buone relazioni con gli allenatori e pari di supporto** — il lato sociale conta più di quello tecnico per la partecipazione.
- **Attività che si adattano alle abilità del bambino e sembrano familiari**, e che prendono la forma di un **gioco**.
- **Coinvolgimento della famiglia e opportunità extrascolastiche / di comunità**.
- Un approccio **basato sui punti di forza** — *"l'attività fisica non come una sfida da superare ma come un'opportunità per costruire fiducia, godimento e connessione sociale"* (Michaud, in McGill Newsroom, 2025).

## 4.2 Mappare il monotropismo sull'allenamento

| Caratteristica del monotropismo   | Cosa significa nello sport                                                             | Mossa dell'allenatore                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inerzia autistica</b>          | Iniziare, fermare e cambiare esercizio costa energia                                   | Inserite un <b>riscaldamento prevedibile</b> e un <b>defaticamento</b> come rampe di transizione; date avvisi prima di cambiare attività; permettete una partenza lenta                                                      |
| <b>Tunnel attentivo</b>           | Le attività a focus singolo sono più facili e più gioiose di quelle a focus diviso     | Preferite esercizi <b>un'abilità alla volta</b> ; lasciate che un bambino resti su un'abilità in cui è assorbito; la pratica in <b>forma di gioco</b> funziona meglio degli esercizi astratti                                |
| <b>Iper-reattività sensoriale</b> | Fischi, cicalini, palestre rimbombanti, luci forti, kit pruriginosi possono sopraffare | <b>Riducete</b> i suoni forti improvvisi (usate segnali con le mani/battiti quieti), scegliete spazi più silenziosi, permettete <b>cuffie antirumore</b> , kit morbidi, occhiali da sole; avvisate prima di un fischio/corno |

| Caratteristica del monotropismo                   | Cosa significa nello sport                                                              | Mossa dell'allenatore                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ipo-responsività / interocezione</b>           | Può non notare sete, surriscaldamento, dolore, stanchezza quando è assorbito            | Pause bevanda e riposo <b>programmate e specifiche</b> ; check-in („pausa acqua ora — sì, tu!"); vigilate sul surriscaldamento che il bambino non ha segnalato                  |
| <b>Comunicazione a canale singolo</b>             | Una lunga spiegazione verbale in una palestra rumorosa non atterrerà                    | <b>Dimostrate</b> l'abilità visivamente; date <b>una breve istruzione</b> alla volta; rafforzatala con un'immagine o uno schizzo alla lavagna                                   |
| <b>Pensiero letterale e tempo di elaborazione</b> | Sarcasmo, modi di dire e scambi veloci falliscono                                       | Usate linguaggio <b>chiaro e concreto</b> ; concedete <b>qualche secondo</b> per una risposta prima di ripetere; evitate prese in giro che il bambino può prendere alla lettera |
| <b>Stimming e movimento</b>                       | Agitarsi, andare avanti e indietro, sbattere sono autoregolazione, non cattiva condotta | <b>Permettete il movimento</b> tra gli esercizi; non punite né bloccate pubblicamente lo stimming; offrite una pausa movimento come reset                                       |
| <b>Meltdown/shutdown</b>                          | Il sovraccarico può emergere a metà sessione                                            | Vedete Parte 1.5: <b>riducete gli input</b> , trovate un <b>punto tranquillo</b> , restate calmi, non esigete spiegazioni nel momento                                           |

### 4.3 Lista di controllo pratica per l'allenatore

- **Lo stesso riscaldamento ogni sessione** — la prevedibilità abbassa il costo di ingresso.
- **Mostrate, poi dite.** La dimostrazione visiva batte un discorso.
- **Un'istruzione alla volta**, in linguaggio chiaro, con un momento per elaborare.
- **Offrite scelta e autonomia** dove potete — quale stazione, quale ruolo, quale gioco. Il controllo abbassa l'ansia.

- **Costruite prima la relazione allenatore–bambino.** Un bambino che si fida di voi affronterà più disagio di uno che non si fida.
- **Celebrate l'impegno e l'interesse speciale.** Il bambino che ama le statistiche può tenere il referto; quello che ama una routine può guidare il riscaldamento.
- **Pensate a sport di squadra vs individuali.** Come regola generale dalla lente del monotropismo (non un dato di ricerca hard), gli sport individuali (nuoto, corsa, arti marziali, arrampicata, atletica) spesso si adattano bene ai bambini monotropici — meno canali sociali simultanei, struttura chiara, spazio per il focus profondo. Gli sport di squadra possono funzionare splendidamente se il carico sociale è gestito (ruoli chiari, compagni di squadra di supporto, un allenatore che capisce).
- **Avere un piano per il sovraccarico:** un angolo tranquillo concordato, un segnale che il bambino può usare per uscire, cuffie antirumore a portata di mano.

***Ridimensionate il successo:** l'obiettivo a questa età è un bambino che **vuole tornare la settimana prossima**. L'abilità segue il godimento — non il contrario.*

## Parte 5 — Trasversale: linguaggio e un grande „Fare / Non fare"

### 5.1 Linguaggio che aiuta vs linguaggio che ferisce

| Da evitare                                            | Piuttosto                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Ossessione", „fissazione"                            | <b>Passione, interesse speciale, focus</b>                                                                              |
| „Non vuole..." / „È difficile"                        | <b>„Non riesce ora" / „È sovraccarico"</b>                                                                              |
| „Smetti di agitarti / guardami negli occhi"           | Permettete movimento e contatto visivo al comfort del bambino                                                           |
| „Capriccio", „monello", „vuole attirare l'attenzione" | <b>Meltdown, shutdown, sovraccarico</b>                                                                                 |
| Etichette „funzionamento basso / alto"                | Descrivete i <b>punti di forza e i bisogni di supporto specifici</b> del bambino (i profili autistici sono „spigolosi") |

| Da evitare                                      | Piuttosto                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Inquadratura patologizzante, basata sul deficit | Inquadratura <b>affermando la neurodiversità, con identità per prima</b> |

## 5.2 Un grande „Fare / Non fare" per tutti

### Fare

-  **Imparate gli interessi del bambino** e usateli come ponti
-  **Rendete la giornata prevedibile** e date avvisi prima dei cambiamenti
-  **Abbassate il carico sensoriale** e permettete movimento, stimming e pause
-  **Comunicare in modo chiaro, letterale, una cosa alla volta**, e concedete tempo di elaborazione
-  **Riducete richieste e input** quando il bambino va verso il sovraccarico
-  **Seguite la guida dei genitori** e mantenete gli approcci coerenti tra casa/scuola/sport
-  **Parlate con il bambino e credetegli** su ciò che è difficile

### Non fare

-  Non trattare l'interesse speciale come un problema da limitare
-  Non insistere sul contatto visivo o sull'immobilità come condizione di rispetto
-  Non punire, umiliare o escalare durante un meltdown o uno shutdown
-  Non sovraccaricare con istruzioni verbali, cambiamenti dell'ultimo minuto o tempo sociale non strutturato
-  Non dare per scontato che la capacità in un'area implichi capacità in un'altra („profili spigolosi")
-  Non patologizzare o usare linguaggio basato sul deficit davanti al bambino

## 5.3 Leggete il comportamento come comunicazione

Per un bambino monotropico, il comportamento è quasi sempre **comunicazione sulla regolazione** — „questo è troppo rumoroso", „non riesco a cambiare binario così in fretta", „ho finito il carburante".

Quando lo leggete così, la risposta giusta (abbassare il carico, dare tempo, offrire lo spazio tranquillo) di solito diventa ovvia.

## 5.4 Quando cercare ulteriore supporto

Se il bambino è spesso in sovraccarico, va regolarmente in meltdown o shutdown, maschera pesantemente o si ritira, vale la pena parlare con la famiglia di un supporto più ampio — personale scolastico SEN/educazione speciale, un terapeuta occupazionale positivo sull'autismo (soprattutto per supporto sensoriale e interocettivo), e organizzazioni **guidate da persone autistiche** per linee guida che tendono a essere le più accurate e affermanti.

---

## Parte 6 — Domande aperte e limiti onesti

---

Alcune note oneste, così potete fidarvi di questa guida:

- **Il monotropismo è una potente teoria descrittiva, non ancora completamente meccanicistica.** Spiega *come* funziona l'attenzione autistica e cosa ne consegue, ma la neurobiologia sottostante è ancora in fase di ricerca (Dwyer, 2021; 2025). È il quadro più risonante all'interno della comunità autistica e sempre più nella ricerca, ma non è tutto il quadro.
- **Non ogni bambino autistico è riconoscibilmente monotropico.** Una minoranza di persone autistiche dice che il monotropismo non le descrive bene. Usate questa guida come lente di partenza e **adattate tutto al bambino individuale che avete davanti** (Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism).
- **Questa guida è generale**, tratta dalla teoria del monotropismo e da un piccolo insieme di fonti affidabili tra ricerca e practitioner. Non sostituisce consigli individualizzati di professionisti che conoscono vostro figlio.
- **Le evidenze sullo sport sono una revisione scoping (Michaud & Harvey, 2025)** che ha mappato la letteratura ed elencato i facilitatori; è forte sul „cosa tende ad aiutare“, meno su outcome controllati di interventi specifici.
- **Le fonti sono state limitate da ciò che si è potuto accedere in modo affidabile.** Alcune pagine web practitioner non sono state recuperate per questa esecuzione; dove è accaduto, la guida si basa su

fonti pienamente verificate (monotropism.org, Reframing Autism, NHS Autism Space, la revisione di Michaud & Harvey e il brief di partenza) anziché su pagine non recuperabili. Nessun fatto è stato inventato.

---

## Fonti

---

### **Teoria — monotropismo (brief di partenza e i suoi riferimenti)**

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.  
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- Murray, F. (2018, aggiornato 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.  
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.  
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.  
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.  
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenziato nel brief di partenza.)

### **Applicazioni pratiche — monotropism.org**

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (scuola, gioco, lavoro, salute mentale). <https://monotropism.org/in-practice>
- Murray, F. (2019). *Monotropism at School / Top Autism Tips for Teachers* (originariamente su Tes). <https://monotropism.org/school/>
- Murray, F. (2022). *Understanding how routines can help autistic people thrive*. <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."*  
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>



- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

### **Spiegazione guidata da autistici e cornice genitoriale/neuroaffermante**

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*. <https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

### **Meltdown e shutdown**

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*. <https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

### **Nonni e famiglia allargata**

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>

### **Sport, attività fisica ed educazione fisica**

- Michaud, M. & Harvey, W.J. (2025). *Facilitating Physical Activity Participation Among Autistic Children and Youth: A Scoping Review*. Journal of Autism and Developmental Disorders. <https://doi.org/10.1007/s10803-025-07141-y>
- McGill University Newsroom (2025). *New study provides advice on how to boost participation in physical activity among autistic youth*. <https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/new-study-provides->

advice-how-boost-participation-physical-activity-among-autistic-youth-371283