

Il vostro bambino autistico in età prescolare

Per genitori e assistenti familiari — capire e sostenere un bambino autistico in età prescolare (circa 2–5 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione del vostro bambino viene richiamata in pochi „tunnel” profondi e intensi alla volta. Dentro un tunnel, il focus è vivido e ricco; fuori, le cose si registrano a malapena — a volte inclusi fame, dolore o qualcuno che parla. Questa unica differenza spiega gli interessi intensi, le reazioni sensoriali, l'amore per la routine e i meltdown ai cambi. Il vostro bambino non è „in ritardo” o „rotto” — la sua mente inaffia una porzione di terreno più piccola, *in profondità*. Il vostro potere più grande è un ambiente che funzioni *con* quell'attenzione.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Assorbito profondamente in un oggetto o argomento; allinea le cose; gioca „in modo diverso”	Gioco monotropico — valido e significativo; spesso la via del bambino verso calma e apprendimento
Non risponde al nome; „ignora” fame, sete, il bagno	Quando è assorbito, le cose fuori dal tunnel davvero non si registrano
Pianto improvviso, urla, si affloscia o tace	Un meltdown o uno shutdown involontario da luci, rumore o l'attesa — <i>non</i> monelleria
Forti reazioni a suoni, luci, tessuti, cibo — o sembra non sentire nulla	Differenze sensoriali: uno stimolo <i>dentro</i> il tunnel è sentito intensamente; uno <i>fuori</i> può non registrarsi
Risponde lentamente; ripete le vostre parole	Tempo di elaborazione + comunicazione a canale singolo, letterale

Provate questo

- **Entrate nel suo interesse prima di guidarlo.** Entrate nel suo tunnel e giocate *a modo suo* prima — connessione e apprendimento precoce (linguaggio, contare, i turni) si costruiscono tutti da lì.
- **Rendete la giornata prevedibile** — routine stabili per risveglio, pasti, gioco e bedtime; avvertite prima di ogni cambiamento („prima le scarpe, poi il parco”) e usate foto o un semplice orario visivo.
- **Abbassate il carico sensoriale** — un angolo quieto e a luce bassa; cuffie antirumore per i rumori forti; vestiti senza cuciture con le etichette tagliate.
- **Usate un linguaggio „dichiarativo”** — osservazioni e riflessioni („Vedo il tuo cappotto vicino alla porta”) invece di comandi e domande continui; abbassa la pressione su un sistema nervoso che reagisce alle richieste.
- **Avere un piano per meltdown/shutdown:** restate calmi, abbassate il carico (silenzio, penombra, meno persone), non ragionate né giudicate sul momento, date tempo, tenete tutti al sicuro.
- **Seguite il vostro istinto e inviate precocemente** se notate attenzione rallentata/„appiccicosa”, interessi intensi, differenze sensoriali o gioco atipico — l'aiuto precoce adatta l'ambiente, non il bambino.

Evitate questo

- Forzare il contatto visivo, trattenerlo, o proporre un cambio a sorpresa.
- Trattare l'allineare, l'ordinare o il gioco sensoriale come gioco „sbagliato” da correggere.
- Leggere pochi minuti calmi in giro come „sta bene” — può pagarli con uno shutdown dopo.

Quando serve altro supporto

Guardatevi dal **burnout autistico** / „regressione” — una perdita improvvisa di abilità di solito significa *sovraccarico*, e la risposta è **ridurre le richieste e ripristinare riposo e interessi**, non spingere di più. Parlate con il consultore o il medico curante di una valutazione dell'autismo — non dovete „meritarvi” l'invio. Cercate il **supporto ai genitori guidato da persone autistiche** (tende a essere il più accurato e affermativo), e prendetevi cura dei fratelli e del vostro benessere.

Se il vostro bambino è una bambina

Le bambine spesso sono migliori nel **camuffamento** precoce e vengono individuate meno. Prendete sul serio la vostra stessa osservazione anche quando la presentazione sembra „sociabile” o „sottile” — lo sforzo mascherato è sforzo reale.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — **Crescere in modo monotropico** (Parte 1), la guida per la **famiglia** (Parti 1 e 3) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima („bambino autistico”). **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Conoscete il vostro bambino meglio di chiunque altro; adattate questo a lui/lei.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2018/2023; 2022, routine); Dwyer (2025); Reframing Autism (2023); Edgar (2024, regressione/burnout); Kelly Mahler (2024, interocezione); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.