

Un adolescente autistico che sostenete

Per assistenti, educatori di sostegno, mentor e educatori giovanili — sostenere un adolescente autistico (circa 12–18 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adolescente si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Questa è l'**età di picco per ansia, depressione e burnout**, e molti adolescenti autistici mascherano tutto il giorno e arrivano da voi svuotati. Il vostro ruolo è un supporto costante, prevedibile e a bassa domanda: mantenete le routine, proteggete i loro interessi e state attenti al sovraccarico e al burnout che potrebbero non nominare. Prendete sul serio la loro vita interiore, e non leggete mai uno shutdown come un „non vuole collaborare”.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto, ritirato, si rifiuta di partecipare	Probabile burnout o sovraccarico — distinto dalla pigrizia
Si fa silenzioso o esce all'improvviso	Shutdown — involontario; serve calma e tempo, non pressione
Si aggrappa a routine, oggetti, un interesse	Sono regolazione e identità , non „ossessioni”
Non segnala dolore, fame o malessere	Differenze di interocezione ; „non lo dice” ≠ „non soffre”
Vuole le cose sempre allo stesso modo	La prevedibilità abbassa un carico già alto

Provate questo

- **Mantenete costanti educatori, routine e luoghi**; avvisate prima di ogni cambio; co-create il piano *con* loro.
- **Protegete l'interesse e il tempo di pausa** come regolazione e recupero, non come „vizio”.
- **Comunicare alla lettera, una cosa alla volta**, spesso per iscritto/testo; concedete tempo di elaborazione e scelta.
- **Riducete il carico sensoriale** — spazio quieto in penombra; permettete cuffie, stimming e movimento.
- **Avere un piano calmo per meltdown/shutdown**: riducete gli input, assicurate la sicurezza, date tempo, nessuna contenzione.
- **Chiedete direttamente e alla lettera** di umore e sicurezza se siete preoccupati — e trasmettete le preoccupazioni.

Da evitare

- Cambi a sorpresa, pressione a mascherare o richieste di „partecipa!” quando sono svuotati.
- Impedire lo stimming o leggere uno shutdown come rifiuto.
- Equiparare un'ora calma e mascherata all'essere „a posto”.

Quando chiedere altro supporto

State attenti al **burnout autistico** (esaurimento, perdita di competenze, ridotta tolleranza) e ai segnali di crisi — condividete le preoccupazioni con la famiglia e, ove opportuno, con il referente per la salvaguardia. Indagate prima **il dolore o la malattia** per ogni nuovo malessere. Segnalate gruppi tra pari e mentor guidati da persone autistiche.

Se l'adolescente è una femmina o un genere marginalizzato

Il camuffamento qui è al massimo; la „perfezionista ansiosa e quieta” può essere un'adolescente autistica esausta a serbatoio vuoto. Prendete sul serio un controllo privato e alla lettera.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parte 4), la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parte 3.3) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.