

Devoir maison n°8 : Chemins sur un quadrillage

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Partie A - Retrouver des formules bien connues

1) Un chemin entre O et $M(p, q)$ équivaut à une somme ordonnée de p vecteurs \vec{i} et de q vecteurs \vec{j} . Une telle somme est composée de $p + q$ termes, et est déterminée uniquement par la position des p vecteurs \vec{i} parmi les $p + q$ termes, en complétant tous les autres termes par des \vec{j} . Ainsi, comme l'ordre des \vec{i} n'importe pas, il y a $\binom{p+q}{p}$ telles sommes.

On en déduit que le nombre de chemins entre O et $M(p, q)$ est de $\binom{p+q}{p} = \binom{p+q}{q}$ (par symétrie).

2) Un chemin de longueur n partant d'un point consiste en une somme ordonnée de n vecteurs parmi $\{\vec{i}, \vec{j}\}$, assimilable à une n -liste de cet ensemble à deux éléments. On en déduit qu'il y a 2^n chemins de longueur n partant de tout point (et en particulier de l'origine).

3) a) Par translation de vecteur $\overrightarrow{PO} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, un chemin joignant $P(0, 1)$ à $B_k(n - k, k)$ équivaut à un chemin joignant l'origine et $B'_k(n - k, k - 1)$. Ceux ci sont donc au nombre de $\binom{n-k+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}$.

Similairement, un chemin entre Q et $B_k(n - k, k)$ équivaut à un chemin entre l'origine et $B''_k(n - k - 1, k)$. Ils sont donc au nombre de $\binom{n-k-1+k}{k} = \binom{n-1}{k}$.

b) On double compte les chemins de O à B_k . D'une part, ceux-ci sont au nombre de $\binom{n}{k}$ par le 1). D'autre part, un tel chemin doit passer soit par $Q(1, 0)$, soit par $P(0, 1)$ en fonction du premier vecteur du chemin. Ainsi, un chemin entre O et B_k est soit un chemin de Q à B_k , soit un chemin de P à B_k . On en déduit :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

c) Un chemin de O à $B_n(n, n)$ passant par $B_k(n - k, k)$ équivaut à la donnée de deux chemins, l'un de O à B_k , et l'autre de B_k à B_n . Ainsi, ces chemins sont au nombre de :

$$\binom{n-k+k}{k} \cdot \binom{n-(n-k)+(n-k)}{n-k} = \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$$

Où l'on a dénombré les chemins de B_k à B_n par translation de vecteur $\overrightarrow{B_kO}$.

d) On double compte les chemins de O à $B_n(n, n)$. D'une part, ceux-ci sont au nombre de $\binom{n+n}{n} = \binom{2n}{n}$. D'autre part, chaque tel chemin, après n étapes, se trouve sur un unique point de la forme $B_k(n - k, k)$ avec $k \in \{0, \dots, n\}$, car ceux-ci forment l'ensemble des points atteignables depuis O par un chemin de longueur n . Ainsi, par disjonction et le dénombrement de la question précédente, on déduit :



$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Partie B - Chemins de Dyck et nombres de Catalan

1) a) TODO : Thomas stp :3

b) Un chemin de Dyck de longueur $2n$ ne rencontrant la diagonale qu'en O et A_n doit forcément passer par $P(0, 1)$ (monter à la première étape) et $P'(n-1, n)$: sinon, le chemin passerait par $Q(n, n-1)$ qui est en dessous de la diagonale.

De plus, le chemin induit entre P et P' , de longueur $2(n-1)$, doit forcément être de Dyck relativement à la diagonale entre P et P' : sinon, il rencontrerait la diagonale entre O et A_n . Ainsi, ces chemins sont au nombre de C_{n-1} .

TODO : Figure

c) Un tel chemin passe forcément par $M_k(k, k)$, et est de Dyck jusqu'à avoir atteint M_k , et strictement au dessus de la diagonale Δ (qui est aussi la diagonale entre M_k et M_n) entre M_k et M_n , à la manière du b).

Ainsi, la donnée d'un tel chemin équivaut à celle d'un chemin de Dyck entre O et M_k , de longueur $2k$, au nombre de C_k , et d'un chemin, comme dans le b), de longueur $2n-2k = 2(n-k)$, qui sont donc au nombre de C_{n-k-1} .

Par le principe du et, ces chemins sont au nombre de $C_k C_{n-k-1}$