

# Devoir maison n°9 : Fonction du Boulanger

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

1E1

## Problème 1 -

1)

Si  $x \in [0, \frac{1}{2}]$ ,  $f(x) = 2x$  donc

$$0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 2x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow f\left(\left[0, \frac{1}{2}\right]\right) = [0, 1]$$

Si  $x \in ]\frac{1}{2}, 1]$ ,  $f(x) = 2(1 - x)$  donc


$$\frac{1}{2} < x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 1 - x < \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq 2(1 - x) < 1$$

$$\Leftrightarrow f\left(\left]\frac{1}{2}, 1\right]\right) = [0, 1[$$

Donc nous avons bien  $f([0, 1]) = [0, 1]$



Représentation graphique de  $f$  sur  $[0, 1]$

---

2) La fonction suite repose naturellement sur de la récursivité. Nous allons donc la programmer dans un langage qui supporte de manière optimale les fonctions récursives.



Voici suite a p en Haskell.

```
f x
| 0 <= x      && x <= 1 / 2 = 2 * x
| 1 / 2 < x    && x <= 1    = 2 * (1 - x)

suite a 1 = a
suite a p = suite (a ++ [f (last a)]) (p-1)
```

3) a)

- Si  $a = \frac{1}{3}$ ,  $u_0 = a = \frac{1}{3}$   $u_1 = f(u_0) = \frac{2}{3}$  car  $u_0 < \frac{1}{2}$   $u_2 = 2(1 - \frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$  car  $u_1 > \frac{1}{2}$

On remarque que  $u_1 = u_2 = \frac{2}{3}$  puisque  $f(\frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$ , donc la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sera constante pour  $n \geq 1$ .

Avec  $a = \frac{1}{3}$ :

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } n = 0 \\ \frac{2}{3} & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

- Si  $a = 0.33$ , On obtient : (0.33, 0.66, 0.68, 0.64, 0.72, 0.56, 0.88, 0.24, 0.48)

On remarque que, bien que  $\frac{1}{3} \approx 0.33$ , la suite ne devient pas constante pendant les 9 premiers termes.

b)

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $a = \frac{1}{2^k}$ .  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{2^k} \leq \frac{1}{2}$ , donc

$$u_0 = \frac{1}{2^k} \quad u_1 = 2\left(\frac{1}{2^k}\right) = \frac{1}{2^{k-1}} \quad u_2 = \frac{1}{2^{k-2}}$$

Cela ne varie pas tant que  $n < k$ .

$$u_k = \frac{1}{2^{k-k}} = 1 \quad u_{k+1} = 0 \quad u_{k+2} = 0$$

Or,  $f(0) = 0$ , donc

Avec  $a = \frac{1}{2^k}$ :

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{2^{k-n}} & \text{si } n \in \llbracket 0, k \rrbracket \\ 0 & \text{si } n > k \end{cases}$$

c)

Soit  $k \in \mathbb{N}^*$  et  $a = \frac{1}{3 \times 2^k}$ .  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ ,  $\frac{1}{3 \times 2^k} \leq \frac{1}{3 \times 2} < \frac{1}{2}$ , donc

$$u_0 = \frac{1}{3 \times 2^k} \quad u_1 = 2\left(\frac{1}{3 \times 2^k}\right) = \frac{1}{3 \times 2^{k-1}} \quad u_2 = \frac{1}{3 \times 2^{k-2}}$$

Cela ne varie pas tant que  $n < k$ .

$$u_k = \frac{1}{3 \times 2^{k-k}} = \frac{1}{3} \quad u_{k+1} = \frac{2}{3} \quad u_{k+2} = \frac{2}{3}$$



Or,  $f(\frac{2}{3}) = \frac{2}{3}$ , nous l'avons déjà observé à la question 3) a).

Avec  $a = \frac{1}{3 \times 2^k}$  :

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{3 \times 2^{k-n}} & \text{si } n \in \llbracket 0, k \rrbracket \\ \frac{2}{3} & \text{si } n > k \end{cases}$$

---

**4) a)** Choisissons  $a = 0$ , comme  $f(0) = 0$ , la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sera bien constante. Nous aurions aussi pu choisir  $a = \frac{2}{3}$ .

**b)** Choisissons  $a = \frac{2}{5}$ , comme  $f(\frac{2}{5}) = \frac{4}{5}$ ,  $f(\frac{4}{5}) = \frac{2}{5}$ , la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien périodique de période 2. Nous aurions bien-sûr aussi pu choisir  $a = \frac{4}{5}$ .

**c)** Choisissons  $a = \frac{2}{7}$ , comme  $f(\frac{2}{7}) = \frac{4}{7}$ ,  $f(\frac{4}{7}) = \frac{6}{7}$  et  $f(\frac{6}{7}) = \frac{2}{7}$ , la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sera bien périodique de période 3. Nous aurions bien-sûr aussi pu choisir  $a = \frac{4}{7}$  ou  $a = \frac{6}{7}$ .