

Devoir maison n°13 : Calcul de $\zeta(2)$

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Partie A - Convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$

1) Puisque pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k^2} > 0$, la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ est strictement croissante. De plus, $u_1 = 1 \leq v_1 = 1$ et pour tout $k \geq 2$, par décroissance de la fonction inverse, $\frac{1}{k(k-1)} \geq \frac{1}{k^2}$. Ainsi, pour tout $n \geq 2$:

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = v_n$$

2) La suite (v_n) est convergente. En effet, pour tout $n \geq 2$:

$$v_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$. Comme v_n converge, alors elle est majorée. (u_n) est donc alors également majorée, et croissante. Donc (u_n) converge par le théorème de la limite monotone.

Partie B - Analyse de (u_n)

1) a) Par définition, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $C_n(0) = \sum_{k=1}^n \cos(0) = n$. De plus, pour tout $t \in]0; \pi]$:

$$\begin{aligned} C_n(t) &= \sum_{k=1}^n \Re(e^{ikt}) = \Re\left(\sum_{k=1}^n e^{ikt}\right) \\ &\stackrel{e^{it} \neq 1}{=} \Re\left(e^{it} \frac{e^{int} - 1}{e^{it} - 1}\right) \\ &\stackrel{\text{Angle moitié}}{=} \Re\left(e^{it} \frac{e^{i\frac{n}{2}t} \cdot 2 \sin(\frac{nt}{2})}{e^{i\frac{t}{2}} \cdot 2 \sin(\frac{t}{2})}\right) \\ &= \frac{\sin(\frac{nt}{2})}{\sin(\frac{t}{2})} \Re\left(e^{i\frac{(n+1)}{2}t}\right) \\ &= \frac{\sin(\frac{nt}{2}) \cos(\frac{(n+1)}{2}t)}{\sin(\frac{t}{2})} \end{aligned}$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, C_n est une somme finie de fonctions continues sur $[0; \pi]$, et est donc continue sur $[0; \pi]$.

c) TODO



d) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0; \pi]$, $D_n(t) = 1 + 2C_n(t)$. Par continuité de C_n et opérations, D_n est également continue sur $[0; \pi]$

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les fonctions $t \mapsto \frac{t^2}{2\pi} - t$ et $t \mapsto C_n(t)$ sont de classe C^∞ par opérations (cos est de classe C^∞). On peut donc calculer par intégration par parties :

TODO : d droit

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(nt) dt &= \left[\frac{1}{n} \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \sin(nt) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n} \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt \\ &\stackrel{\sin(k\pi)=0}{=} -\frac{1}{n} \int_0^\pi \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt \end{aligned}$$

Ainsi que :

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) \sin(nt) dt &= \left[\frac{1}{n} \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{n\pi} (-\cos(nt)) dt \\ &= \left[\frac{1}{n} \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi + \left[\frac{1}{n^2\pi} (-\sin(nt)) \right]_0^\pi \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{n} \left(\frac{t}{\pi} - 1 \right) (-\cos(nt)) \right]_0^\pi &= \left(0 - \frac{1}{n} (-1) (-\cos(0)) \right) = -\frac{1}{n} \text{ et} \\ \left[\frac{1}{n^2\pi} (-\sin(nt)) \right]_0^\pi &\stackrel{\sin(k\pi)=0}{=} = 0 \end{aligned}$$

On en conclut donc que :

$$\int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(nt) dt = -\frac{1}{n} \left(-\frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n^2}$$

Enfin, par linéarité de l'intégrale,

$$\begin{aligned} u_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \sum_{k=1}^n \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \cos(kt) dt \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \left(\sum_{k=1}^n \cos(kt) \right) dt \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) C_n(t) dt \end{aligned}$$

3) On calcule en primitivant :



$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) dt &= \frac{1}{2} \left(\left[\frac{1}{6\pi} t^3 \right]_0^\pi - \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_0^\pi \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{2} \right) = -\frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}u_n - \frac{\pi^2}{6} &= u_n + \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) dt \\ &= \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) \left(C_n(t) + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t \right) D_n(t)\end{aligned}$$

Partie C - Calcul de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

1) f est continue par opérations sur $]0; \pi]$. De plus, pour tout $t \in]0; \pi]$:

$$f(t) = 2 \frac{\frac{t}{2}}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \left(1 - \frac{t}{2\pi} \right)$$

En remarquant que le facteur du milieu est l'inverse d'un taux d'accroissement, on obtient :

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 2 = f(0)$$

Donc f est bien continue sur $[0; \pi]$. D'après le théorème des bornes atteintes, on dispose donc de $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $|f| \leq M$ sur $[0; \pi]$.

2) a) Pour tout $\alpha \in]0; \pi[$, on a les inégalités suivantes :

$$\begin{aligned}\left| \int_0^\alpha f(t) \sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right) dt \right| &\leq \int_0^\alpha |f(t)| \left| \sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right) \right| dt \text{ par inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_0^\alpha |f(t)| dt \text{ car } |\sin| \leq 1 \\ &\leq \int_0^\alpha M dt = \alpha M \text{ car } |f| \leq M\end{aligned}$$

b) f est dérivable par opérations sur $]0; \pi]$: comme $\alpha > 0$, elle est a fortiori dérivable sur $[\alpha; \pi]$. De plus, pour tout $t \in [\alpha; \pi]$:



$$f'(t) = \frac{\left(1 - \frac{t}{\pi}\right) \sin\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{1}{2}\left(t - \frac{t^2}{2\pi}\right) \cos\left(\frac{t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)^2}$$

Qui est continue par opérations sur $[\alpha; \pi]$. Encore par le théorème des bornes atteintes, on dispose donc de $M' \in \mathbb{R}^+$ tel que $|f'| \leq M'$ sur $[\alpha; \pi]$.