

# Mathématiques : Devoir maison n° 4

Thomas Diot, Jim Garnier, Jules Charlier, Pierre Gallois  
1E1

## Partie A - Définitions

1)

$f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  est injective sur  $\mathcal{E}$  si et seulement si :

$$\forall x, y \in \mathcal{E}, f(x) = f(y) \implies x = y$$

On en conclut que  $f$  n'est pas injective si et seulement si :

$$\exists x, y \in \mathcal{E}, x \neq y \wedge f(x) = f(y)$$

2)

$f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  est surjective de  $\mathcal{E}$  sur  $\mathcal{F}$  si et seulement si :

$$\forall y \in \mathcal{F}, \exists x \in \mathcal{E}, y = f(x)$$

On en déduit que  $f$  n'est pas surjective de  $\mathcal{E}$  sur  $\mathcal{F}$  si et seulement si :

$$\exists y \in \mathcal{F}, \forall x \in \mathcal{E}, y \neq f(x)$$

3)

$f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  est bijective de  $\mathcal{E}$  sur  $\mathcal{F}$  si et seulement si :

$$\forall y \in \mathcal{F}, \exists! x \in \mathcal{E}, y = f(x)$$

On en déduit que  $f$  n'est pas bijective de  $\mathcal{E}$  sur  $\mathcal{F}$  si et seulement si :

$$\exists y \in \mathcal{F}, \left( \forall x \in \mathcal{E}, y \neq f(x) \right) \vee \left( \exists a, b \in \mathcal{E}, a \neq b \wedge f(a) = f(b) \right)$$

## Partie B - Exemples

4)

5)

6)

a) Prouvons que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe un unique couple  $(p, q) \in \mathbb{N}^2$  tel que  $f(p, q) = n$ .

Si  $n = 2^p(2q + 1)$ , c'est que  $\frac{n}{2^p}$  est un entier impair et donc que  $2^p$  est la plus grande puissance de 2 qui divise  $n$ . Par le théorème fondamental de l'arithmétique, ce choix existe, et est unique ( $p = v_2(n)$ ). Le

choix de  $q$  est maintenant forcé par celui de  $p$  en prenant l'unique  $q \in \mathbb{N}$  tel que  $2q + 1 = \frac{n}{2^p}$  ; celui-ci existe, car  $\frac{n}{2^p}$  est impair.

**b)** Par la question précédente, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe un unique antécédant de  $n$  par  $f$ . Donc  $f$  est bijective de  $\mathbb{N}^2$  sur  $\mathbb{N}^*$ .

**c)** Posons  $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$  telle que  $g(p, q) = f(p, q) - 1$ .  $g$  est injective comme composition de fonctions injectives (voir partie C, question a)), et surjective. En effet, si  $n \in \mathbb{N}$ , alors  $n + 1 \in \mathbb{N}^*$  a un antécédant par  $f$ , et  $n$  a un antécédant par  $g$ .

Donc  $g$  est une bijection de  $\mathbb{N}^2$  sur  $\mathbb{N}$ .

**d)** i)  $h$  est injective : Soient  $(a, b, c), (x, y, z) \in \mathbb{N}^3$  deux triplets d'entiers. Si  $h(a, b, c) = h(x, y, z)$ , par injectivité de  $g$ ,  $g(a, b) = g(x, y)$  et  $c = z$ . Encore par injectivité de  $g$ , on trouve que  $(a, b, c) = (x, y, z)$ . Donc  $h$  est injective.

$h$  est surjective : Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors  $n$  a un antécédant  $(m, c)$  par  $g$  par surjectivité de  $g$ . Encore par surjectivité de  $g$ ,  $m$  a un antécédant  $(a, b)$  par  $g$ . On a donc trouvé des entiers  $a, b, c$  tels que  $g(g(a, b), c) = n$ . Donc  $n$  a un antécédant par  $h$  ( $(a, b, c) \in \mathbb{N}^3$ ), et  $h$  est surjective.

Donc  $h$  est une bijection de  $\mathbb{N}^3$  sur  $\mathbb{N}$ .

ii) L'antécédant de 2023 par  $g$  est  $(3, 126)$ . L'antécédant de 2023 par  $h$  est donc  $(2, 0, 126)$ .

**e)** On prouve le résultat généralisé suivant :

**Théorème.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , il existe une bijection  $\varphi_n : \mathbb{N}^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$  ( $\mathbb{N}^n \cong \mathbb{N}$ ).

*Démonstration.* La preuve est par récurrence. Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , notons  $P(n)$  s'il existe une telle bijection  $\varphi_n$ .

Initialisation : Si  $n = 1$ ,  $\varphi_1 = \text{Id}_{\mathbb{N}}$  est une bijection de  $\mathbb{N}$  sur  $\mathbb{N}$ . Donc  $P(1)$ .

Hérédité : Supposons qu'il existe une bijection  $\varphi_n : \mathbb{N}^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ . Posons

$$\varphi_{n+1}(a_1, \dots, a_{n+1}) = g(\varphi_n(a_1, \dots, a_n), a_{n+1})$$

Prouvons que  $\varphi_{n+1}$  est bijective.

**Injectivité** : Soient  $(a_1, \dots, a_{n+1}), (b_1, \dots, b_{n+1}) \in \mathbb{N}^{n+1}$ . Si  $\varphi_{n+1}(a_1, \dots, a_{n+1}) = \varphi_{n+1}(b_1, \dots, b_{n+1})$ , par injectivité de  $g$ , puis de  $\varphi_n$ ,  $(a_1, \dots, a_{n+1}) = (b_1, \dots, b_{n+1})$ . Donc  $\varphi_{n+1}$  est injective.

**Surjectivité** : Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Alors  $n$  a un antécédant  $(m, a_{n+1})$  par  $g$ . De même,  $m \in \mathbb{N}$  et  $m$  a un antécédant  $(a_1, \dots, a_n)$  par  $\varphi_n$ , car celle-ci est surjective dans  $\mathbb{N}$ . Donc  $n$  a pour antécédant  $(a_1, \dots, a_{n+1})$  par  $\varphi_{n+1}$ . Donc  $\varphi_{n+1}$  est surjective dans  $\mathbb{N}$ .

Donc  $P(n + 1)$ . Par le principe de récurrence,  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ . □

En particulier, on obtient que  $\varphi : \mathbb{N}^4 \rightarrow \mathbb{N}$  définie par  $\varphi(a_1, a_2, a_3, a_4) = g(h(a_1, a_2, a_3), a_4)$  est une bijection.

## 7)

On procède par analyse-synthèse. Analyse : Soit  $f$  une fonction qui satisfait l'énoncé. Prouvons par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  que  $f(n) = n$ .

**Initialisation** :  $f(0) \leq 0$ , et  $f(0) \geq 0$  car  $f(0) \in \mathbb{N}$ . Donc  $f(0) = 0$ .

**Hérédité** : Supposons qu'il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $f(k) = k$  pour tout  $k \leq n$ . Alors  $f(n + 1) > n$  : en effet, si  $f(n + 1) \leq n$ , alors  $f(n + 1) = f(k)$  pour  $k = f(n + 1) \leq n$ , ce qui contredit l'injectivité de  $f$ .

Donc  $f(n+1) \geq n+1$  et  $f(n+1) \leq n+1$ . Donc  $f(n+1) = n+1$ .

Par le principe de récurrence,  $f(n) = n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

Synthèse : La fonction  $f : n \mapsto n$  satisfait bien l'énoncé car elle est injective et  $f(n) = n \leq n$ . La fonction  $f : n \mapsto n$  est donc la seule solution injective de cet énoncé.