

Devoir maison n°12 : Suites récurrentes d'ordre 2 non linéaires

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Partie A -

Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1, u_1 = 1 \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}}$$

1)

a)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrons que $u_n \geq 1$:

D'une part, $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$ sont clairement supérieurs ou égaux à 1. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $u_n \geq 1$ et $u_{n+1} \geq 1$. Alors, en utilisant la relation de récurrence, il vient :

$$u_{n+2} = \sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}} \geq \sqrt{1} + \sqrt{1} = 2 \geq 1$$

Ainsi, par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$.

b)

Supposons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $l \in \mathbb{R}$ lorsque n tend vers $+\infty$. En utilisant la relation de récurrence, on a :


$$l = \sqrt{l} + \sqrt{l} = 2\sqrt{l} \text{ d'où } l = 4 \text{ ou } l = 0$$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$. On en déduit que la seule limite possible de la suite u_n est $l = 4$.

c) Le script python suivant calcule la valeur de u_n suivant la valeur de n fournie.

```
def u(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    i = 1
    a, b = 1, 1
    while i < n:
        i += 1
        c = a**0.5 + b**0.5
        b, a = c, b
    return c

print(u(50)) # u_50 = 3.999999998476622
```



2)

Considérons la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \frac{1}{2}\sqrt{u_n} - 1$.

a)

Supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ à partir duquel, pour tout $n \geq N$:

$$|v_n - 0| < \varepsilon \text{ soit } \left| \frac{1}{2}\sqrt{u_n} - 1 \right| < \varepsilon \text{ soit } |\sqrt{u_n} - 2| < 2\varepsilon$$

Ainsi, en posant $\delta = 2\varepsilon$, pour tout $n \geq N$, $|\sqrt{u_n} - 2| < \delta$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{u_n} = 2$, d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$ par continuité de la fonction $x \rightarrow x^2$ et car pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1 > 0$.

b)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrons que $v_{n+2} = \frac{v_{n+1} + v_n}{2(2 + v_{n+2})}$:

$$\frac{v_{n+1} + v_n}{2(2 + v_{n+2})} = \frac{\frac{1}{2}u_{n+2} - 2}{2 + \sqrt{u_{n+2}}} = \frac{(\sqrt{u_{n+2}} + 2)(\sqrt{u_{n+2}} - 2)}{2(2 + \sqrt{u_{n+2}})} = \frac{1}{2}\sqrt{u_{n+2}} - 1 = v_{n+2}$$

c)

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|v_{n+2}| = |v_{n+1} + v_n| \frac{1}{2|2 + v_{n+2}|}$$

Or ,

$$u_{n+2} \geq 1 \Rightarrow \sqrt{u_{n+2}} \geq 1 \Rightarrow 2(2 + v_{n+2}) \geq 3 \Rightarrow \frac{1}{2|2 + v_{n+2}|} \leq \frac{1}{3}$$

On en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$|v_{n+2}| \leq |v_{n+1} + v_n| \frac{1}{3}$$

d)

Considérons la fonction $f : x \mapsto x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$ continue sur $[0, 1]$ car polynomiale.

Puisque $f(0) = -\frac{1}{3} < 0$ et que $f(1) = \frac{1}{3} > 0$, alors d'après le TVI il existe un réel $\alpha \in]0, 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$, soit tel que $\alpha^2 = \frac{1}{3}\alpha + \frac{1}{3}$.

e)

Posons $\mu = \max(v_0, v_1) \in \mathbb{R}_+^*$. Prouvons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'assertion $P(n) : \ll |v_n| \leq \mu \times \alpha^n \gg$ est vraie par récurrence double.

Initialisation : De manière immédiate, $v_0 \leq \mu$ et $v_1 \leq \mu$. Ainsi, $P(0)$ et $P(1)$ vraies.

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et $P(n+1)$ vraies.



Puisque $|v_{n+2}| \leq \frac{1}{3}(|v_n| + |v_{n+1}|)$, il vient :

$$|v_{n+2}| \leq \frac{1}{3}(\mu \times \alpha^n + \mu \times \alpha^{n+1}) = \mu \times \alpha^n \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\alpha\right)}_{=\alpha^2} = \mu \times \alpha^n \times \alpha^2 = \mu \times \alpha^{n+2}$$

On en déduit que $P(n+2)$ vraie à son tour, et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leq \mu \times \alpha^n$.

f)

Partie B -

Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 = 1, u_1 = 1 \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}$$

1)

a)

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrons que $u_n \geq 1$:

D'une part, $u_0 = 1$ et $u_1 = 1$ sont clairement supérieurs ou égaux à 1. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $u_n \geq 1$ et $u_{n+1} \geq 1$. Alors, en utilisant la relation de récurrence, il vient :

$$u_{n+2} = \frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = 2 \geq 1$$

Ainsi, par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$.

b)

c)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

Fin du DM12 - J'ai perdu.